

Описание

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ИНГИБИТОРОВ ИНТЕГРАЗЫ ВИЧ (ВАРИАНТЫ), НАБОР И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ВАРИАНТЫ).

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к способу улучшения фармакокинетики 4-оксохинолиновых соединений. Кроме того, изобретение относится к способу ингибирования ретровирусных интеграз, в частности, ингибирования интегразы вирича иммунодефицита человека (ВИЧ), и к способу ингибирования ретровирусной инфекции, особенно ВИЧ-инфекции.

Сведения о предшествующем уровне техники

Инфекция ретровируса, известного как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), продолжает оставаться серьезной проблемой здравоохранения. Способы лечения ВИЧ-инфекций включают введение агентов, которые ингибируют активность вирусных ферментов, которые являются основными для жизненного цикла вирича.

Ритонавир (сокращенно - RTV, или - r), имеющий наименование (2S,3S,5S)-5-(N-(N-((N-Метил-N-((2-изопропил-4-тиазолил)метил)амино)-карбонил)-L-валинил)амино)-2-(N-((5-тиазолил)метоксикарбонил)амино)-1,6-дифенил-3-гидроксигексан), представляет собой ингибитор протеазы ВИЧ, который можно синтезировать способами, описанными в публикации международной патентной заявки WO 1994/14436 и патенте США № 5567823. Как ингибитор протеазы, ритонавир может быть эффективен в плане ингибирования ВИЧ-инфекции у человека. Показано также, что ритонавир в качестве ингибитора фермента обмена веществ цитохромом Р450

монооксигеназы, особенно изоформы ЗА4 (CYP ЗА4), включен в путь метаболизма многих лекарственных средств. См. патенты США №№ 5541206, 5635523, 5648497, 5674882, 5846987 и 5886036.

Ингибиторы протеазы метаболизируются цитохромом Р450 монооксигеназой, что приводит к неблагоприятной фармакокинетике и необходимости использования более частых и более высоких доз, чем это желательно. Введение данных лекарственных средств с агентом, который ингибирует метаболизм, опосредованный цитохромом Р450 монооксигеназой, может улучшить фармакокинетику (например, увеличить полупериод существования, время до максимальной концентрации в плазме и уровня в крови) лекарственного средства.

Ритонавир можно использовать для улучшения фармакокинетики ряда ингибиторов протеазы ВИЧ, которые метаболизируются цитохромом Р450 монооксигеназой. См. патенты США №№ 6037157 и 6703403. Совместное введение ритонавира с лекарственным средством, метаболизируемым цитохромом Р450 монооксигеназой, особенно изоформой Р450 ЗА4 (изоферментом), может привести к улучшению фармакокинетики данного лекарственного средства. Более подробно, совместное введение ритонавира с другим ингибитором протеазы ВИЧ, который метаболизируется цитохромом Р450 монооксигеназой, может привести в результате к улучшению фармакокинетики ингибитора протеазы ВИЧ. В комбинированной терапии данного типа ритонавир можно использовать в субтерапевтических дозах, т.е. дозах, которые меньше чем используемые для значимой супрессии репликации вируса, но достаточно высокие для ингибирования цитохромом Р450

монооксигеназы и поддержки фармакокинетики другого ингибитора протеазы ВИЧ.

Ряд 4-оксохинолинов, включая соединение 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, идентифицирован как агенты против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). См. патентную заявку США № 10/492833, поданную 20 ноября 2003 г., которая опубликована как публикация патентной заявки США № 2005/0239819. В частности, 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота описана как обладающая ингибирующей способностью в отношении белка интегразы ВИЧ. См. там же. ВИЧ принадлежит к семейству ретровирусов и является этиологическим фактором синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). Соответственно фармацевтический агент, который снижает вирусную нагрузку, количество вирусного генома или репликацию ВИЧ в организме, может быть эффективным для лечения или профилактики СПИДа.


В настоящее время существует потребность в агентах и способах, которые эффективны в плане повышения биодоступности или всасывания ингибиторов интегразы, таких как 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, с целью повышения их терапевтического эффекта у пациента. В частности, существует потребность в агентах и способах, которые улучшают фармакокинетику данного ингибитора интегразы, так что приемлемый терапевтический эффект может достигаться введением один раз

в день. Кроме того, в целом имеется потребность в улучшении фармакокинетики лекарственных средств (например, ингибиторов интегразы), которые используют для лечения ВИЧ-инфекции.

Сущность изобретения

Изобретение относится к способу улучшения фармакокинетики 4-оксохинолиновых соединений. Кроме того, изобретение относится к способу ингибирования ретровирусных интеграз, в частности, ингибирования интегразы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), и к способу ингибирования ретровирусной инфекции, особенно ВИЧ-инфекции.


В одном варианте осуществления изобретение предусматривает агенты и способы, которые используют для повышения биодоступности или всасывания ингибиторов интегразы, таких как 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота (Соединение 1), с целью повышения их терапевтического эффекта у пациента. Соединение 1 имеет следующую формулу:



В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы, такого как соединение 1, путем введения ингибитора интегразы пациенту с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ, включающий введение нуждающемуся в ингибиторе пациенту эффективного усиливающего действие количества ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли, так что ингибитор обладает более эффективным фармакокинетическим профилем, чем был бы без добавления ритонавира.

В другом варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики 4-оксохинолинового соединения согласно формуле (I):



(I),

где

цикл Су представляет собой C₃₋₁₀ карбоциклическую группу или гетероциклическую группу, причем каждая группа является необязательно замещенной 1-5 заместителями, выбранными из группы А;

гетероциклическая группа представляет собой насыщенный или ненасыщенный цикл, включающий по меньшей мере один гетероатом, выбранный из группы, состоящей из азота, кислорода и серы;

группа А представляет собой цианогруппу, фенил, нитрогруппу, галоген, C₁₋₄алкил, галоген C₁₋₄алкил, галоген C₁₋₄алкилоксигруппу, -OR^{a1}, -SR^{a1}, -NR^{a1}R^{a2}, -CONR^{a1}R^{a2}, -SO₂NR^{a1}R^{a2}, -COR^{a3}, -NR^{a1}COR^{a3}, -SO₂R^{a3}, -NR^{a1}SO₂R^{a3}, -

COOR^{a1} или $-\text{NR}^{a2}\text{COOR}^{a3}$;

R^{a1} и R^{a2} одинаковы или различны и каждое представляет собой H , C_{1-4} ,

алкил или бензил;

R^{a3} представляет собой C_{1-4} алкил;

R^1 выбрано из группы В или представляет собой C_{1-10} алкил, необязательно замещенный 1 - 3 заместителями, выбранными из галогена

или группы В;

группа В представляет собой:

C_{3-10} карбоцикл, необязательно замещенный 1-5 заместителями,

выбранными из группы А,

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

заместителями, выбранными из группы А,

$-\text{OR}^{a4}$,

$-\text{SR}^{a4}$,

$-\text{NR}^{a4}\text{R}^{a5}$,

$-\text{CONR}^{a4}\text{R}^{a5}$,

$-\text{SO}_2\text{NR}^{a4}\text{R}^{a5}$,

$-\text{COR}^{a6}$,

$-\text{NR}^{a4}\text{COR}^{a6}$,

$-\text{SO}_2\text{R}^{a6}$,

$-\text{NR}^{a4}\text{SO}_2\text{R}^{a6}$,

$-\text{COOR}^{a4}$ или

$-\text{NR}^{a5}\text{COOR}^{a6}$.

R^{a4} и R^{a5} являются одинаковыми или разными и каждое представляет

собой:

H,

C₁₋₄алкил,

C₃₋₁₀ карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1 - 5

заместителями, выбранными из группы A, или

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1 - 5

заместителями, выбранными из группы A;

R^{a6} представляет собой

C₁₋₄алкил, C₃₋₁₀ карбоциклическую группу, необязательно замещенную

1 - 5 заместителями, выбранными из группы A, или

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1 - 5

заместителями, выбранными из группы A;

R² представляет собой H или C₁₋₄алкил;

R³¹ представляет собой H, циано-, гидрокси-, амино-, нитрогруппу, галоген, C₁₋₄алкил, C₁₋₄алоксигруппу, C₁₋₄алкилсульфанил, галоген C₁₋₄алкил

или галоген C₁₋₄алоксигруппу;

X представляет собой C-R³² или N;

Y представляет собой C-R³³ или N;

R³² и R³³ являются одинаковыми или различными и каждое представляет собой:

H,

циано,

нитрогруппу,

галоген,

C_{3-10} карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1 - 5 заместителями, выбранными из группы А,

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1 - 5 заместителями, выбранными из группы А, C_{1-10} алкила, необязательно замещенного 1 - 3 заместителями, выбранными из галогена или группы В,

- OR^{a7} ,

- SR^{a7} ,

- $NR^{a7}R^{a8}$,

- $NR^{a7}COR^{a9}$,

- $COOR^{a10}$ или

- $N=CH-NR^{a10}R^{a11}$;

R^{a7} и R^{a8} являются одинаковыми или различными и каждое выбрано из Н, группы В или C_{1-10} алкила, необязательно замещенного 1 - 3 заместителями, выбранными из галогена и группы В;

R^{a9} представляет собой C_{1-4} алкил; и

R^{a10} и R^{a11} являются одинаковыми или различными и каждое представляет собой Н или C_{1-4} алкил,

включающий введение соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли и ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли нуждающемуся в этом пациенту.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики соединения формулы (I), включающий введение нуждающемуся в соединении или его фармацевтически приемлемой соли пациенту эффективного количества ритонавира или его фармацевтически

приемлемой соли.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ повышения в крови уровня соединения формулы (I) у пациента, которого лечат соединением или его фармацевтически приемлемой солью, включающий введение нуждающемуся в соединении или его фармацевтически приемлемой соли пациенту эффективного количества ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ ингибирования интегразы ВИЧ у нуждающегося в данном лечении пациента, включающий введение соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли и эффективного количества ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ повышения биодоступности соединения 1 у пациента. Способ заключается во введении пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей. Повышение биодоступности соединения можно наблюдать по повышению максимальной концентрации в плазме или увеличению площади под кривой зависимости концентрации плазмы от времени (AUC) по сравнению с площадью, которая была бы, если бы соединение вводили без пищи.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ повышения уровня всасывания соединения 1 у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей. Всасывание соединения можно измерить по концентрации,

достигаемой в кровотоке после введения соединения. Повышение уровня всасывания можно наблюдать по повышению максимальной концентрации в плазме или по повышению площади под кривой зависимости концентрации плазмы от времени (AUC) по сравнению с площадью, которая была бы, если бы соединение вводили без пищи.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ ингибирования активности интегразы ретровируса у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает набор, включающий: (1) фармацевтическую композицию, содержащую соединение 1 или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель; (2) информацию, касающуюся предписаний, и (3) контейнер. Информация, касающаяся предписаний, включает предупреждение или инструкцию для пациента, относящуюся к применению соединения 1 с пищей.

В другом варианте осуществления изобретение предусматривает набор, включающий ингибитор интегразы, такой как соединение 1, информацию, касающуюся предписаний, и контейнер, причем информация, касающаяся предписаний, включает информацию, относящуюся к введению

соединения с целью улучшения его биодоступности.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы, такого как соединение 1, путем введения пациенту ингибитора интегразы с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой соли и с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ повышения биодоступности соединения 1 у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с ритонавиром и с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ повышения уровня всасывания соединения 1 у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с ритонавиром и с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с ритонавиром и с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает способ лечения или профилактики ретровирусной инфекция у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с ритонавиром и с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для улучшения фармакокинетики

ингибитора интегразы ВИЧ (например соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли у пациента.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли и соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для ингибирования интегразы ВИЧ у пациента.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения биодоступности соединения, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения или его фармацевтически приемлемой соли, предназначенных для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения всасывания соединения у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения или его фармацевтически приемлемой соли, предназначенных для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает

применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения или его фармацевтически приемлемой соли, предназначенных для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения или его фармацевтически приемлемой соли, предназначенных для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает набор, включающий: (1) фармацевтическую композицию, содержащую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель; (2) информацию, касающуюся предписаний, и (3) контейнер, причем информация, касающаяся предписаний, включает рекомендацию относительно введения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или ее фармацевтически приемлемой

соли с пищей. В одном варианте осуществления набор может необязательно включать ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения биодоступности соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты у пациента при введении лекарственного средства с пищей, предназначенного для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения всасывания соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты у пациента при введении лекарственного средства с пищей, предназначенного для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления

лекарственного средства для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента при введении лекарственного средства с пищей, предназначенного для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента при введении лекарственного средства с пищей, предназначенного для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает фармацевтическую композицию, включающую ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль, для улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ у пациента.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает фармацевтическую композицию, включающую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или его фармацевтически приемлемую соль, для повышения биодоступности соединения, предназначенную для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает фармацевтическую композицию, включающую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-

[*(2S)*-1-гидрокси-3метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль, для повышения всасывания соединения у пациента, предназначенную для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает фармацевтическую композицию, включающую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[*(2S)*-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, предназначенную для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает фармацевтическую композицию, включающую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[*(2S)*-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль, для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, предназначенную для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает антиретровирусный агент, включающий ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль, для улучшения фармакокинетики интегразы ВИЧ у пациента.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает композицию антиретровирусных агентов, включающую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[*(2S)*-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую

соль, для повышения биодоступности соединения, предназначенную для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает антиретровирусный агент, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль, для повышения всасывания соединения у пациента, предназначенный для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает антиретровирусный агент, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль, для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, предназначенный для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает антиретровирусный агент, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль, для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, предназначенный для введения с пищей.

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ингибитора интегразы или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для перорального введения с пищей для достижения повышенной биодоступности ингибитора интегразы

или его фармацевтически приемлемой соли при лечении чувствительного к интегразе состояния (например, ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ингибитора интегразы (например, соединения формулы (I), такого как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для перорального введения с пищей с целью достижения повышенного всасывания ингибитора интегразы или его фармацевтически приемлемой соли при лечении состояния, чувствительного к интегразе (например, ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ингибитора интегразы (например соединения Формулы (I), такого как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для введения с ингибитором интегразы (например, соединением Формулы (I), таким как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой солью для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например ретровирусной инфекции, такой как

ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ингибитора интегразы (например соединения Формулы (I), такого как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой соли и ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для введения с ингибитором интегразы (например, соединением Формулы (I), таким как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой солью для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ингибитора интегразы (например, соединения Формулы (I), такого как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью и для введения с пищей для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например, ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

В одном варианте осуществления изобретение предусматривает применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для введения с ингибитором

интегразы (например, соединением Формулы (I), таким как Соединение 1) или его фармацевтически приемлемой солью и для применения с пищей для лечения состояния, чувствительного к интегразе (например, ретровирусной инфекции, такой как ВИЧ-инфекция или СПИД).

Данные и другие преимущества изобретения, а также дополнительные изобретательские признаки будут очевидны из описания изобретения, представленного в данном контексте.

Перечень фигур

На фиг. 1 представлен график зависимости концентрации в плазме от времени для Соединения 1 в виде монокомпонента и в комбинации с ритонавиром.

На фиг. 2 представлен график, построенный на линейной шкале концентрации в плазме 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты (Соединения 1) после ее введения в условиях натощак и после приема пищи.

Фиг. 3 иллюстрирует данные, полученные в Примере 3.

Фиг. 4 иллюстрирует данные, полученные в Примере 3.


Фиг. 5 иллюстрирует данные, полученные в Примере 3.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Эффекты ритонавира

Соединения формулы (I) представляют собой ингибиторы интегразы ВИЧ. Специальная группа соединений формулы (I) представляет собой

соединения формулы (II):




где,

R^4 и R^6 являются одинаковыми или различными и каждое выбрано из группы A;
 R^5 выбрано из H или группы A;
или R^4 и R^5 совместно формируют цикл, который сливается с бензольным циклом, с которым они связаны;

m означает 0 - 3; и
каждое из R^1 , R^{31} , R^{32} и R^{33} определяет то же самое, что в формуле (I);
при условии, когда m означает 2 или 3, R^6 каждого m необязательно являются одинаковыми или различными.

Предпочтительное соединение формулы (I) представляет собой

Соединение 1:



1.

Соединения формулы (I) описаны в публикации патентной заявки США № 2005/0239819, которая таким образом включена в данном контексте во всей

своей полноте. Соединение 1 можно найти на стр. 76 в примерах 4-32 данного документа. Способы получения и применения данного и других соединений формул (I) и (II) также описаны в данном документе.

Согласно одному варианту осуществления изобретение раскрывает способ улучшения фармакокинетики лекарственного средства (или его фармацевтически приемлемой соли) путем введения ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли вместе с лекарственным средством. Предпочтительно, когда лекарственное средство представляет собой ингибитор интегразы ВИЧ. Кроме того, предпочтительно, когда лекарственное средство метаболизируется цитохромом Р450 монооксигеназой. При введении два агента могут быть получены в виде раздельных композиций, которые вводят в одно и то же или разное время (например, одновременно, непрерывно или последовательно), или они могут быть получены и введены в виде одной композиции.

Некоторые ингибиторы протеазы ВИЧ, которые метаболизируются цитохромом Р450 монооксигеназой и которые было бы благоприятно вводить с ритонавиром, описаны в патентах США №№ 6037157 и 6703403, которые таким образом включены в данном контексте в виде ссылки во всей своей полноте. Данные патенты описывают получение и схемы дозирования, которые можно использовать с ритонавиром.

Получение и схемы дозирования ингибиторов интегразы ВИЧ можно найти в публикации патентной заявки США № 2004/0167124, которая таким образом включена в данном контексте в виде ссылки во всей своей полноте. Вышеуказанные схемы можно использовать в изобретении, описанном в

данном контексте. В случае комбинированной терапии, например, приблизительно от 20 мг до приблизительно 500 мг соединения формулы (I) или (II), такого как Соединение 1, можно ввести с приблизительно от 10 мг до приблизительно 1200 мг ритонавира/день. В одном специальном варианте осуществления изобретения приблизительно от 20 мг до приблизительно 500 мг соединения формулы (I) или (II), такого как Соединение 1 можно ввести с приблизительно от 10 мг до приблизительно 600 мг ритонавира/день. В варианте осуществления изобретения подходящая доза соединения 1 составляет приблизительно 20 мг, 50 мг, 75 мг, 85 мг, 100 мг, 125 мг, 150 мг, 175 мг или 200 мг, более специально приблизительно 85 мг, приблизительно 125 мг или приблизительно 150 мг. В варианте осуществления изобретения 125 мг или приблизительно 150 мг. В варианте осуществления изобретения 1 подходящая доза ритонавира составляет от приблизительно 20 мг до приблизительно 200 мг, в частности, от приблизительно 50 мг до приблизительно 125 мг, более подробно приблизительно 100 мг. Однако могут быть эффективными более высокие и более низкие дозы каждого агента.

В одном варианте осуществления суточного введения предпочтительные количества соединения 1 и ритонавира представляют собой дозы, которые могут достигать концентрации соединения 1 в крови, поддерживающие IC₉₅ (например, в поправкой на связывание белка *in vitro* IC₉₅ 100 нМ) в течение 24 часов.

В одном варианте осуществления суточного введения предпочтительные количества соединения 1 и ритонавира представляют собой дозы, которые могут достигать концентрации соединения 1 в крови,

поддерживающие более EC₉₀ (например приблизительно 170 нг/мл на модели Emax) в течение 24 часов.

В одном варианте осуществления предпочтительные количества соединения 1 представляют собой дозы, которые получают пациенты, которые могут достигать такого уровня, что среднее снижение уровней РНК ВИЧ в качестве активности в отношении ВИЧ составляет больше чем 1,5 log₁₀ копий/мл, предпочтительно 2,0 log₁₀.

В специальном варианте осуществления изобретение предусматривает способ улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ (или его фармацевтически приемлемой соли), в частности, метаболизируемого цитохромом P450 монооксигеназой, более подробно, изоформой CYP 3 A4, у нуждающегося в данном лечении пациента, посредством введения или совместного введения ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли с ингибитором интегразы. Данную комбинацию ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли и ингибитора интегразы ВИЧ или его фармацевтически приемлемой соли, которая метаболизируется цитохромом P450 монооксигеназой, используют для подавления, лечения или профилактики ВИЧ-инфекции или СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита) у пациента.

Пациенты включают любые живые существа, в частности, млекопитающих (например, человека).

Один аспект изобретения представляет применение эффективного количества ритонавира для улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ. Эффективное количество ритонавира, т.е. количество,

требующееся для усиления действия ингибитора интегразы ВИЧ, представляет собой количество, необходимое для улучшения фармакокинетического профиля ингибитора интегразы ВИЧ по сравнению с его профилем при использовании в виде монотерапии. Ингибитор обладает более эффективным фармакокинетическим профилем, чем был бы без добавления ритонавира. Количество ритонавира, используемое для усиления действия ингибитора интегразы, может быть субтерапевтическим (например, дозы ниже количества ритонавира, обычно используемые для терапевтического лечения ВИЧ-инфекции у пациента). Усиливающая доза ритонавира является субтерапевтической для лечения ВИЧ-инфекции, но достаточно высокой для того, чтобы вызвать модуляцию метаболизма соединений формул (I) и (II), так что их воздействие на пациента усиливается посредством повышенной биодоступности, повышенных уровней в крови, увеличенного полупериода существования, увеличенного периода времени до достижения максимальной концентрации в плазме, повышенного/ускоренного ингибирования интегразы ВИЧ и/или пониженного системного клиренса.

Соединение 1 представляет собой ингибитор интегразы ВИЧ, который метаболизируется цитохромом P450 монооксигеназой, особенно изоформой CYP 3A. В настоящее время обнаружено, что ритонавир можно использовать для улучшения фармакокинетики соединений формулы (I), а также других ингибиторов интегразы ВИЧ. Ритонавир особенно эффективен в плане усиления эффектов ингибиторов интегразы, которые метаболизируются цитохромом P450 монооксигеназой (например, изоформой CYP 3A). Степень

данного усиления оказывается неожиданно существенной. Ритонавир может ограничивать эффект первого прохождения данных соединений. Ритонавир может также ограничивать эффекты вторичного прохождения (системный или печеночный метаболизм/клиренс) данных соединений.

Согласно способам, соответствующим изобретению, ингибитор интегразы (или соединение формулы (I)) или его фармацевтически приемлемую соль можно также вводить с одним или двумя другими агентами, которые используют для лечения вирусных инфекций, такими как ставудин, эмтрицитабин, тенофовир, абакавир, ламивудин, зидовудин, диданозин, залцитабин, фосфазид, эфавиренц, невирапин, делавирдин, типранавир, саквинавир, индинавир, атазанавир, нелфинавир, ампренавир, сампренавир, фосампренавир, лопинавир, ритонавир, энфувиртид, фозивудин тидоксил, аловудин, дексельвукитабин, априцитабин, амдоксовир, элвуцитабин (ACH126443), рацивир (рацемический FTC, PSI-5004), MIV-210, КР- 1461, фосалвудин тидоксил (HDP 99.0003), AVX756, диоксолан тимин (DOT), TMC-254072, INK-20, 4'-Ed4T, TMC-125 (этравирин), каправирин, TMC-278 (рилпивирин), GW-695634, каланолид A, BILR 355 BS и VRX 840773 или их фармацевтически приемлемые соли. Хотя вышеприведенный перечень включает торговые названия ряда соединений, следует иметь в виду, что ссылка на торговое название включает также лежащий в основе активный химический агент независимо от источника. Наборы, соответствующие изобретению, могут также необязательно далее включать один или более агентов, выбранных из вышеприведенного перечня.

В одном варианте осуществления изобретения способы,

соответствующие изобретению, далее включают введение одного или более других агентов, выбранных из тенофовира DF (TDF), эмтрицитабина (FTC), зидовудина (AZT), диданозина (ddl), ставудина (d4T), абакавира (ABC), атазанавира (ATV), лопинавира (LPV), сакцинавира (SQV), типранавира (TPV), фосампренавира (FosAPV) и эфавиренца (EFV). Наборы, соответствующие изобретению, могут также далее включать один или более других агентов из вышеприведенного перечня.

Настоящее изобретение также представляет набор, включающий (i) ингибитор интегразы (например, Соединение 1) или его фармацевтически приемлемую соль, (ii) ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль, (iii) информацию, относящуюся к предписаниям, и (iii) один или более контейнеров. Информация, относящаяся к предписаниям, может представлять информацию, относящуюся к предписаниям, соответствующую способам, представленным в изобретении, и/или как иным образом обсуждается в данном контексте. В варианте осуществления изобретения информация, относящаяся к предписаниям, включает введение ингибитора интегразы или его фармацевтически приемлемой соли с ритонавиром для улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы.

Эффекты пищи

Настоящее изобретение предусматривает также способы улучшения фармакокинетических свойств соединения 1 при введении пациенту. Настоящее изобретение предусматривает также способы повышения терапевтической эффективности соединения 1 в плане лечения или профилактики заболеваний, нарушений и состояний.

Пример заболевания, нарушения или состояния включает, но без ограничения перечисленным, ретровирусную инфекцию или заболевание, нарушение или состояние, ассоциированное с ретровирусной инфекцией. Соединение 1 можно также вводить пациенту для ингибирования активности ретровирусной интегразы. В варианте осуществления изобретения ретровирус представляет собой ВИЧ.

Ранее не проводили фармакокинетических исследования с целью оценки эффекта пищи на фармакокинетику соединения 1. Как правило, пища оказывает различное воздействие на биодоступность и всасывание активного агента. Взаимодействия типа лекарственное средство-лекарственное средство могут привести в результате к пониженной, замедленной или повышенной системной биодоступности лекарственного средства. Например, см. статью Welling, Clin. Pharmacokinet., 9: 404-434 (1984).


Обнаруживают, что Соединение 1 можно ввести пациенту в способе, который повышает терапевтическую эффективность соединения 1 у данных пациентов. При введении с пищей Соединение 1 проявляет повышенную биодоступность и всасывание у пациентов. Соответственно изобретение предусматривает способ повышения биодоступности и всасывания соединения 1 у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей.

Соединение 1 описано в патентной заявке США № 10/492833, поданной 20 ноября 2003 г (публикация патентной заявки США № 2005/0239819), и в патентной заявке США № 11/133463, поданной 20 мая 2005 г. (публикация патентной заявки США № 2005/0288326), которые в данном контексте

включены в виде ссылки во всей своей полноте. Соединение 1 существует в по меньшей мере трех различных кристаллических формах. Кристаллические формы I, II и III описаны в публикации международной патентной заявки WO 05/113508, которая также в данном контексте включена в виде ссылки во всей своей полноте. Данные три формы различают с помощью дифференциального сканирующего калориметра (DSC) и рентгеновского порошкового дифрактометра (XRD). Любую из кристаллических форм можно использовать в настоящем изобретении. В варианте осуществления изобретения пациенту вводят кристаллическую форму II или III либо их смешанные кристаллы.

Хотя введение соединения 1 представляет собой конкретный вариант осуществления изобретения, изобретение также предусматривает введение других соединений, которые дают Соединение 1, например, пролекарственных форм соединения 1. Данные пролекарственные формы, например, могут включать соединения, которые имеют защитные группы, но такие, которые еще приводят в результате к формированию соединения 1 в организме пациента (т.е., *in vivo*). Защитные группы карбоновой кислоты включают, например, сложные алкиловые эфиры и сложные бензиловые эфиры, которые можно удалить с помощью кислоты или основания и гидрогенолиза, соответственно. Более того, соединение, имеющее какой-либо органический остаток, который может диссоциировать *in vivo* с образованием Соединения 1, можно ввести согласно способу, соответствующему изобретению. Таким образом изобретение предусматривает также введение Соединения 1' (где R' обозначает

органический остаток), чтобы получить Соединение 1. Соединение 1' имеет следующую структурную формулу:



Настоящее изобретение далее предусматривает введение фармацевтически приемлемой соли соединения 1. Например, фармацевтически приемлемую соль соединения 1 можно получить путем реакции Соединения 1 с неорганической кислотой, такой как соляная кислота, серная кислота, фосфорная кислота, бромоводородная кислота и т.п.; с органической кислотой, такой как щавелевая кислота, малоновая кислота, лимонная кислота, фумаровая кислота, молочная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, винная кислота, уксусная кислота, трифторуксусная кислота, глюконовая кислота, аскорбиновая кислота, метилсульфоновая кислота, бензилсульфоновая кислота и т.п.; неорганическим основанием, таким как гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид магния, гидроксид аммония и т.п.; органическим основанием, таким как метиламин, диэтиламин, триэтиламин, триэтаноламин, этилендиамин, трис(гидроксиметил)метиламин, гуанидин, холин, цинхонин и т.п., или аминокислотой, такой как лизин, аргинин, аланин и т.п. Настоящее изобретение также охватывает введение содержащих воду продуктов и сольватов, таких как гидраты, соединения 1 и т.п.

Вследствие этого, как используют в данном контексте, выражение "введение... Соединения 1" относится к введению любой формы соединения 1, которая дает Соединение 1 *in vivo*.

Как используют в данном контексте, термин "биодоступность" относится к скорости и степени, в которой активный ингредиент высвобождается из лекарственного продукта и становится доступным в области действия. См. Свод федеральных нормативных актов США, Раздел 21, часть 320.1 (изд. 2001 г.). Для пероральных дозированных форм биодоступность относится к процессам, с помощью которых активный ингредиент высвобождается из пероральной дозированной формы, например, таблетки, и движется в область действия, например, всасывается в большой круг кровообращения. Вследствие этого термин "всасывание" относится к присутствию соединения 1 в его области действия, например, в кровотоке или в иммуноцитах, таких как Т-клетка или макрофаг.

Как используют в данном контексте, термин "с пищей" или "после приема пищи" относится к условиям после принятия пищи в период от приблизительно 1 часа перед введением соединения 1 до приблизительно 2 часов после введения соединения 1. В другом варианте осуществления термин "с пищей" или "после приема пищи" относится к условиям введения соединения 1 в период от приблизительно 1 часа до приема пищи до приблизительно 2 часов после приема пищи. Термин "пища", как используют в данном контексте, относится как к жидкой, так и к твердой пище. Пища также может быть диетой с низким содержанием жиров, высоким содержанием жиров, щадящей диетой или обогащенной диетой. В варианте осуществления

изобретения пища представляет собой твердую пищу с существенным объемом и содержанием жиров, которые небыстро растворяются и всасываются в желудке. Пища может представлять собой прием пищи, такой как завтрак, ленч или обед. Кроме того, прием пищи можно осуществить механическим введением, например, внутривенно, путем принудительного употребления пациентом. Альтернативно пациент может добровольно принимать пищу.

Соединение 1 можно вводить в любое время суток с пищей. Пищу, как правило, можно принимать в любое время в период от приблизительно 1 часа перед введением соединения 1 до приблизительно 2 часов после введения соединения 1. Например, пищу можно принимать в период времени приблизительно за 1 час, приблизительно за 45 минут, приблизительно за 30 минут, приблизительно за 15 минут, приблизительно за 10 минут или минут, приблизительно за 5 минут перед введением соединения 1. Аналогично пищу можно принимать в период времени приблизительно через 5 минут, приблизительно через 10 минут, приблизительно через 15 минут, приблизительно через 30 минут, приблизительно через 45 минут, приблизительно через 1 час, приблизительно через 1,25 часа, приблизительно через 1,5 часа, приблизительно через 1,75 часа или приблизительно через 2 часа после введения соединения 1. В другом варианте осуществления, термин "с пищей" или "после приема пищи" относится к условиям введения соединения 1 в период от приблизительно 1 часа до приема пищи до приблизительно 2 часов после приема пищи. Например, Соединение 1 можно ввести в период времени приблизительно за

1 час, приблизительно за 45 минут, приблизительно за 30 минут, приблизительно за 15 минут, приблизительно за 10 минут или приблизительно за 5 минут до приема пищи. Аналогично Соединение 1 можно ввести в период времени приблизительно через 5 минут, приблизительно через 30 минут, приблизительно через 15 минут, приблизительно через 30 через 10 минут, приблизительно через 45 минут, приблизительно через 1 час, приблизительно через 1,25 часа, приблизительно через 1,5 часа, приблизительно через 1,75 часа или приблизительно через 2 часа после приема пищи. В другом варианте осуществления изобретения Соединение 1 можно вводить непосредственно после приема пищи (например в течение приблизительно 1 минуты после приема пищи) до приблизительно 1 часа после приема пищи. Очень хорошо, когда Соединение 1 вводят практически в одно и то же время с приемом пищи.

Как используют в данном контексте, термины "без приема пищи" или "натощак" относятся к условию не принимать пищу в период времени приблизительно за 1 час перед введением соединения 1 до приблизительно 2 часов после введения соединения 1.

Способ, соответствующий изобретению, заключается во введении терапевтически эффективного количества соединения 1. В случае введения Соединения 1 как монотерапии с пищей подходящая доза терапевтически Соединения 1 для введения пациенту будет эффективного количества соединения 1 для введения пациенту будет составлять от приблизительно 10 мг до приблизительно 2000 мг в день. В варианте осуществления изобретения подходящая доза составляет от приблизительно 400 мг до приблизительно 1600 мг в день. В другом варианте

осуществления изобретения подходящая доза составляет от приблизительно 600 мг до приблизительно 1200 мг в день. В следующем варианте осуществления изобретения подходящая доза составляет приблизительно 800 мг в день.

Если требуется, эффективная суточная доза соединения 1 может быть введена как две, три, четыре, пять, шесть или более субдоз, введенных раздельно через соответствующие интервалы в течение дня, необязательно в унифицированных лекарственных формах. Согласно способу, представленному в изобретении, Соединение 1 можно ввести с пищей много раз в день или, альтернативно, один раз в день. В варианте осуществления изобретения Соединение 1 вводят с пищей один или два раза в день.

Как используют в данном контексте, термин "унифицированная лекарственная форма" относится к форме соединения 1, вводимой пациенту. Унифицированная лекарственная форма может представлять собой, например, пилюлю, капсулу или таблетку. В варианте осуществления изобретения унифицированная лекарственная форма представляет собой таблетку. В варианте осуществления изобретения унифицированная лекарственная форма включает от приблизительно 10 мг до приблизительно 2000 мг соединения 1. В варианте осуществления изобретения унифицированная лекарственная форма включает от приблизительно 50 мг или 200 мг соединения 1 и представлена в форме таблетки. В другом варианте осуществления изобретения унифицированная лекарственная форма включает приблизительно 125 мг или 150 мг соединения 1 и представлена в форме таблетки.

В еще одном варианте осуществления изобретения чистота соединения 1 составляет не меньше чем 95%. Более предпочтительно, когда чистота соединения 1 составляет не меньше чем 98%.

Концентрацию соединения 1 в кровотоке можно измерить как концентрацию в плазме (нг/мл). Фармакокинетические параметры для определения концентрации в плазме включают, но без ограничения перечисленным, максимальную наблюдаемую концентрацию в плазме (C_{max}), площадь под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) от нулевого времени до последней количественно определяемой точки времени (AUC_{0-t}), AUC от нулевого времени до бесконечности (AUC_{0-inf}), время максимальной наблюдаемой концентрации в плазме после введения (t_{max}) и полупериод существования соединения 1 в плазме ($t_{1/2}$).

Введение соединения 1 с пищей приводит в результате к повышенной биодоступности соединения 1, что доказывает повышение C_{max} и/или AUC_{0-inf} соединения 1 по сравнению со значениями, получаемыми, если бы соединение 1 вводили без приема пищи.

Соединение 1 вводили без приема пищи. Введение соединения 1 с пищей согласно способу, соответствующему изобретению, может также повышать всасывание соединения 1. Всасывание соединения 1 можно измерить по концентрации, образующейся в кровотоке через период времени после введения соединения 1. Повышения уровня всасывания путем введения соединения 1 с пищей можно также подтвердить посредством повышения C_{max} и/или AUC_{0-inf} соединения 1 по сравнению со значениями, получаемыми, если бы Соединение 1 вводили без приема пищи.

Настоящее изобретение предусматривает также способ лечения или

профилактики заболеваний, нарушений и состояний. Пример заболевания, профилактики заболеваний, нарушений и состояний включает, но без ограничения перечисленным, нарушения или состояния включает, но без ограничения перечисленным, нарушения или состояния, ретровирусную инфекцию, или заболевание, нарушение или состояние, связанное с ретровирусной инфекцией. Ретровирусы представляют собой РНК-вирусы и обычно их разделяют на семейства альфаретровирусов, бетаретровирусов, дельтаретровирусов, эпсилонретровирусов, гаммаретровирусов, лентивирусов и спумавирусов. Примеры ретровирусов включают, но без ограничения перечисленным, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), Т-лимфотропный вирус человека (HTLV), вирус саркомы Райса (RSV) и вирус лейкоза птиц. Как правило, три гена ретровирусного генома, кодируют белки зрелого вируса: ген gag (группоспецифического антигена), который кодирует кор и структурные белки вируса; ген pol (полимеразы), который кодирует ферменты вируса, включая обратную транскриптазу, который кодирует ферменты вируса, включая обратную транскриптазу, и ген env (оболочки), который кодирует поверхностные протеазу и интегразу, и ген env (оболочки), который кодирует поверхностные протеазу и интегразу, и ген env (оболочки), который кодирует поверхностные протеазу и интегразу, белки ретровируса.

Ретровирусы присоединяются и проникают в клетку-хозяин посредством выделения комплекса РНК и продуктов pol в числе других материалов в клетку-хозяин. Затем обратная транскриптаза продуцирует двухцепочечную ДНК из вирусной РНК. Двухцепочечная ДНК импортируется в ядро клетки-хозяина и интегрируется в геном клетки-хозяина с помощью вирусной интегразы. Возникающий вирус из интегрированной ДНК образуется, когда интегрированная вирусная ДНК превращается в мРНК с помощью полимеразы клетки-хозяина и белки, необходимые для формирования вируса, производятся под действием вирусной протеазы. Вирусная частица производятся под действием вирусной протеазы. Вирусная частица

отделяется и высвобождается из клетки-хозяина с образованием зрелого вируса.

Один вариант осуществления изобретения представляет собой способ ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей. В конкретном варианте осуществления изобретения ретровирус с пищей, представляет собой ВИЧ. Как используют в данном контексте, "ингибирование" относится к снижению или остановке по меньшей мере одной активности, ассоциированной с белком, ферментом или любым другим соединением.

Другой вариант осуществления изобретения представляет собой способ лечения или профилактики ретровирусной инфекции, включающий введение пациенту терапевтически эффективного количества соединения 1 с пищей. В конкретном варианте осуществления изобретения ретровирус представляет собой ВИЧ.

Соединение 1 можно вводить пациенту любым принятым способом. Хотя возможно введение Соединения 1 в виде неочищенного соединения, предпочтительным является введение в виде фармацевтической композиции. Выражение "фармацевтическая композиция, включающая Соединение 1", относится к фармацевтической композиции, включающей Соединение 1 или его фармацевтически приемлемую соль с одним или более фармацевтически приемлемыми носителями или наполнителями и, необязательно, другими лечебными факторами и/или компонентами. Соль, носитель или наполнитель должны быть приемлемыми в смысле совместимости с другими

ингредиентами и безвредными для самого реципиента. Примеры носителей или наполнителей для перорального введения включают кукурузный крахмал, лактозу, стеарат магния, тальк, микрокристаллическую целлюлозу, стеариновую кислоту, повидон, кросповидон, дикальцийфосфат, натрий стеариновую кислоту, гидроксипропилцеллюлозу (например, гидроксикрахмалгликолят, гидроксипропилцеллюлозу с низким уровнем замещения), гидроксипропилцеллюлозу с низким уровнем замещения), гидроксипропилметилцеллюлозу 2910), метилцеллюлозу (например, гидроксипропилметилцеллюлозу 2910), лаурилсульфат натрия.

Фармацевтические композиции можно получить любым подходящим способом, таким как те способы, которые хорошо известны в области фармации, например, такими способами, как описаны в справочнике Gennaro et al., Remington's Pharmaceutical Sciences (Фармацевтические науки Ремингтона) (18 изд., Mack Publishing Co., 1990), особенно часть 8: Pharmaceutical Preparations and their Manufacture (Фармацевтические препараты и их приготовление). Данные способы включают стадию приведения в контакт Соединения 1 с носителем или наполнителем и, необязательно, одним или более вспомогательных ингредиентов. Данные вспомогательные ингредиенты включают принятые в области техники, такие как инертные наполнители, связующие компоненты, разбавители, разрыхлители, красители, вкусовые добавки и смачивающие агенты.

Фармацевтические композиции могут обеспечить контролируемое замедленное действие или замедленное высвобождение Соединения 1 в течение периода времени. Контролируемое замедленное действие или замедленное высвобождение соединения 1 может поддерживать уровень

Соединения 1 в кровотоке пациента в течение более длительного периода времени, чем при использовании принятых лекарственных средств. Фармацевтические композиции включают, но без ограничения перечисленным, таблетки с покрытием, пеллеты и капсулы и дисперсии соединения 1 в среде, которая нерастворима в физиологических жидкостях, или когда высвобождение терапевтического соединения следует за разложением фармацевтической композиции вследствие механической, химической или ферментной активности.

Фармацевтическая композиция, соответствующая изобретению, может находиться, например, в форме пилюли, капсулы или таблетки, каждая из которых содержит предварительно заданное количество соединения 1 и предпочтительно имеет покрытие для облегчения проглатывания, в форме порошка или гранул либо в форме раствора или супензии. В варианте осуществления изобретения фармацевтическая композиция находится в форме таблетки, содержащей Соединение 1 и компоненты таблетки, используемые и описанные в примерах, приведенных в данном контексте.

Для перорального введения тонкие порошки или гранулы могут включать разбавляющие, диспергирующие или поверхностно-активные агенты, и могут находиться, например, в воде или в сиропе, в капсулах или пакетиках в сухом состоянии либо в безводном растворе или супензии, в который могут быть включены супендирующие агенты, или в таблетках, в которые могут быть включены связующие агенты и скользящие вещества. Фармацевтическая композиция может также включать дополнительные компоненты, такие как подсластители, вкусовые добавки, консерванты

(например, антимикробные консерванты), супенсирующие агенты, густители и/или эмульгаторы.

При введении в форме жидкого раствора или супензии лекарственное средство может содержать Соединение 1 и очищенную воду. Необязательные компоненты в жидким растворе или супензии включают подходящие подсластители, вкусовые добавки, консерванты (например, антимикробные консерванты), забуферивающие агенты, растворители и их смеси. Компонент лекарственного средства может выполнять больше одной функции. Например, подходящий забуферивающий агент может также действовать как вкусовая добавка, а также как подсластитель.

Подходящие подсластители включают, например, сахаринат натрия, сахарозу и маннит. Можно использовать смесь двух или более подсластителей. Подсластитель или их смеси, как правило, присутствуют в количестве от приблизительно 0,001% до приблизительно 70% от общей массы композиции. Подходящие вкусовые добавки могут присутствовать в фармацевтической композиции, чтобы обеспечить вишневый вкус, вкус сахарной ваты и другой подходящий вкус, чтобы пациенту было легче проглотить фармацевтическую композицию. Вкусовая добавка или их смеси, как правило, присутствуют в количестве от приблизительно 0,0001% до приблизительно 5% от общей массы композиции.

Подходящие консерванты включают, например, метилпаребен, пропилпаребен, бензоат натрия и хлорид бензалкония. Можно использовать смесь двух или более консервантов. Консервант или их смеси как правило, присутствуют в количестве от приблизительно 0,0001% до приблизительно 2%

от общей массы композиции.

Подходящие забуферивающие агенты включают, например, лимонную кислоту, цитрат натрия, фосфорную кислоту, фосфат калия и различные другие кислоты и соли. Можно использовать смесь двух или более забуферивающих агентов. Забуферивающий агент или их смеси, как правило, присутствуют в количестве от приблизительно 0,001% до приблизительно 4% от общей массы композиции.

Подходящие растворители для жидкого раствора или суспензии включают, например, сорбит, глицерин, пропиленгликоль и воду. Можно использовать смесь двух или более растворителей. Растворитель или система растворителей, как правило, присутствуют в количестве от приблизительно 1% до приблизительно 90% от общей массы композиции.

Фармацевтическую композицию можно вводить с вспомогательными агентами.

Например, неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как сложный олеиловый эфир полиоксиэтилена и н-гексадециловый эфир полиэтилена можно вводить с фармацевтической композицией или включать в нее с целью искусственного повышения проницаемости стенок кишечника. Ферментные ингибиторы также можно вводить с фармацевтической композицией или включать в нее.

Настоящее изобретение предусматривает также набор, содержащий (i) фармацевтическую композицию, включающую Соединение 1 или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель, (ii) информацию касающуюся предписаний, и (iii) контейнер.

Информация, касающаяся предписаний, может обеспечивать информацию, касающуюся предписаний, соответствующих способам, представленным в изобретении и/или иным аспектам, обсуждаемым в данном контексте. В варианте осуществления изобретения, информация, касающаяся предписаний, включает пероральное введение Соединения 1 с пищей с целью улучшения биодоступность и всасывания соединения 1.

Соединение 1 может быть представлено пациенту в контейнере вместе с информацией, касающейся предписаний, которая рекомендует пациенту принимать Соединение 1 перорально с пищей и может также объяснять, что такой образ действий будет повышать биодоступность соединения 1. Соединение 1 может быть также представлено пациенту в контейнере вместе с информацией, касающейся предписаний, в которой пациенту сообщают, что прием соединения 1 с пищей приводит в результате к повышению всасывания соединения 1, что отражается в повышении максимальной концентрации в плазме соединения 1 по сравнению с приемом соединения натощак.

Примеры, иллюстрирующие эффекты ритонавира на биодоступность репрезентативного ингибитора интегразы

Эффекты ритонавира на биодоступность репрезентативного ингибитора интегразы теперь будут проиллюстрированы следующими неограничивающими примерами.

Пример 1. Поддерживающие эффекты ритонавира на фармакокинетику соединения 1

Определяют эффекты совместного введения 100 мг ритонавира (RTV) на стабилизированную фармакокинетику соединения 1. Определяют также

фармакокинетику соединения 1 при однократной дозе и многократной дозе. Кроме того, определяют безопасность многократной дозы соединения 1 при введении в виде монотерапии и с RTV.

Способы

Исследование представляет собой фармакокинетическое исследование на 12 пациентах с открытыми этикетками, в фиксированной последовательности и с перекрыванием. Пациенты представляют собой здоровых мужчин и небеременных нелактирующих женщин в возрасте от 18 до 45 лет включительно.

Продолжительность исследования составляет 20 дней с периодом 1 от 1 до 10 дня и периодом 2 от 11 до 20 дня. Последующий контакт осуществляют в день 27.

Соединение 1 (100 мг) и RTV (100 мг) вводят два раза в день перорально сразу после принятия пищи. Соединение 1 (100 мг) вводят два раза в день перорально сразу после принятия пищи.

Критерии оценки

Фармакокинетика. Для Соединения 1 (и метаболитов при возможности) в плазме рассчитывают следующие параметры: C_{max} , T_{max} , C_{last} , T_{last} , C_{tau} , λ_z , AUC_{0-last} , AUC_{inf} , $\%AUC_{exp}$, AUC_{tau} , $T_{1/2}$, V_z/F и CL/F .

Безопасность. Безопасность определяют по оценке клинических лабораторных тестов на исходном уровне и в различных точках времени в течение исследования, по периодическим физическим исследованиям и документации неблагоприятных событий на протяжении исследования.

Статистические методы

Фармакокинетика. Итоги исследования фармакокинетики соединения 1 и RTV подводят, используя описательную статистику. Кроме того, параметрический анализ (нормальная теория) вариансы (ANOVA) с использованием модели смешанных эффектов, подходящей для перекрывающегося типа, соответствует натуральному логарифмическому превращению фармакокинетических параметров соединения 1 (AUC и C_{max}). Сравнения фармакокинетики соединения 1 при однократной дозе и многократной дозе и фармакокинетики соединения 1 при многократной дозе с введением и без введения RTV проводят, используя 90% доверительные интервалы для соотношения геометрических средних для каждой пары вариантов лечения.

Безопасность. В данном фармакокинетическом исследовании не делают никакого статистического заключения в отношении данных по безопасности.

Результаты

Фармакокинетические результаты. Средние (%CV) фармакокинетические параметры в плазме соединения 1 и RTV после однократного перорального введения дозы 1 (100 мг, день 1) и многократного перорального введения дозы соединения 1 (100 мг два раза в день, день 10) в отсутствие RTV или в присутствии RTV, вводимого перорально в виде однократной дозы (100 мг, день 11) или многократных доз (100 мг два раза в день, день 20) являются следующими.

Параметры	Соединение 1 как монотерапия (N=12)		Соединение 1 + RTV (N=12)	
	День 1	День 10	День 11	День 20
Соединение 1				
AUC (нг.час./мл) ^a	908,1 (28,3)	719,3 (26,2)	6167,3 (29,1)	14302,1 (23,7)
C _{max} (нг/мл)	200,1 (30,4)	164,1 (28,8)	795,3 (38,4)	1826,4 (26,4)
C _{tau} (нг/мл)	19,2 (52,5)	12,4 (63,7)	543,3 (30,4)	1035,6 (32,0)
T _{1/2} (час.) _c	3,1 (2,2, 4,8)	3,5 (2,2 4,1)	18,2 (9,0, 42,6)	9,5 (5,9, 78,2)
Ритонавир				
AUC (нг.час./мл) ^d	Неприменимо	Неприменимо	4979,4 (57,8)	9402,5 (46,9)
C _{max} (нг/мл)	Неприменимо	Неприменимо	616,3 (53,5)	1686,5 (46,5)
C _{tau} (нг/мл)	Неприменимо	Неприменимо	219,8 (61,8)	544,8 (44,3)
T _{1/2} (час.) _c	Неприменимо	Неприменимо	5,1 (2,2 8,3)	4,8 (4,3 6,9)

а Для Соединение 1, AUC представляет AUC_{inf} в день 1 и AUC_{tau} в дни 10, 11 и 20.

б C_{tau} представляет концентрацию в конце интервала дозирования для дней 1, 10, 11 и 20.

с Среднее (min, max)

д Для ритонавира, AUC представляет AUC_{inf} в день 11 и AUC_{tau} в день 20.

Во время введения соединения 1 в виде монотерапии среднее стабилизированное системное воздействие (AUC_{tau}) Соединения 1 (День 10) составляет приблизительно на 20% ниже по сравнению со средним воздействием (AUC_{inf}) после однократного введения (День 1), указывая на автоиндукицию метаболизма соединения 1. Совместное введение с RTV приводит в результате к общему ингибиованию метаболизма Соединения 1, что доказывают как по стабилизированным воздействиям, превышающим предсказываемые, так и по относительно длинному среднему полупериоду существования до элиминации (9,5 относительно 3,5 часов в стабилизированном состоянии). Повышение степени воздействия Соединения 1 после совместного введения RTV, вероятно, обусловлено комбинацией повышенной пероральной биодоступности вследствие пониженного

метаболизма при первом прохождении с компонентом пониженного системного клиренса, как показано путем изменения наблюдавшегося $T_{1/2}$. В целом данные результаты подтверждают применение RTV (например, RTV в низкой дозе) как фармакокинетического усилителя соединения 1, чтобы сделать возможным, например, достижение более высоких минимальных концентраций и менее частых интервалов дозирования.

Результаты по безопасности. Возникающие при лечении неблагоприятные события (AE или AEs от англ. - adverse effect(s)) описаны у 4 из 12 пациентов (33%, пять событий) во время применения соединения 1 в виде монотерапии и у 7 из 12 пациентов (58%, 44 события) при применении соединения 1+RTV. Никакие отдельные AE не описаны у больше чем одного пациента при применении соединения 1 в виде монотерапии. При применении соединения 1+RTV наиболее частым описываемым AE, возникающим при лечении, является тошнота, испытываемая 4 пациентами (33%). Большинство AEs, возникающих при лечении, относятся к событиям слабой тяжести (Степень 1) и устраняются без лечения. Возникающие при лечении AEs, рассматриваемые авторами как связанные с исследуемыми лекарственными средствами, описаны у 2 из 12 пациентов (17%, два события) после введения соединения 1 в виде монотерапии и у 5 из 12 пациентов (42%, 21 событие) после введения соединения 1+RTV. Никаких связанных с лечением AE не описано у более чем одного пациента после введения соединения 1 в виде монотерапии. Связанные с лечением AEs, описанные у более чем одного пациента после введения соединения 1+RTV, представляют собой тошноту (три пациента), рвоту (два пациента), головную боль (два

пациента) и зуд (два пациента).

Никаких серьезных неблагоприятных событий не произошло, ни один пациент не исключен из испытания вследствие неблагоприятного события и ни одной беременности не случилось во время данного исследования. Ни один из пациентов не прекратил принимать исследуемые лекарственные средства вследствие клинической лабораторной патологии и ни одна клиническая лабораторная патология не описана как АЕ.

Выводы

Совместное введение с RTV приводит в результате к общему ингибированию метаболизма соединения 1 и в существенной мере к повышенным системным воздействиям, в особенности из-за повышения концентрации. Данные подтверждают применение RTV в низкой дозе в качестве фармакокинетического усилителя соединения 1. Пероральное введение соединения 1 (100 мг два раза в день) в период до 20 хорошо переносится участвующими в исследовании пациентами. После введения соединения 1 в виде монотерапии все неблагоприятные события являются слабыми и временными. Одновременное пероральное введение соединения 1 (100 мг два раза в день) и RTV (100 мг два раза в день) в период до 10 дней в основном хорошо переносится участвующими в исследовании пациентами. После введения соединения 1+RTV большинство описанных неблагоприятных событий являются слабыми и временными и в основном соответствующими описанным для RTV.

Пример 2. Безопасность, фармакокинетика и антивирусная активность соединения 1 после перорального введения пациентам, инфицированным ВИЧ-1

Исследуют безопасность, фармакокинетику и антивирусную активность соединения 1, вводимого перорально в виде 10 последовательных суточных доз (два раза в день для групп 1, 2 и 4; один раз в день для групп 3 и 5) пациентам, хронически инфицированным ВИЧ-1, в настоящее время не получающим антиретровирусного лечения. Исследуют также фармакокинетику и фармакодинамику соединения 1.

Способы

Исследования представляют собой проводимые двойным слепым методом, рандомизированные, с использованием контрольной группы с плацебо, с последовательными группами, ранжированные по дозам исследования фазы 1/2 лечения соединением 1 нелеченых или леченых антиретровирусными лекарственными средствами ВИЧ-инфицированных взрослых, которые в настоящее время не проходят антиретровирусное лечение. При отборе пациенты должны иметь нагрузку РНК ВИЧ-1 в плазме от ≥ 10000 до ≤ 300000 копий/мл и число CD4+ клеток ≥ 200 клеток/ мм^3 .

Пять последовательных групп из 8 специфических пациентов (6 пациентов - на активном препарате и 2 - на плацебо) лечат в течение 10 последовательных дней, начиная с дня 1 исследуемым лекарственным препаратом или плацебо в условиях после приема пищи. Безопасность, переносимость, фармакокинетику и эффективность мониторируют до дня 21 после введения дозы. Активными вариантами лечения в 5 группах являются

следующие: Группа 1, 400 мг соединения 1 два раза в день; Группа 2, 800 мг соединения 1 два раза в день; Группа 3, 800 мг соединения 1 один раз в день; Группа 4, 200 мг соединения 1 два раза в день; Группа 5, 50 мг Соединения 1+100 мг RTV (RTV), каждый препарат один раз в день. Группа плацебо в Группе 5 также получает 100 мг RTV.

В группу включают восемь пациентов, 2 - получающих плацебо и 6 - активный препарат (рандомизированные: 48, вводят дозу 40). Безопасность оценивают для 8 пациентов/группу (2 получающих плацебо, 6 - активный препарат), всего 40 пациентов. Фармакокинетику оценивают у 28 пациентов в день 1, у 30 пациентов в день 10. Фармакокинетику оценивают у 30 пациентов и РНК ВИЧ-1 определяют у 40 пациентов. Эффективность определяют у 8 пациентов/группу (2 получающих плацебо, 6 - активный препарат), всего у 40 пациентов.

Пациенты представляют собой мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет включительно, которые хронически инфицированы ВИЧ-1 и в настоящее время не проходят антиретровирусное лечение с определяемым при скрининге уровнем РНК ВИЧ-1 в плазме от $\geq 10,000$ до ≤ 300000 копий/мл и определяемым при скрининге числа CD4+ клеток ≥ 200 клеток/ мм^3 . Пациенты могут быть прошедшими или не прошедшими антиретровирусное лечение, но не получающими антиретровирусные препараты в течение 90 дней до начала эксперимента (День 0).

Продолжительность исследования составляет 21 день, причем 10 дней лечения и 11 дней изучения отдаленных результатов. Таблетки по 50 мг или 200 мг Соединения 1 вводят перорально в условиях после приема пищи.

Подходящее плацебо вводят перорально в условиях после приема пищи. Только в Группе 5 капсулы по 100 мг RTV перорально вводят совместно в условиях после приема пищи.

Критерии оценки

Эффективность. Первичная конечная точка эффективности представляет собой максимальное снижение уровня РНК ВИЧ-1 (\log_{10} копий/мл) относительно исходного уровня до дня 11. Максимальное снижение для отдельного пациента составляет максимальное падение среди изменений относительно исходного уровня в дни 2-11.

Фармакокинетика. Для Соединения 1 рассчитывают следующие фармакокинетические параметры: C_{max} , T_{max} , C_{last} , T_{last} , C_{tau} , λ_z , AUC_{0-last} , AUC_{inf} , $\%AUC_{exp}$, AUC_{tau} , V_z/F и CL/F . Определяют концентрации соединения 1 в мононуклеарных клетках периферической крови (РВМС) и используют фармакокинетику Соединения 1 в РВМС.

Безопасность. Неблагоприятные события, жизненные показатели, электрокардиограмму, данные офтальмологического исследования и клинических лабораторных анализов оценивают на безопасность.

Статистические методы

Эффективность. Попарные сравнения проводят с использованием точного критерия ранговой суммы Уилкоксона для сравнения группы плацебо (2 пациента, каждый из объединенных Групп 1 - 4) и каждого из 5 уровней доз Соединения 1 (6 пациентов для каждого уровня дозы) и между каждой парой среди 5 уровней доз Соединения 1. 2 пациентов, которые получают плацебо + 100 мг RTV, лечат как отдельную группу. Значения РНК ВИЧ-1 ниже предела

определения (50 копий/мл) вводят как 49 копий/мл.

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры соединения 1 в плазме и мононуклеарных клетках периферической крови суммируют, используя описательную статистику. Кроме того, для каждого уровня дозы Соединение 1 проводят дисперсионный анализ фармакокинетических параметров (AUC и C_{max}) для исследования пропорциональности доз и стабилизированной фармакокинетики. Минимальные уровни соединения 1, измеренные в дни 2, 4, 7, 10 и 11 включают соответствующим образом в данные анализы.

Безопасность. Долю пациентов с неблагоприятными событиями суммируют по группе лечения, классу системного органа и предпочтительным образом по вызываемым лечением неблагоприятным событиям, связанным с лечением неблагоприятным событиям, тяжелым неблагоприятным событиям и неблагоприятным событиям, приводящим к прекращению введения исследуемого лекарственного препарата. Неблагоприятные события кодируют, используя Медицинский словарь по регуляторным активностям (MedDRA®) версия 8.1. Дополнительные итоговые материалы по неблагоприятным событиям представлены самой высокой степенью даваемой исследователем оценки связи с исследуемым лекарственным препаратом и эффектом на прекращение введения исследуемого препарата. Лабораторные результаты отражают на исходной шкале измерений и в показателях степени токсичности. Итоги изменений относительно исходного уровня в количественных лабораторных тестах подводят при осмотре.

Результаты

Эффективность, фармакокинетические и фармакодинамические результаты

Стабилизированные фармакокинетические параметры (среднее [% CV]) и антивирусную активность соединения 1 при введении в виде монотерапии (200 мг два раза в день, 400 мг два раза в день, 800 мг два раза в день или 800 мг один раз в день) или 50 мг один раз в день при совместном введении со 100 мг RTV представляют с следующей таблице 1:

Таблица 1

Параметр	Плацебо (N=8)	Плацебо/t (N=2)	Соединение 1 200 мг BID (N=6)	Соединение 1 400 мг BID (N=6)	Соединение 1 800 мг QD (N=6)	Соединение 1 800 мг BID (N=6)	Соединение 1 50 мг QD + 100 мг RTV (N=6)
Максимальное снижение уровня РНК ВИЧ-1 (\log_{10} копий/мл)^a							
Среднее (SD)	-0,25 (0,15)	-0,05 (0,14)	-1,48 (0,55) ^b	-1,94 (0,52) ^b	-0,98 (0,37) ^b	-1,91 (0,60) ^b	-1,99 (0,38) ^{b,d}
Медиана (min, max)	-,026 (-0,48, 0,01)	-0,05 (0,15, 0,05)	-1,48 (-2,10, -0,87)	-2,03 (-2,44, -1,04)	-0,096 (-1,41, -0,56)	-1,78 (-2,67, -1,27)	-2,03 (-2,38, -1,54)
Пациенты, достигающие уровня РНК ВИЧ-1 < 50 копий/мл после исходного уровня							
n (%) ^c	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (33%)	0 (0%)
Пациенты, достигающие уровня РНК ВИЧ-1 < 400 копий/мл после исходного уровня							
n (%) ^c	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (50%)	2 (33%)
Стабилизированная фармакокинетика соединения 1^f							
AUC _{0-t} (нг·час./мл) (среднее, %CV)	-	-	1954,65 (46,35)	2335,30 (54,52)	5512,87 (53,59)	3566,35 (36,83)	8843,50 (25,46)
C _{max} (нг/мл) (среднее, %CV)	-	-	479,03 (42,58)	606,87 (77,58)	939,92 (54,31)	835,53 (48,20)	744,65 (20,40)
C _{тш} (нг/мл) (среднее, %CV)	-	-	30,73 (39,98)	48,68 (64,84)	13,62 (68,64)	47,98 (32,65)	135,00 (36,55)
T _{1/2} (час.) (медиана) (min, max)	-	-	2,82 (2,51, 4,75)	3,08 (2,48, 5,02)	3,80 (3,02, 4,60)	2,53 (2,14, 3,03)	8,86 (6,10, 10,91)

а Максимальное снижение уровня РНК ВИЧ-1 определяют как максимальное снижение относительно исходного уровня в \log_{10} копий/мл в период от дня 2 до 11. Значения РНК ВИЧ-1 ниже предела количественного определения (50 копий/мл) вводят как 49 копий/мл. 5 уровней доз Соединения 1 и группу плацебо + RTV сравнивают с группой плацебо.

б p=0,0007 для каждого уровня доз Соединения 1 относительно плацебо на основе парных значений p для непрерывных данных по 2-стороннему точному критерию ранговой суммы Уилкоксона.

в p=0,0152 для группы, получающей 800 мг Соединения 1 один раз в день относительно уровня доз 800 мг Соединения 1 два раза в день и относительно 400 мг Соединения 1 два раза в день на основе парных значений p для непрерывных данных, рассчитанных по 2-стороннему

точному критерию ранговой суммы Уилкоксона.
Уровень доз 50 мг Соединения 1 + RTV один раз в день относительно плацебо + RTV, $p=0,0714$; относительно 200 мг два раза в день $p=0,1797$;
относительно 400 мг два раза в день $p=0,9372$; относительно 800 мг один раз в день $p=0,0022$; относительно 800 мг два раза в день $p=0,8182$.
Процент базируется на всех рандомизированных и леченых пациентах
12- и 24-часовые фармакокинетические образцы, соответствующие окончанию интервала введения доз (τ), собранные в День 10 (введение
доз два раза в день) или 11 (введение доз один раз в день) устанавливают номинальное время 12 и 24 часа, соответственно.

Монотерапия Соединением 1 существенно снижает уровни РНК ВИЧ-1 при всех уровнях доз по сравнению с плацебо ($p < 0,0007$). В течение 10 следующих друг за другом дней введения дозы Соединения 1 400 мг два раза в день, 800 мг два раза в день или 50 мг при введении совместно со 100 мг RTV один раз в день приводят в результате к максимальным снижениям уровней РНК ВИЧ-1 относительно исходного уровня $-1,94 \pm 0,52$, $-1,91 \pm 0,60$ и $-1,99 \pm 0,38 \log_{10}$ копий/мл (среднее \pm SD(стандартное отклонение)), соответственно. Через 10 дней монотерапии Соединением 1, ни у одного пациента не появляются мутации интегразы ВИЧ-1, которые соответствуют мутациям устойчивости к Соединению 1, наблюдавшимся в экспериментах по селекции *in vitro*, или мутациям, которые появляются при селекции на фоне других экспериментальных ингибиторов интегразы.

Соединение 1 не проявляет пропорциональных дозе увеличений в фармакокинетике с повышающимися дозами (200, 400 и 800 мг два раза в день) и не демонстрирует дозозависимой аутоиндукции метаболизма. Совместное введение соединения 1 в дозе 50 мг + 100 мг RTV один раз в день приводит в результате общему ингибированию CYP3A-опосредованного метаболизма и высоким системным воздействиям, в особенности вследствие высоких концентраций. Фармакокинетические результаты в РВМС согласуются с фармакокинетическими данными в плазме. Связь воздействия Соединения 1 - ответа идентифицируют с использованием значений C_{tau} Соединения 1, которое вполне соответствует простой модели E_{max} с $EC_{50} 14,4$ нг/мл и снижению $E_{\text{max}} 2,32 \log_{10}$ копий/мл относительно исходного уровня. Предполагаемый ингибирующий коэффициент соединения 1, рассчитанный

как полученное среднее C_{tau} , деленное на скорректированное на связывание белка IC_{50} *in vitro* 7,17 нг/мл составляет 5,9, 6,7 и 18,8 при уровнях доз 400 мг белка Соединения 1 при данных дозах соответственно. Минимальные концентрации Соединения 1 при данных дозах также превышают скорректированное на связывание белка IC_{95} *in vitro* 44,9 нг/мл (100 нМ) для всего интервала дозирования.

Результаты по безопасности. Вызванные лечением неблагоприятные события испытывает большинство пациентов, но головная боль и диарея являются единственными неблагоприятными событиями, описанными больше чем у 1 пациента в группе. Вероятность вызванных лечением неблагоприятных событий у пациентов, которые получают Соединение 1, близка или ниже, чем вероятность в группах, получающих плацебо, и классы неблагоприятных событий подобны. Никакие неблагоприятные события, которые автор считает связанными с исследуемым лекарственным средством, не испытывают больше чем 2 пациента в группе, и только 3 вызванных лекарственным средством неблагоприятных событий преимущественным образом имеют место у 2 пациентов в группе: диарея (плацебо), тошнота, (плацебо и 200 мг Соединения 1 два раза в день) и усталость (200 мг соединения 1 два раза в день).

Все 40 пациентов, которые получают исследуемое лекарственное средство завершают исследование. Отсутствуют нарушения доз, прекращения или серьезные неблагоприятные события. Пять пациентов имеют вызванные лекарственным средством лабораторные патологии степени 3 или 4: 2 пациента в группе плацебо и по 1 пациенту в каждой из следующих групп - плацебо + RTV один

раз в день, 400 мг соединения 1 два раза в день и 50 мг соединения 1 + RTV один раз в день. Одну из лабораторных патологий степени 3 в группе плацебо, высокий уровень триглицеридов, которую устраниют без лечения, авторы рассматривают как неблагоприятное событие, которое не связано с исследуемым лекарственным средством. 2 пациента, леченных Соединением 1, которые имеют лабораторные патологии степени 3 (повышенный не на голодный желудок уровень триглицеридов или повышенный уровень сывороточной амилазы), также имеют патологические значения на исходном уровне. В процессе исследования не происходит никаких клинически значимых изменений в результатах анализа крови и мочи, жизненных показателях, массе тела или electrocardiogramme и глазных исследованиях.

Выводы

Эффективность. Введение соединения 1 в дозах 200, 400 или 800 мг два раза в день; 800 мг один раз в день или 50 мг + 100 мг RTV один раз в день не подвергшихся или подвергшихся воздействию антивирусных лекарственных средств пациентов, инфицированных ВИЧ-1, в течение 10 следующих друг за другом дней в виде монотерапии существенно снижает уровень РНК ВИЧ-1 по сравнению с плацебо на всех уровнях доз. Дозы Соединения 1 400 мг два раза в день, 800 мг два раза в день и 50 мг + 100 мг RTV один раз в день приводят в результате к среднему снижению относительно исходного уровня -1,94, -1,91 и -1,99 \log_{10} копий/мл, соответственно. В гене интегразы какого-либо пациента не определяют никакие мутации устойчивости к Соединению 1 до дня 21.

Фармакокинетика/фармакодинамика. Соединение 1 проявляет

фармакокинетические свойства, поддерживающие дозирование два раза в день в виде монотерапии или дозирование один раз в день в сочетании с низкой дозой (100 мг) RTV. Связь воздействия Соединения 1 - ответа идентифицируют с использованием значений C_{tau} Соединения 1, которое вполне соответствует простой модели E_{max} . Предполагаемый ингибирующий коэффициент соединения 1, рассчитанный с использованием скорректированного на связывание белка IC_{50} *in vitro* 7,17 нг/мл составляет 5,9, 6,7 и 18,8 при уровнях доз 400 мг два раза в день, 800 мг два раза в день и 50 мг + RTV один раз в день, соответственно. Минимальные концентрации Соединения 1 при данных дозах также превышают скорректированное на связывание белка IC_{95} *in vitro* 44,9 нг/мл (100 нМ) для всего интервала дозирования.

Безопасность. Соединение 1, как правило, хорошо переносится при всех уровнях дозы без нарушений доз, прекращений или серьезных неблагоприятных событий. Большинство неблагоприятных событий являются слабыми и устраняются с помощью лечения. Наиболее распространенным вызываемым лечением неблагоприятным событием является головная боль, и наиболее распространенным связанным с лечением неблагоприятным событием является тошнота. Классы, частота и тяжесть неблагоприятных событий и лабораторных патологий близки между группами, получающими активный препарат и плацебо.

Пример 3. Эффекты доз ритонавира на фармакокинетику

Соединения 1

Оценивают эффекты интервала доз ритонавира (RTV) (20, 50, 100 и 200

мг один раз в день) на фармакокинетику соединения 1. Оценивают также эффекты интервала доз RTV (20, 50, 100 и 200 мг один раз в день) на активность печеночного цитохрома P450 3A (CYP3A), используя субстрат CYP3A. Кроме того, оценивают безопасность и переносимость интервала доз RTV в комбинации с Соединением 1.

Способы

Проводят рандомизированное, с открытыми этикетками, одноцентровое, с использованием множества доз исследование фазы 1 на двух группах (24 пациента (16 поддающихся оценке) в двух группах; 12 (8 поддающихся оценке) в каждой группе) с приблизительно равным распределением пациентов - здоровых мужчин и небеременных нелактирующих женщин в возрасте от 18 до 45 лет включительно.

Подходящими пациентами являются мужчины и небеременные, нелактирующие женщины с коэффициентом массы тела (BMI) $19 \leq \text{BMI} \leq 30$, без существенной истории болезни и с хорошим общим состоянием здоровья, как авторы определяют при отборочной оценке, проводимой не раньше, чем за 28 дней до введения запланированной первой дозы. Предполагаемый клиренскреатинина по Кокрофт-Гаульту (с использованием действительной массы тела) должен составлять $\geq 80 \text{ мл/мин}$.

Используют следующие исследуемые варианты лечения Соединением 1/RTV:

1/RTV:

Вариант лечения A: Соединение 1, 1 таблетка x 125 мг и RTV 20 мг (80 мг/мл раствора, разведенного для получения дозы 20 мг) QD (оба лекарственных препарата в AM).

Вариант лечения В: Соединение 1, 1 таблетка х 125 мг и RTV 50 мг (80 мг/мл раствора, разведенного для получения дозы 50 мг) QD (оба лекарственных препарата в АМ).

Вариант лечения С: Соединение 1, 1 таблетка х 125 мг и RTV 100 мг (80 мг/мл раствора, разведенного для получения дозы 100 мг) QD (оба лекарственных препарата в АМ).

Вариант лечения D: Соединение 1, 1 таблетка х 125 мг и RTV 200 мг (80 мг/мл раствора, разведенного для получения дозы 200 мг) QD (оба лекарственных препарата в АМ).

В каждом варианте лечения сначала вводят RTV, с последующим немедленным введением Соединения 1.

Медленное внутривенное введение мидазолама (MDZ; 1 мг в течение 1 минуты) в качестве зонда активности CYP3A проводят каждому пациенту в 14:00 в день 1 и через 6 часов после введение дозы Соединения 1/RTV в Дни 11 и 21.

После процедур отбора и оценок исходного уровня подходящих пациентов рандомизировано распределяют в одну из двух групп лечения, как описано ниже:

День	Группа лечения и/или зонд MDZ	Проводимая оценка РК
Группа 1		
1	MDZ	MDZ
2-10	A: в АМ	Нет
11	A: в АМ MDZ: через 6 час. после дозирования	Соединение 1, RTV и MDZ
12-20	C: в АМ	Нет
21	C: в АМ MDZ: через 6 час. после дозирования	Соединение 1, RTV и MDZ
Группа 2		
1	MDZ	MDZ
2-10	B: в АМ	Нет
11	B: в АМ MDZ: через 6 час. после дозирования	Соединение 1, RTV и MDZ
12-20	D: в АМ	Нет
21	D: в АМ MDZ: через 6 час. после дозирования	Соединение 1, RTV и MDZ

Все дозы Соединения 1/RTV вводят сразу после завершения приема пищи до полудня с 240 мл воды. Серийные образцы крови для анализа концентраций соединения 1 и RTV в плазме собирают в дни 11 и 21 в следующие точки времени после введения дозы Соединения 1/RTV: 0 (перед введением дозы), 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 24 часа после введения дозы. Серийные образцы крови для анализа концентраций MDZ в плазме собирают в Дни 1, 11 и 21 в следующие точки времени после введение дозы MDZ: 0 (перед введением дозы), 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут и 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 18 после введения MDZ. Оценивают фармакокинетические параметры соединения 1, RTV и MDZ . Оценку ЭКГ (электрокардиограммы) проводят при отборе. Клинические лабораторные тесты, психические исследования и жизненные показатели

(температуру, кровяное давление, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания) проводят при отборе, на исходном уровне и в дни 10 и 20. Жизненные показатели (температуру, кровяное давление, частоту сердечных сокращений и частоту дыхания) определяют также в дни 1, 11 и 21 в 0 часов (перед введением дозы мидазолама) и через 0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 часов после введения дозы мидазолама.

Тестируемый продукт, доза и способ введения:

1. Соединение 1, 1 таблетка x 125 мг и RTV 20 мг QD (в AM)
2. Соединение 1, 1 таблетка x 125 мг и RTV 50 мг QD (в AM)
3. Соединение 1, 1 таблетка x 125 мг и RTV 200 мг QD (в AM)

Все дозы Соединения 1/RTV вводят сразу после завершения приема стандартизированной пищи.

Эталонное лечение, доза и способ введения

Соединение 1, 1 таблетка x 125 мг и RTV 100 мг QD (в AM)

Все дозы Соединения 1/RTV вводят сразу после завершения приема стандартизированной пищи.

Критерии оценки

Безопасность определяют на основании оценки клинических лабораторных тестов, ЭКГ, периодических психических исследований, включая жизненные показатели в различных точках времени во время исследования и по документации неблагоприятных событий.

Рассчитывают следующие фармакокинетические параметры в плазме: для Соединения 1 и RTV: C_{max} , T_{max} , C_{last} , T_{last} , C_{tau} , λ_z , AUC_{tau} , $T_{1/2}$, CL/F и Vz/F.

Для MDZ: AUC_{0-last} , AUC_{inf} , $\%AUC_{exp}$, C_{last} , T_{last} , λ_z , $T_{1/2}$, CL и Vz.

Статистические методы. Данные по безопасности и фармакокинетическим параметрам для Соединения 1, RTV и MDZ суммируют по пациентам и уровню дозы RTV, используя описательную статистику. Подбирают модели активности и/или модели ANOVA (соответственно), используя фармакокинетические параметры Соединения 1 (AUC, C_{max} и C_{tau}), полученные во всех вариантах лечения. Наклон кривой математического ожидания определяют вместе с соответствующим 90% CI. Данное исследование проводят в соответствии с руководством по Современной клинической практике (GCP).

Результаты. Результаты, полученные при исследовании, приводят в следующих трех таблицах 2-4 и на Фигурах 3-5.

Таблица 2: Средние PK (фармакокинетические) параметры (CV%)

MDZ

Параметр PK	MDZ как монотерапия	+ 20 мг RTV	+ 50 мг RTV	+ 100 мг RTV	+ 200 мг RTV
AUC _{inf}	31,0 (30,9)	101 (28,7)	145 (36,1)	219 (49,0)	146 (22,6)
C _{last}	0,20 (40,6)	1,53 (42,4)	2,51 (26,7)	3,34 (23,1)	2,58 (24,8)
Полупериод существования (час.)	3,97 (34,4)	7,83 (38,9)	14,4 (70,4)	22,4 (70,7)	15,2 (31,6)
CL (л/час./кг)	0,447 (27,9)	0,143 (26,5) ¹	0,090 (25,5) ^{1,2}	0,072 (33,6) ^{1,2}	0,087 (22,0) ^{1,2}

¹ дозы AU +RTV отличаются от MDZ в виде монотерапии ($p<0,05$)

^{1,2} $p<0,05$ относительно 20 мг, $p=ns$ для каждой из других

Таблица 3: Средние параметры Соединения 1 (CV%)

Параметр	Соединение 1 + 20 мг RTV	Соединение 1 + 50 мг RTV ¹	Соединение 1 + 100 мг RTV ¹	Соединение 1 + 200 мг RTV ¹
AUC _{tau} (нг.час./мл)	10200 (36,3)	15800 (24,4)	20300 (24,8) ²	20600 (24,3) ²
C _{tau} (нг/мл)	73,8 (60,2)	251 (27,7)	380 (39,9)	410 (26,0)
C _{max} (нг/мл)	1370 (43,0)	1560 (36,4)	1830 (20,1)	2030 (37,4)
Полупериод существования (час.)	4,34 (34,1)	9,52 (27,5)	11,5 (28,8)	14,3 (27,6) ²
IQ	10,3	35,0	53,0	57,2
Кол-во раз IC ₉₅	1,65	5,60	8,48	9,15

IQ и количество раз IC₉₅ основаны на IC₅₀ и IC₉₅ с поправкой на связывание белка в PBMC

¹ RTV 50, 100 и 200 мг отличаются от 20 мг для всех параметров РК

² p < 0,05 относительно 50 мг

Таблица 4: Средние РК параметры RTV (CV%)

Параметр	Соединение 1 + 20 мг RTV	Соединение 1 + 50 мг RTV	Соединение 1 + 100 мг RTV	Соединение 1 + 200 мг RTV
AUC _{tau} (нг.час./мл)	135 (54,9)	1120 (61,4)	6550 (26,9)	16000 (43,9)
C _{tau} (нг/мл)	0,718 (98,8)	11,6 (66,2)	53,8 (41,6)	78,5 (36,7)
C _{max} (нг/мл)	19,5 (56,7)	130 (61,3)	807 (29,5)	2460 (50,5)
Полупериод существования (час.)	4,74 (34,3)	6,54 (32,6)	6,34 (18,4)	5,71 (15,9)

- воздействия RTV непропорциональны дозе, очень низкие уровни воздействия при при концентрациях 20 мг с BLQ (< 0,5 нг/мл) к 16 час. У ряда пациентов

- данные по T_{1/2} и клиренсу MDZ предполагают дозозависимое первое прохождение RTV

- Более высокие CV% при дозах <100 мг

Пример 4. Совместное введение эмтрицитабина/тенофовира дисопроксила. Фумарат и Соединение 1, усиленное ритонавиром

Введение один раз в день соединения 1 с низкой дозой ритонавира приводит в результате к ингибиции метаболизма в дополнение к заметному усилиению воздействия (в 10 - 16 раз). Кроме того, усиленное введением один раз в день ритонавира Соединение 1 достигает высоких

минимальных концентраций, приводя в результате к показателю ингибирования (с использованием IC_{50} с поправкой на связывание белка), который в ~3 раза больше по сравнению с неусиленными схемами дозирования соединения 1, тем самым обеспечивая определенную простительность в отношении поздно принятых или пропущенных доз, связанную с удобной схемой дозирования для пациентов. В качестве нового агента из нового класса терапевтических средств с сильной кратковременной активностью, благоприятным профилем безопасности и простой схемой дозирования один раз в день для поддержания соблюдения схемы усиленное ритонавиром Соединение 1 предлагает огромный потенциал в плане лечения ВИЧ, включая пациентов, которые подверглись воздействию лекарственных средств многих классов.

Комбинация с фиксированной дозой эмтрицитабина/тенофовира дисопроксила фумарата (FTC/TDF) представляет собой простую высокоэффективную комбинацию NRTI с высокобезопасным профилем по сравнению с аналогами тимицина и рекомендуется Министерством здравоохранения и социальных служб США в качестве предпочтительной нуклеозидной или нуклеотидной основы для лечения не подвергавшихся и подвергавшихся лечению взрослых и престарелых пациентов с ВИЧ. Настоящее исследование проводят отчасти с целью оценки потенциальной возможности для клинически соответствующего взаимодействия типа лекарственное средство-лекарственное средство при их совместном введении.

Использование здоровых участников в данном исследовании устраниет

и потенциальные смешанные факторы, связанные с основной схемой, и позволяет избежать краткосрочных изменений в схеме лечения у пациентов с ВИЧ с целью оценки фармакокинетического (РК) взаимодействия.

Таким образом исследуют потенциальную возможность клинически соответствующих взаимодействий типа лекарственное средство-лекарственное средство между эмтрицитабин/тенофовир дисопроксил фумаратом (FTC/TDF) и ингибитором интегразы ВИЧ, усиленным ритонавиром Соединением 1 (Соединение 1/RTV).

Здоровым взрослым участникам вводят FTC/TDF (200 мг/300 мг; один раз в день) в течение 7 дней с последующей рандомизацией порядка введения Соединения 1/RTV (50 мг/100 мг; один раз в день) и Соединения 1/RTV и FTC/TDF перекрывающимся образом в условиях после принятия пищи в течение 10 дней. Зaborы крови для фармакокинетических анализов (РК) проводят в дни 7, 17 и 27. Отсутствие изменения РК для FTC, тенофовира и Соединения 1 определяют как доверительные интервалы 90% (CI) для соотношения геометрических средних (GMR; совместное введение:монотерапия) от 70 до 143% для основных параметров РК: максимальной наблюдаемой концентрации в плазме (C_{max}), площади под кривой зависимости концентрации в плазме от времени в течение интервала дозирования (AUC_{tau}) и минимальной концентрации (C_{tau}).

Двадцать четыре из 26 включенных пациентов завершают исследование без серьезных неблагоприятных событий (серьезные AEs) или прерываний эксперимента вследствие AEs. РК FTC, TFV5 и Соединения 1 не оказывается воздействий во время совместного введения, причем все три основных

параметра соответствуют протоколу определения эквивалентности, а также более строгим критериям биоэквивалентности (90% CI: 80-125%). Параметры РК FTC и TFV сравнимы со статистическими значениями.

Клинически соответствующее взаимодействие типа лекарственное средство-лекарственное средство между FTC/TDF и Соединением 1/RTV при их совместном введении отсутствует.

Пример 5. Отсутствие клинически соответствующего взаимодействия типа лекарственное средство-лекарственное средство между усиленным ритонавиром-ингибитором интегразы Соединением 1/RTV и зидовудином (ZDV)

Зидовудин представляет собой NRTI, используемый пациентами с ВИЧ. Потенциальное взаимодействие между зидовудином и Соединением 1/RTV определяют в рандомизированном исследовании. Оценивают, имеется ли воздействие на фармакокинетику зидовудина или Соединения 1 после совместного введения зидовудина и Соединения 1/RTV по сравнению с введением в виде монотерапии. Кроме того, оценивают безопасность совместного введения зидовудина и Соединение 1/RTV.

Как описано ниже, клинически соответствующее фармакокинетическое взаимодействие типа лекарственное средство-лекарственное средство между зидовудином и Соединением 1/RTV отсутствует. Совместное введение зидовудина и Соединения 1/RTV является безопасным и хорошо переносится. Соединение 1 демонстрирует полупериод существования, поддерживаемый дозированием один раз в день, который продолжается в течение 48 часов после введения дозы.

Исследуемые лекарственные средства (Соединение 1/RTV 200/100 мг QD, ZDV 300 мг BID (два раза в день)) вводят с пищей (~ 400 ккал., 13 г жира). Образцы для фармакокинетических анализов (PK) отбирают через 12 (ZDV) или 24 часа (Соединение 1/RTV). 48-часовой PK профиль соединения 1 определяют через 27 дней дозирования. Уровни ZDV, G-ZDV и Соединения 1 в плазме определяют, используя утвержденные ЖХ/МС/МС (жидкостная хроматография/тандемная масс-спектрометрия) анализы.

Параметры PK оценивают с использованием программы WinNonlin(tm) 5.0.1 (Pharsight Corporation, Mountain View, CA, USA). Эквивалентные пределы для 90% доверительного интервала (CI) устанавливают при 70% - 143% (совместное введение:монотерапия) для соотношения геометрического среднего (GMR) AUC_{tau} , C_{max} и C_{tau} (только Соединение 1).

Демографические показатели: включают 28 участников, и 24 участника завершают исследование (12 мужчин, 12 женщин; средний возраст: 31 год (интервал: 20 - 42 года); средняя масса тела: 70,2 кг (интервал: 50,9 - 101 кг; этническая принадлежность: 20 латиноамериканцев, 4 - европеоидной расы).

Безопасность. Не происходит неблагоприятных событий степени 3/4 (AEs) или серьезных неблагоприятных событий. Имеются четыре прерывания исследования: беременность (1), отзыв согласия (1), рвота (1; группа ZDV + Соединение 1/RTV), вздутие живота (1; группа ZDV). Соединение 1/RTV и ZDV при введении в виде монотерапии и в комбинации, как правило, хорошо переносятся. Наиболее частыми AEs во всех группах лечения являются головная боль и тошнота. Все AEs являются легкими до умеренных и

устраняются при лечении.

Фармакокинетические результаты: 90% CI AUC_{tau}, C_{max}, C_{tau} (только для Соединения 1) ZDV, G-ZDV и Соединения 1 находятся в предварительно заданных эквивалентных пределах PK, причем PK ZDV и G-ZDV близки статистическим значениям.

Примеры, иллюстрирующие эффект пищи

Эффект пищи на фармакокинетические свойства соединения 1 и на терапевтическую эффективность соединения 1 иллюстрируют следующими примерами, которые не предусмотрены как ограничивающие каким-либо образом.

Пример 6

Для клинических исследований соединения 1 получают унифицированные лекарственные формы соединения 1 в виде таблеток по 50 мг и 200 мг. Соединение 1 существует в форме I, форме II и форме III. Форму III используют в конечных препаратах, но форму II и форму III используют также во время исследований препарата.

Получение таблеток по 200 мг соединения 1. Конечная композиция таблеток 200 мг показана в таблице 5.

Таблица 5.

Компонент	Функция	Количество/таблетку
Соединение 1	Лекарственная субстанция	200,0 мг
D-маннит	Разбавитель	107,6 мг
Светлая безводная кремниевая кислота	Скользящий агент	25,0 мг
Лаурилсульфат натрия	Поверхностно-активное вещество	10,0 мг
Кросповидон	Разрыхлитель	25,0 мг
Гидроксипропилметилцеллюлоза 2910 (3 мм ² /с)	Связующий агент	20,0 мг
Очищенная вода*	Связующий агент	-
Натрий кроскармеллоза	Разрыхлитель	100,0 мг
Стearат магния	Смазывающий компонент	2,4 мг
Общая масса таблетки		490,0 мг

* Очищенную воду удаляют при обработке

Соединение 1 сначала микронизируют в струйной мельнице. Микронизированное соединение смешивают с D-маннитом (Japanese Pharmacopoeia, JP), кросповидоном (Japanese Pharmaceutical Excipients, JPE) и светлой безводной кремниевой кислотой (JP) в полиэтиленовой (PE) емкости и затем три раза пропускают через сито 500 мкм. Гидроксипропилметилцеллюлозу (HPMC) 2910 (3 мм²/с) (JP) отдельно растворяют в очищенной воде путем перемешивания и добавляют лаурилсульфат натрия (JP) и растворяют. Смесь D-маннита/кросповидона/светлой безводной кремниевой кислоты/Соединения 1 помещают в гранулятор с псевдоожиженным слоем и гранулируют, используя раствор HPMC/лаурилсульфата натрия. После грануляции грануляты сушат в том же самом грануляторе. Высушенные гранулы пропускают через сито 500 мкм.

Затем просеянные гранулы смешивают с натрий кроскармеллозой (JPE)

в PE емкости и добавляют в емкость стеарат магния (JP). Гранулы прессуют в таблетки, используя ротационный таблеточный пресс.

Двадцать таблеток упаковывают в стеклянный флакон с поглотителем влаги и прокладочным материалом (пластина из PE) и закрывают полипропиленовой (PP) навинчивающейся крышкой.

Получение таблеток по 50 мг соединения 1. Конечная композиция таблетки 50 мг показана в таблице 6.

Таблица 6.

Компонент	Функция	Количество/таблетку
Соединение 1	Лекарственная субстанция	50,0 мг
D-маннит	Разбавитель	26,9 мг
Светлая безводная кремниевая кислота	Скользящий агент	6,25 мг
Лаурилсульфат натрия	Поверхностно-активное вещество	2,5 мг
Кросповидон	Разрыхлитель	6,25 мг
Гидроксипропилметилцеллюлоза 2910 (3 мм ² /с)	Связующий агент	5,0 мг
Очищенная вода*	Связующий агент	-
D-маннит	Разбавитель	145,35 мг
Микрокристаллическая целлюлоза	Разбавитель	145,35 мг
Натрий кроскармеллоза	Разрыхлитель	100,0 мг
Стеарат магния	Смазывающий компонент	2,4 мг
Общая масса таблетки		490,0 мг

* Очищенную воду удаляют при обработке

Размер и масса таблеток по 50 мг такие же, как у таблеток по 200 мг.

Для облегчения процесса изготовления состав таблеток по 50 мг получают, используя просеянные гранулы соединения 1, приготовленные, как описано выше, в качестве исходного материала и разбавляя гранулы наполнителями, пригодными для прямого прессования. D-маннит и микрокристаллическую целлюлозу выбирают в качестве разбавляющих наполнителей вследствие

совместимости с Соединением 1 и свойствами прессования и распада таблеток. В таблице 7 показаны композиции таблеток с использованием просеянных гранул соединения 1 в качестве исходного материала.

Таблица 7.

Компонент	Количество/таблетку
Соединение 1, гранулы	96,9 мг
D-маннит	145,35 мг
Микрокристаллическая целлюлоза	145,35 мг
Натрий кроскармеллоза	100,0 мг
Стеарат магния	2,4 мг
Общая масса таблетки	490,0 мг

Просеянные гранулы, полученные выше, смешивают с натрий кроскармеллозой (JPE), D-маннитом (JP) и микрокристаллической целлюлозой (JP) в РЕ емкости с последующим добавлением в емкость стеарата магния (JP). Затем гранулы прессуют в таблетки, используя ротационный таблеточный пресс.

Двадцать таблеток упаковывают в стеклянный флакон с поглотителем влаги и прокладочным материалом (пластина из РЕ) и закрывают полипропиленовой (РР) навинчивающейся крышкой.

Пример 7

Эффект пищи на фармакокинетические свойства соединения 1 выявляют в одностороннем слепом, рандомизированном расширенном исследовании приема однократной пероральной дозы с контролем плацебо, проводимом на 32 здоровых добровольных участниках эксперимента мужского пола японцах.

Для отбора участников для исследования используют следующие

критерии:

- (1) Здоровые мужчины-японцы в возрасте от 20 до 35 лет;
- (2) Индекс массы тела (BMI) от 18,5 до 25,0, где BMI = [масса тела (кг)/рост (м)]²; и

(3) участники, которые дали письменное информированное согласие

перед тем, как принять участие в эксперименте.

В качестве части более крупного исследования восемь участников (6 получающих активный препарат и 2 - плацебо) получают дозу 400 мг в состоянии натощак и после принятия пищи. Субъекты из группы, получающей 400 мг натощак, получают дополнительную дозу 400 мг с завтраком после периода выведения (как правило, минимум из десяти дней после исходного введения). Интервал из десяти дней между двумя дозами считают подходящим для исключения каких-либо остаточных эффектов в организме участника.

Продолжительность лечения, доза, способ введения и продукт, вводимый в качестве компонента эффекта пищи в более крупном исследовании, показаны в Таблице 8.

Таблица 8.

Продолжительность лечения	Однократная доза	
Способ введения	Натощак, пероральное введение	После приема пищи, пероральное введение
Доза(мг)	400	400
Вводимый продукт	Таблетки Соединения 1 по 200 мг или плацебо	
Число таблеток	2	2

Участников принимают в больничное учреждение во второй половине дня перед введением ("День -1"). Соединение 1 или плацебо вводят на следующий день после госпитализации ("День 1"). Пациентов выписывают на

следующий день после введения ("День 2"). Таким образом участников госпитализируют в целом на три дня. Последующую оценку безопасности проводят через 6-8 дней после введения ("Дни 7-9").

Соединение 1 или плацебо вводят перорально с 200 мл воды. Дозы вводят в близкое время каждому участнику в каждый из периодов лечения. Все участники воздерживаются от принятия пищи и жидкостей с послеобеденного времени дня перед введением дозы (День -1) до завтрака в День 1 (для участников, получающих Соединение 1 или плацебо в состоянии после принятия пищи) или времени ленча в День 1 (для участников в состоянии натощак).

Когда участникам вводят Соединение 1 в состоянии после приема пищи, они получают завтрак приблизительно за 30 минут до введения дозы.

Завтрак состоит из следующего:

160 мл яблочного сока

Вареное яйцо (50 г)

Булочки (105 г)

8 г масла

14 г клубничного джема

1 Общее содержание энергии: 574,6 Ккал; Общее содержание жира:

21,4 г

(33% от общего числа калорий); Общее содержание белка: 17,5 г (12% от общего числа калорий); Общее содержание углеводов: 79,0 г (55% от общего числа калорий).

Образцы крови для фармакокинетического анализа берут за 1,5 часа

до введения дозы и в следующие точки времени после введения дозы: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 часа после введения дозы.

Для Соединения 1 в каждой исследуемой группе (в состоянии после приема пищи и натощак) рассчитывают следующие фармакокинетические параметры:

t_{max} - время максимальной наблюдаемой концентрации в плазме;

C_{max} - максимальная наблюдаемая концентрация в плазме;

$T_{1/2z}$ - период полувыведения в конечной фазе;

AUC_{0-tz} - площадь под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) от времени нуль до последней количественно определяемой концентрации ($AUC(0-tz)$); и

AUC_{0-inf} - AUC от времени 0 до бесконечности.

Концентрации в плазме соединения 1 определяют посредством следующего анализа. Образцы плазмы выделены у здоровых участников эксперимента, которым вводят Соединение 1. Образцы плазмы экстрагируют путем твердофазной экстракции с использованием устройства EmporeTM Disk Plate (C8SD) и затем измеряют с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии/тандемной масс-спектрометрии (ЖХ/МС/МС) (разделительный модуль ВЭЖХ модель 2795 фирмы Waters; масс-спектрометр модель API4000 фирмы MDS SCIEX). Ионизацию и детекцию осуществляют с помощью электроспрей-ионизации и детекции положительного иона с множественным мониторированием реакции, соответственно. Данный аналитический метод обоснован в плане: избирательности, линейности, пониженного порога количественного определения (LLOQ), точности и

достоверности анализов внутри и между групп, стабильности стандартных растворов, стабильности матрицы, постпрепартивной стабильности, целостности выделения и разведения, его считают достаточно надежным способом определения соединения 1 в интервале концентраций от 1 до 1000 нг/мл при использовании 50 мкг плазмы человека.

Каждый из образцов плазмы по 50 мкл вводят с 10 мл 90% ацетонитрила и 20 моль/л буфера на основе формиата аммония-муравьиной кислоты (рН 3,0)/ацетонитрил (10:90, об./об.), добавляют 10 мл каждого из внутренних стандартных растворов. К данным образцам добавляют 200 мкл 0,1% муравьиной кислоты в 10% ацетонитрила. Данные растворы затем перемешивают в течение 10 секунд и центрифугируют при 10000 об./мин. в течение 5 минут при 4°С. Аликвоту 250 мкл супернатанта вводят в устройство Empore(tm) Disk Plate (C8SD) (кондиционируют 150 мкл ацетонитрила и 200 мкл 0,1% муравьиной кислоты в данном порядке). Планшет дважды промывают 200 мкл 0,1% муравьиной кислоты в 20% ацетонитриле и дважды элюируют 100 мкл 0,1% муравьиной кислоты в 80% ацетонитриле (всего 200 мкл). К элюатам добавляют 200 мкл 0,1% муравьиной кислоты и анализируют. Затем 10 мкл каждого раствора вводят в систему ЖХ/МС/МС и анализируют.

Соотношение геометрических средних (после приема пищи/натощак) с доверительными интервалами 90% оценивают по C_{max} и $AUC_{0-\infty}$ после перорального введения 400 мг соединения 1 натощак и после приема пищи.

Средняя концентрация через период времени после перорального введения 400 мг соединения 1 в условиях натощак и после приема пищи

показана на фигуре 2. Средние результаты фармакокинетических параметров, $AUC_{0-\infty}$ (нг·Гч./мл), C_{max} (нг/мл), $t_{1/2\lambda_2}$ (час.) t_{max} (час.) соединения 1 в условиях натощак и после приема пищи суммированы в Таблице 9 и сведены в Таблице 10.

Таблица 9.

	Условия введения	t_{max} (час.)	C_{max} (нг/мл)	$t_{1/2\lambda_2}$ (час.)	$AUC_{0-\infty}$ (нг·час./мл)
Соединение 1	Натощак	2,5±1,2	264±78	5,4±1,0	1451±308
	После приема пищи	2,3±1,0	903±391	3,2±0,3	3942±1072

Доза: 400 мг

Среднее ± SD (n=6)

Таблица 10.

Соединение 1	Фармакокинетический параметр	После приема пищи/натощак		
		Соотношение геометрических средних	Доверительный интервал 90%	
			Нижний предел	Верхний предел
	C_{max}	3,30	2,27	4,80
	$AUC_{0-\infty}$	2,69	2,16	3,36

Доза: 400 мг

n=6 участников/каждую группу

На Фигуре 2, в Таблице 9 и в Таблице 10 показано, что, когда Соединение 1 вводят в условиях после приема пищи, C_{max} и $AUC_{0-\infty}$ неизмененного лекарственного препарата в 3,30 и 2,69 раза выше, соответственно, по сравнению с данными результатами в условиях натощак. Данные результаты демонстрируют, что биодоступность и всасывание соединения 1 повышаются в присутствии пищи.

Наблюдаемые повышения фармакокинетических параметров, когда Соединение 1 вводят с пищей, показывают, что Соединение 1 легче всасывается с пищей, например, после приема пищи. Таким образом введение соединения 1 с пищей приводит в результате к повышению биодоступности лекарственного препарата по сравнению с введением лекарственного препарата в условиях натощак. Кроме того, Соединение 1 безопасно и хорошо переносится без тяжелых неблагоприятных событий. Все неблагоприятные события являются легкими. Не отмечают никаких клинически значимых изменений электрокардиограммы (ЭКГ).

Все ссылки, включая публикации, патентные заявки и патенты, приведенные в данном контексте, тем самым включены в виде ссылки во всей своей полноте. Использование терминов "какой-либо" и "определенный" и подобных ссылок в контексте описания изобретения (включая последующую формулу изобретения) следует истолковывать как покрывающие формы как единственного, так и множественного числа, пока в данном контексте не указано иначе или это явно не противоречит контексту. Термины "содержащий", "имеющий", "включающий" и "содержащий в себе" следует истолковывать как неограничивающие термины (т.е., означающие "включающие, но без ограничения перечисленным"), пока не указано иначе. Перечисление областей значений в данном контексте предназначено только для того, чтобы служить способом условного обозначения индивидуальной ссылки на каждое отдельное значение, входящее в интервал, пока в данном контексте не указано иначе, и каждое отдельное значение включено в описание, как если бы оно было индивидуально перечислено в данном

контексте. Все способы, описанные в данном контексте, можно осуществить в любом подходящем порядке, пока в данном контексте не указано иначе или пока это явно не противоречит контексту. Использование любого или всех примеров или иллюстративная формулировка (например, "такой как"), представленная в данном контексте, предназначена только для лучшего освещения изобретения и не предусматривает ограничения объема изобретения, пока не заявлено иначе. Никакие формулировки в описании не следует истолковывать как указывающие на какой-либо незаявленный элемент как важный для практической реализации изобретения. Варианты осуществления в описании представляют собой иллюстрацию вариантов осуществления изобретения и не должны истолковываться как ограничивающие объем изобретения. Компетентный специалист понимает, что многие другие варианты осуществления охватываются заявленным изобретением и что следует рассматривать описание и примеры только как иллюстративные, при этом истинный объем и сущность изобретения показаны в следующей формуле изобретения.

По доверенности.

Евразийский патентный поверенный (свидетельство № 77)




Попеленский Н.К.

POPELENSKY
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Формула изобретения

1. Применение ритонавира или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для улучшения фармакокинетики ингибиторов интегразы вируса иммунодифицита человека (ВИЧ) или его фармацевтически приемлемой соли в организме пациента.

2. Применение по п. 1, в котором ингибиторы интегразы ВИЧ охватываются общей структурной формулой (I)



(I),

где

цикл Су представляет собой C_{3-10} карбоциклическую группу или гетероциклическую группу, причем каждая группа является необязательно замещенной 1-5 заместителями, выбранными из группы А;

гетероциклическая группа представляет собой насыщенный или ненасыщенный цикл, включающий, по меньшей мере, один гетероатом, выбранный из группы, состоящей из азота, кислорода и серы;

группа А включает в себя циано, фенил, нитрогруппу, галоген, C_1 -алкил, галоген C_{1-4} алкил, галоген C_{1-4} алкокси, $-OR^{a1}$, $-SR^{a1}$, $-NR^{a1}R^{a2}$, $-CONR^{a1}R^{a2}$, $-SO_2NR^{a1}R^{a2}$, $-COR^{a3}$, $-NR^{a1}COR^{a3}$, $-SO_2R^{a3}$, $-NR^{a1}SO_2R^{a3}$, $-COOR^{a1}$ и $-NR^{a2}COOR^{a3}$;

R^{a1} и R^{a2} независимо представляют собой Н, C_{1-4} алкил или бензил;

R^{a3} представляет собой C_{1-4} алкил;

R^1 выбрано из группы В или представляет собой C_{1-10} алкил, необязательно замещенный 1-3 заместителями, выбранными из галогена или группы В;

группа В включает в себя:

C_{3-10} карбоцикл, необязательно замещенный 1-5 выбранными из группы

А заместителями,

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными из группы А заместителями,

$-OR^{a4}$,

$-SR^{a4}$,

$-NR^{a4}R^{a5}$,

$-CONR^{a4}R^{a5}$,

$-SO_2NR^{a4}R^{a5}$,

$-COR^{a6}$,

$-NR^{a4}COR^{a6}$,

$-SO_2R^{a6}$,

$-NR^{a4}SO_2R^{a6}$,

$-COOR^{a4}$ или

$-NR^{a5}COOR^{a6}$;

R^{a4} и R^{a5} независимо представляют собой:

H ,

C_{1-4} алкил,

C_{3-10} карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

выбранными из группы А заместителями, или

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными из группы А заместителями;

R^{ab} представляет собой

C_{1-4} алкил,

C_{3-10} карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными из группы А заместителями, или гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными из группы А заместителями;

R^2 представляет собой Н или C_{1-4} алкил;

R^{31} представляет собой Н, циано, гидрокси, амино, нитро, галоген, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилсульфанил, галоген C_{1-4} алкил или галоген C_{1-4} алкокси;

Х представляет собой $C-R^{32}$ или N;

Y представляет собой $C-R^{33}$ или N;

R^{32} и R^{33} независимо представляют собой:

Н,

циано,

нитро,

галоген,

C_{3-10} карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными из группы А заместителями, гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 заместителями, выбранными из группы А и C_{1-10} алкила, необязательно замещенного 1-3 выбранными из галогена или группы В заместителями,

-OR^{a7},

-SR^{a7},

-NR^{a7}R^{a8},

-NR^{a7}COR^{a9},

-COOR^{a10} или

-N=CH-NR^{a10}R^{a11};

R^{a7} и R^{a8} независимо выбраны из H, группы В или C₁₋₁₀алкила, необязательно замещенного 1-3 заместителями, выбранными из галогена и группы В;


R^{a9} представляет собой C₁₋₄алкил; и

R^{a10} и R^{a11} независимо представляют собой H или C₁₋₄алкил;

и их фармацевтически приемлемые соли.

3. Применение по п. 1, в котором улучшение фармакокинетики представляет собой повышение уровня ингибитора интегразы ВИЧ или его фармацевтически приемлемой соли в крови.

4. Применение ритонавира и соединений, охватываемых общей структурной формулой (I)



(I),

где

цикл Су представляет собой C₃₋₁₀ карбоциклическую группу или

гетероциклическую группу, причем каждая группа является необязательно

замещенной 1-5 заместителями, выбранными из группы А;

гетероциклическая группа представляет собой насыщенный или ненасыщенный цикл, включающий по меньшей мере один гетероатом, выбранный из группы, состоящей из азота, кислорода и серы;

группа А включает в себя циано, фенил, нитро, галоген, С₁₋₄алкил, галоген С₁₋₄алкил, галоген С₁₋₄алкокси, -OR^{a1}, -SR^{a1}, -NR^{a1}R^{a2}, -CONR^{a1}R^{a2}, -SO₂NR^{a1}R^{a2}, -COR^{a3}, -NR^{a1}COR^{a3}, -SO₂R^{a3}, -NR^{a1}SO₂R^{a3}, -COOR^{a1} и -NR^{a2}COOR^{a3};

R^{a1} и R^{a2} независимо представляют собой Н, С₁₋₄алкил или бензил;

R^{a3} представляет собой С₁₋₄алкил;

R¹ выбрано из группы В или представляет собой С₁₋₁₀алкил, необязательно замещенный 1-3 заместителями, выбранными из галогена или

группы В;

группа В включает в себя:

С₃₋₁₀карбоцикл, необязательно замещенный 1-5 выбранными из группы

А заместителями,

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5 выбранными

из группы А заместителями,

-OR^{a4},

-SR^{a4},

-NR^{a4}R^{a5},

-CONR^{a4}R^{a5},

-SO₂NR^{a4}R^{a5},

-COR^{a6},

-NR^{a4}COR^{a6},

-SO₂R^{a6},

-NR^{a4}SO₂R^{a6},

-COOR^{a4} или

-NR^{a5}COOR^{a6};

R^{a4} и R^{a5} независимо представляют собой:

H,

C₁₋₄алкил,

C₃₋₁₀карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

выбранными из группы А заместителями, или

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

заместителями, выбранными из группы А;

R^{a6} представляет собой:

C₁₋₄алкил,

C₃₋₁₀карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

выбранными из группы А заместителями, или

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

заместителями, выбранными из группы А;

R² представляет собой H или C₁₋₄алкил;

R³¹ представляет собой H, циано, гидрокси, амино, нитро, галоген, C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкокси, C₁₋₄алкилсульфанил, галоген C₁₋₄алкил или галоген C₁₋₄алкокси;

X представляет собой C-R³² или N;

Y представляет собой C-R³³ или N;

R^{32} и R^{33} независимо представляют собой:

Н,

циано,

нитрогруппу,

галоген,

C_{3-10} карбоциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

выбранными из группы А заместителями,

гетероциклическую группу, необязательно замещенную 1-5

заместителями, выбранными из группы А и C_{1-10} алкила, необязательно замещенного 1-3 выбранными из галогена или группы В заместителями,

$-OR^{a7}$,

$-SR^{a7}$,

$-NR^{a7}R^{a8}$,

$-NR^{a7}COR^{a9}$,

$-COOR^{a10}$ или

$-N=CH-NR^{a10}R^{a11}$;

R^{a7} и R^{a8} независимо выбраны из Н, группы В или C_{1-10} алкила, необязательно замещенного 1-3 заместителями, выбранными из галогена и группы В;

R^{a9} представляет собой C_{1-4} алкил и

R^{a10} и R^{a11} являются одинаковыми или различными и каждое представляет собой Н или C_{1-4} алкил, или их фармацевтически приемлемых солей для изготовления лекарственного средства для ингибиования интегразы ВИЧ у пациента.

5. Применение по п. 4, в котором соединения формулы (I) или их фармацевтически приемлемые соли представляют собой ингибиторы интегразы ВИЧ.

6. Применение по любому из п.п. 2-5, в котором соединения формулы (I) представляют собой 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту.

7. Применение по любому из п.п. 1-6, в котором соединения или их фармацевтически приемлемые соли и ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль вводят пациенту в виде одной композиции.

8. Применение по любому из п.п. 1-7, в котором соединения или их фармацевтически приемлемые соли и ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль вводят перорально.

9. Применение по п. 8, в котором пероральное введение осуществляют один раз в день.

10. Применение по любому из п.п. 1-9, в котором пациенту дополнительно вводят, по меньшей мере, один агент, выбранный из группы, состоящей из ставудина, эмтрицитабина, тенофовира, абакавира, ламивудина, зидовудина, диданозина, залцитабина, фосфазида, эфавиренца, невирапина, делавирдина, типранавира, саквинавира, индинавира, атазанавира, нелфинавира, ампренавира, сампренавира, фосампренавира, лопинавира, ритонавира, энфувиртида, фозивудина тидоксила, аловудина, дексельвукитабина, априцитабина, амдоксовира, эльвукитабина (ACH126443), рацивира (рацемического FTC, PSI-5004), MIV-210, KP-1461, фосалвудина

тидоксила (HDP 99.0003), AVX756, диоксолана тимина (DOT), ТМС-254072, INK-20, 4'-Ed4T, этравирина (ТМС-125), каправирина, рилпивирина (ТМС-278), GW-695634, каланолида А, BILR 355 BS, VRX 840773 и их фармацевтически приемлемых солей.

11. Применение по любому из п.п. 1-10, в котором лекарственное средство предназначено для введения пациенту с пищей.

12. Применение по любому из п.п. 1-10, в котором лекарственное средство выполнено в унифицированной лекарственной форме в виде таблетки.

13. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения биодоступности соединения, включающее введение пациенту терапевтически эффективного количества вводимого с пищей соединения или его фармацевтически приемлемой соли.

14. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения всасывания соединения в организме пациента, включающее введение пациенту терапевтически эффективного количества вводимого с пищей соединения или его фармацевтически приемлемой соли.

15. Применение по п. 13 или п.14, в котором указанное введение

приводит в результате к максимальной концентрации названного соединения в плазме, превышающей данный показатель, если бы это соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводили отдельно от пищи.

16. Применение по п. 13 или 14, в котором указанное введение приводит в результате к площади под кривой зависимости концентрации в плазме названного соединения от времени нуль до бесконечности ($AUC_{0-\infty}$), превышающей данный показатель, если бы это соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводили отдельно от пищи.

17. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для ингибиравания активности ретровирусной интегразы у пациента, включающее введение пациенту терапевтически эффективного количества вводимого с пищей соединения или его фармацевтически приемлемой соли.

18. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, включающее введение пациенту терапевтически эффективного количества вводимого с пищей соединения или его фармацевтически приемлемой соли.

19. Применение по п. 17 или п. 18, в котором ретровирус представляет собой вирус иммунодефицита человека.

20. Применение по любому из п.п. 13-19, в котором терапевтически эффективное количество составляет от приблизительно 10 мг до

приблизительно 2000 мг.

21. Применение по любому из п.п. 13-20, в котором названное соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводят в интервале от приблизительно одного часа перед приемом пищи до приблизительно двух часов после приема пищи.

22. Применение по п. 21, в котором соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводят по-существу одновременно с приемом пищи.

23. Применение по п. 21, в котором соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводят сразу после приема пищи и в период до приблизительно одного часа после приема пищи.

24. Применение по любому из п.п. 13-23, в котором соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводят в фармацевтической композиции.

25. Применение по п. 24, в котором фармацевтическая композиция выполнена в унифицированной лекарственной форме в виде таблетки.

26. Применение по любому из п.п. 13-25, в котором соединение или его фармацевтически приемлемую соль вводят перорально.

27. Набор, включающий фармацевтическую композицию, содержащую 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль и фармацевтически приемлемый носитель, информацию, касающуюся предписаний включающую рекомендацию о введении 6-(3-хлор-

2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или ее фармацевтически приемлемой соли с пищей и контейнер.

28. Набор по п. 27, в котором информация, касающаяся предписаний, включает указание об более высокой биодоступности 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты при ее введении с пищей, чем без пищи.

29. Набор по п. 27, в котором информация, касающаяся предписаний, включает рекомендацию о введении 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или ее фармацевтически приемлемой соли в период между приблизительно одним часом перед приемом пищи и приблизительно двумя часами после приема пищи.

30. Набор по п. 27, в котором информация, касающаяся предписаний, включает рекомендацию о введении 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или ее фармацевтически приемлемой соли по-существу одновременно с приемом пищи.

31. Набор по п. 27, в котором информация, касающаяся предписаний, включает рекомендацию о введении 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или ее фармацевтически приемлемой соли сразу после приема пищи и до приблизительно одного часа после приема пищи.

32. Набор по любому из п.п. 27-31, в котором фармацевтическая

композиция выполнена в унифицированной лекарственной форме в виде таблетки.

33. Набор по любому из п.п. 27-31, дополнительно включающий ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль.

34. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения у пациента биодоступности вводимого с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты при введении этого лекарственного средства с пищей.

35. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли для изготовления лекарственного средства для повышения у пациента всасывания вводимого с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты при введении этого лекарственного средства с пищей.

36. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли вводимого с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью для

изготовления лекарственного средства для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента при введении с пищей этого лекарственного средства.

37. Применение соединения 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты или его фармацевтически приемлемой соли вводимого с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью для изготовления лекарственного средства для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента при введении с пищей этого лекарственного средства.

38. Фармацевтическая композиция для улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ у пациента, включающая ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль.

39. Фармацевтическая композиция по п. 38, предназначенная для введения с пищей.

40. Фармацевтическая композиция вводимая с пищей для повышения биодоступности соединения, включающая 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

41. Фармацевтическая композиция вводимая с пищей для повышения всасывания соединения у пациента, включающая 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

42. Фармацевтическая композиция вводимая с пищей для

ингибиравания активности ретровирусной интегразы у пациента, включающая ингибиравания активности ретровирусной интегразы у пациента, включающая 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3- метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

43. Фармацевтическая композиция, вводимая с пищей для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, включающая 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

44. Фармацевтическая композиция по любому из п.п. 40-43, для введения с ритонавиром или его фармацевтически приемлемой солью.

45. Антиретровирусный агент для улучшения фармакокинетики ингибитора интегразы ВИЧ у пациента, включающий ритонавир или его фармацевтически приемлемую соль.

46. Антиретровирусный агент по п. 45, представляющий собой композицию для введения с пищей.

47. Композиция антиретровирусных агентов вводимая с пищей для повышения биодоступности соединения, включающая 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

48. Антиретровирусный агент вводимый с пищей для повышения всасывания соединения у пациента, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-

карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

49. Антиретровирусный агент вводимый с пищей для ингибирования активности ретровирусной интегразы у пациента, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.

50. Антиретровирусный агент вводимый с пищей для лечения или профилактики ретровирусной инфекции у пациента, включающий 6-(3-хлор-2-фторбензил)-1-[(2S)-1-гидрокси-3-метилбутан-2-ил]-7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновую кислоту или ее фармацевтически приемлемую соль.


51. Антиретровирусный агент по любому из п.п. 47-50, представляющий собой композицию для введения с ритонавиром или его ее фармацевтически приемлемой солью.

По доверенности.


POPELENSKY
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Евразийский патентный
поверенный (свидетельство № 77)






Фиг. 1




Фиг. 2



Среднее + SD, n=10-11/группу

Фиг. 3



Среднее значение клиренс по
сравнению с контролем

	MDZ Cl (л/час./кг)		Соединение Cl/F (л/час./кг)
Доза RTV	0 мг	20 мг	20 мг
0 мг	1		
20 мг	0.32 ¹	1	1
50 мг	0.20 ¹	0.63 ²	0.53 ³
100 мг	0.16 ¹	0.50 ²	0.46 ³
200 мг	0.19 ¹	0.60 ²	0.40 ^{3,4}


¹p < 0,05 отн. 0 мг RTV

²p < 0,05 отн. 20 мг, p=ns для каждой из других

³p < 0,05 отн. 20 мг, p=ns для соседней дозы(доз)

⁴p < 0,05 отн. 50 мг

Фиг. 4



Среднее ± SD, n=10-11/группу

Фиг. 5