

(19)



Евразийское  
патентное  
ведомство

(21) 201500837 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки  
2016.02.29

(51) Int. Cl. C07K 14/015 (2006.01)  
C12N 7/00 (2006.01)

(22) Дата подачи заявки  
2014.02.13

(54) ПАРВОВИРУС СВИНЕЙ 5В, СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВАКЦИНА

(31) 61/765,204; 13/800,413

(32) 2013.02.15; 2013.03.13

(33) US

(86) PCT/US2014/016165

(87) WO 2014/127084 2014.08.21

(71) Заявитель:

БЁРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ  
ВЕТМЕДИКА, ИНК. (US)


(72) Изобретатель:

Айер Арун В., Джордан Дайана  
М. Мёрфи, Паттерсон Эбби Рей,  
Руф Майкл Б., Вон Эрик Мартин,  
Виктория Джозеф Гилберт, Вайзек  
Калли Энн (US)

(74) Представитель:

Веселицкая И.А., Кузенкова Н.В.,  
Веселицкий М.Б., Каксис Р.А.,  
Белоусов Ю.В., Куликов А.В.,  
Кузнецова Е.В., Соколов Р.А.,  
Кузнецова Т.В. (RU)

(57) Настоящее изобретение обеспечивает новые нуклеотидные последовательности, белковые последовательности, иммуногенные композиции, вакцины и способы, которые относятся к созданию или применению нового парвовируса свиней 5В (PPV5В), который инфицирует, среди прочих, домашних свиней. Композиции и способы обеспечивают определение инфекций, вызванных указанным новым вирусом, мониторинг генетических изменений в вирусных последовательностях у диких и домашних животных и в стадах, а также создание и применение новых вакцин для защиты животных от инфекции этим вирусом.



201500837 A1

A1

201500837

5

10

15

Заявка № 201500837

Заявитель Бёрингер Ингельхайм

Ветмедика, Инк., US

**ПАРВОВИРУС СВИНЕЙ 5В, СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВАКЦИНА**

20

**СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ**

25

Данная заявка содержит список последовательностей в соответствии с 37 C.F.R. 1.821 – 1.825. Список последовательностей, который сопровождает данную заявку, является введенным в нее в качестве ссылки. Указанная ASCII копия, созданная 21 марта 2013 года, имеет название 10-0153-WO-1-SEQ.txt и размер 34495 бит.

**ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ****A. Область, к которой относится изобретение**

30

Настоящее изобретение является связанным с областью здоровья животных и относится к новым штаммам парвовируса свиней, которые включают аттенуированные штаммы для вакцинации, способам производства и способам

лечения при использовании вакцин, полученных из указанных новых штаммов парвовируса.

### В. Описание области техники

Парвовирусы инфицируют широкое разнообразие видов животных, и некоторые из них являются ответственными за тяжелые клинические заболевания, однако большинство этих вирусов вызывают только слабые или субклинические инфекции. Они принадлежат к семейству *Parvoviridae* и образуют два подсемейства: *Densovirinae*, члены которого инфицируют насекомых, и *Parvovirinae*, члены которого инфицируют позвоночных животных. Последнее подсемейство в настоящее время включает 5 родов: *Dependovirus*, *Erythrovirus*, *Amdovirus*, *Bocavirus* и *Parvovirus* (1).

Вирионы парвовируса не имеют оболочки и содержат одноцепочечные, линейные геномы на основе ДНК размером приблизительно 5-6 килобаз (кб). Геном состоит из двух основных открытых рамок считывания (ORF), которые кодируют неструктурные и капсидные белки. Недавно описанные *Bocaviruses* содержат третью ORF между двумя основными ORF (1).

Классические штаммы парвовируса свиней (PPV1) рода *Parvovirus* широко распространены во всем мире и являются ответственными за репродуктивные расстройства у свиней, в частности в стадах, где протоколы вакцинации не соблюдаются правильно или эффективность вакцины снижается из-за иммуносупрессивных факторов. В течение последнего десятилетия ряд новых парвовирусов был обнаружен у свиней. Они включают в себя парвовирус свиней 2 (PPV2) (2) и родственные вирусы (3). Новая группа парвовирусов свиней и коров, а именно группа гоковирусов (PHoV, BHoV), была обнаружена в Гонконге (4), и эти вирусы были определены как такие, которые являются генетически сходными с человеческими PARV4 и 5. Несмотря на то, что они первоначально назывались гоковирусами в честь Гонконга, была предложена новая классификация PHoV как PPV3 (5). PPV4 демонстрирует наибольшее сходство с коровьим парвовирусом 2, но кодирующая способность и организация генома являются аналогичными таковым бокавирусов, поскольку PPV4 кодирует дополнительную ORF3, как и

бокавирусы, расположенную между ORF1 и ORF2. Однако кодируемый PPV4 путативный белок ORF3, существенно отличается от такого бокавирусов (5).

5 Существует постоянная потребность в мониторинге свиней в отношении появления новых вирусов и для разработке вакцин, лечения и способов обнаружения новых вирусов.

### КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

10 Настоящее изобретение относится к новым нуклеотидным последовательностям, последовательностям белка, иммуногенным композициям, вакцинам и способам, которые относятся к созданию и применению новых штаммов парвовируса, которые заражают, в частности, домашних свиней. Эти штаммы относятся к новым парвовирусам свиней, идентифицированным в образцах тканей, полученных от клинически больных домашних свиней; на основе гомологии последовательности с известными видами и штаммами парвовируса свиней, новый вирус был обозначен как парвовирус свиней 5В или PPV5В.

15 Композиции и способы в соответствии с настоящим изобретением обеспечивают обнаружение инфекций с помощью указанного нового вируса, мониторинг генетических изменений в вирусных последовательностях у диких и домашних животных и скота, а также создание и применение новых вакцин для защиты животных от инфекции вирусом.

20 Иммуногенные композиции и вакцины в соответствии с изобретением включают полипептидные последовательности, кодируемые последовательностью нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1, или их иммуногенные фрагменты, необязательно включающие адъюванты для индуцирования более мощного иммунного ответа.

25 Типичные композиции в соответствии с изобретением включают любую из полипептидных последовательностей SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ NO: 4, или их фрагменты, которые являются иммунореактивными с антителами, специфичными для PPV5В. Предпочтительные полипептиды в соответствии с

изобретением включают последовательность SEQ ID NO: 4. Предпочтительно такие полипептиды или их фрагменты являются иммунореактивными с антителами, специфичными для PPV5B.

5 В другом аспекте настоящее изобретение обеспечивает последовательности нуклеиновой кислоты, которые кодируют один или несколько полипептидов, конструкции антител или конъюгаты антител. Генные последовательности, кодирующие полипептиды, включают последовательность нуклеиновой кислоты, которая является, по крайней мере, на 95%, 90%, 85% или даже 80% гомологичной и/или идентичной последовательности в соответствии с SEQ ID NO: 1, в частности, 10 нуклеотидные последовательности 2861-5014 SEQ ID NO: 1 (белок капсида) или фрагменты SEQ ID NO: 1, кодирующие полипептид, который является иммунореактивным с антителами, специфичными для PPV5B. Примеры последовательностей нуклеиновых кислот в соответствии с изобретением включают любую из последовательностей нуклеотидов 935-2024 SEQ ID NO: 1, нуклеотиды 15 2161-2860 SEQ ID NO: 1 и нуклеотиды 2861-5014 SEQ ID NO: 1, и фрагменты, которые кодируют полипептид, который является иммунореактивным с антителами, специфичными для PPV5B. Предпочтительно, когда последовательности нуклеиновых кислот или гены представляют собой такие, которые кодируют полипептид или пептид, который является иммунореактивным с антителом, 20 специфичным для PPV5B.

Кроме того, полипептид в соответствии с изобретением, как используется в данной заявке, включает, но без ограничения таковым, полипептид, который включает:

- i) полипептид, включающий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;
- 25 ii) полипептид, который является, по крайней мере, на 80% гомологичным и/или идентичным с полипептидом i);
- iii) фрагмент полипептидов соответствии с i) и/или ii);
- iv) фрагмент iii) или iv), который включает, по крайней мере, 13, предпочтительно 15, более предпочтительно 17, еще более

предпочтительно 20 последовательных аминокислот, включенных в последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;

v) полипептид, который кодируется полинуклеотидом, который включает последовательность нуклеотидов 935-2024 SEQ ID NO: 1, нуклеотидов 2161-2860 SEQ ID NO: 1 или нуклеотидов 2861-5014 SEQ ID NO: 1;

vi) полипептид, который кодируется полинуклеотидом, который является, по крайней мере, на 80% гомологичным или идентичным полинуклеотиду в соответствии с vi);

vii) фрагмент белка, который кодируется полинуклеотидом, который включает, по крайней мере, 39, предпочтительно 45, более предпочтительно 51, даже более предпочтительно 60 смежных нуклеотидов, которые включены в последовательности нуклеотидов 2161-2860 SEQ ID NO: 1, или нуклеотидов 2861-5014 SEQ ID NO: 1.

Иммуногенные композиции в соответствии с настоящим изобретением, которые содержат, по крайней мере, один или более полипептидов PPV5B, как определено в данной заявке, могут дополнительно содержать физиологически приемлемый носитель, такой как фармацевтически или ветеринарно приемлемый носитель, адъювант или их комбинации.

Любой из полипептидов PPV5B, которые обеспечиваются в данной заявке, или любая из иммуногенных композиций, содержащих один или более полипептидов PPV5B, которые обеспечиваются в данной заявке, могут быть использованы в качестве лекарственного средства, предпочтительно в качестве вакцины или иммуногенной композиции, предпочтительно для профилактики или для лечения субъекта от инфекции PPV5B.

Особенно предпочтительные PPV5B полипептиды включают такие с иммуногенными эпитопами, которые индуцируют иммунологический ответ, специфический для PPV5B. Предпочтительные PPV5B полипептиды включают те, которые имеют аминокислотные последовательности, прогнозируемые в родственных PPV1 в качестве поверхностных антигенов (Simpson и др. JMB 315,

2002) и включают, но не ограничиваются таковыми, остатки 289, 375-381 и 431-443 последовательности SEQ ID NO: 4.

5 Специалистам в данной области техники будет понятно, что композиции, используемые в данной заявке, могут включать известные инъекционные, физиологически приемлемые стерильные растворы. Для приготовления готового к  
10 применению раствора для парентерального введения или инфузии являются доступными водные изотонические растворы, например, физиологический раствор или растворы белка плазмы крови. Кроме того, иммуногенные композиции и вакцины в соответствии с настоящим изобретением могут включать приемлемые для ветеринарии носители, разбавители, изотонические агенты, стабилизаторы или адъюванты.

15 Способы в соответствии с изобретением включают, но не ограничиваются таковыми, способ индукции иммунного ответа против PPV5B инфекции у субъекта, включающий стадию введения субъекту иммуногенной композиции, содержащей один или более PPV5B полипептидов, как определено в данной заявке. Предпочтительно, когда иммунный ответ индуцируется против более чем одного серотипа или штамма PPV5B. Композиции в соответствии с изобретением могут  
20 быть использованы для лечения или, в качестве альтернативы, для предотвращения инфекции PPV5B. Предпочтительно, такой иммунный ответ снижает частоту возникновения и тяжесть одного или более клинических симптомов, связанных с или вызванных инфекцией одним или более серотипами PPV5B.

25 В данной заявке подходящие субъекты и субъекты, которые в этом нуждаются и которым могут быть введены композиции в соответствии с изобретением, включают животных, нуждающихся в профилактике или лечения инфекции, заболевания или состояния, ассоциированного с вирусами, микробами, паразитами, простейшими, бактериями или грибами. Животные, у которых стимулируется  
30 иммунная реакция при использовании композиций или способов в соответствии с настоящим изобретением, включают в себя домашний скот, например, свиней, коров, птиц (например, курей, уток, гусей или индюков), коз и овец, а также домашних животных, таких как мыши, кролики, собаки, кошки и лошади.

Предпочтительные животные включают свиней, муридовых, непарнокопытных, зайцеобразных и полорогих. Наиболее предпочтительным является, когда иммунная реакция стимулируется у свиней.

5 Изобретение также обеспечивает способ снижения частоты или тяжести одного или более симптомов, ассоциированных с или вызванных PPV5B инфекцией, включающий стадию введения иммуногенной композиции в соответствии с изобретением, которая включает один или более пептидов PPV5B в соответствии с данной заявкой и предпочтительно молекулу носителя, например, так, что частота или тяжесть клинического признака PPV5B инфекции уменьшается, по крайней мере, на 10%, предпочтительно, по крайней мере, на 20%, еще более предпочтительно, по крайней мере, на 30%, даже более предпочтительно, по крайней мере, на 50%, даже более предпочтительно, по крайней мере, на 70%, наиболее предпочтительно, по крайней мере, на 100% по сравнению с субъектом, который не получает иммуногенную композицию, как это предусмотрено в  
10 настоящей заявке. Такие признаки включают вирусемию и иммуносупрессию как результат инфекции PPV5B. Такие клинические признаки могут включать неврологические симптомы (депрессия, атаксия, вялость), диарею, одышку, ухудшение состояния организма, отек суставов (который приводит к хромоте и лежачему положению), снижение среднего прироста веса за сутки, смертность и полисерозит в результате сочетанной инфекции другим организмом, например, *Mycoplasma hyorhinis*.

В соответствии с еще одним аспектом настоящее изобретение также относится к способу профилактики инфекции PPV5B, в котором указанные PPV5B инфекции могут быть вызваны PPV5B, имеющим 100% идентичности последовательности с нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO: 1, имеющим, по крайней мере, 95% идентичности последовательности с нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO: 1, имеющим по крайней мере, 90% идентичности последовательности с нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO: 1, или имеющим, по крайней мере, 85% идентичности последовательности с нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO: 1, включающий стадию введения иммуногенной композиции в соответствии  
25  
30

с изобретением, которая включает один или более пептидов PPV5B, как это предусмотрено в соответствии с данной заявкой, то есть, по крайней мере, один полипептид, который имеет, по крайней мере, 100%, по крайней мере, 95%, по крайней мере, 85% идентичности последовательности, соответственно, с полипептидными последовательностями SEQ ID NO: 3 и/или SEQ ID NO: 4, или фрагменты, включающие, по крайней мере 12, предпочтительно 15, более предпочтительно 17, даже более предпочтительно 20 последовательных аминокислот, которые являются включенными в последовательности SEQ ID NO: 3 и/или SEQ ID NO: 4.

10 Настоящее изобретение также относится к способу получения любой из иммуногенных композиций, которые обеспечиваются в данной заявке, который включает смешивание одного или более пептидов PPV5B, как это предусмотрено настоящим изобретением, с молекулой носителя, предпочтительно таким образом, что один или более пептидов PPV5B и молекула носителя являются ковалентно

15 связанными или конъюгированными друг с другом. Такие конъюгаты могут быть поливалентными или одновалентными. Поливалентные композиции или вакцины включают иммунную конъюгацию нескольких пептидов PPV5B с молекулой носителя. В дополнительном аспекте настоящее изобретение относится к способу получения одного или более пептидов PPV5B, где способ включает трансформацию

20 клетки-хозяина, предпочтительно прокариотической клетки, такой как *E.coli*, с помощью молекулы нуклеиновой кислоты, которая кодирует любой из пептидов PPV5B в соответствии с данной заявкой. Альтернативно, клетка-хозяин может быть эукариотической клеткой, такой как клетка животного, клетка насекомого, клетка простейшего, растительная клетка или клетка грибов. Предпочтительно эукариотическая клетка представляет собой клетку млекопитающего, такую как

25 клетка CHO, ВНК или COS или клетку грибов таких, как *Saccharomyces cerevisiae*, или клетку насекомых, такую как Sf9. Также предпочтительной является бакуловирусная экспрессия нуклеиновых кислот в соответствии с настоящим изобретением.

Другой аспект настоящего изобретения относится к способу получения одного или более пептидов PPV5B, которые индуцируют иммунный ответ против, по крайней мере, одного генетического варианта PPV5B и, более предпочтительно, двух или более генетических вариантов PPV5B. Этот способ включает культивирование трансформированного экспрессионного вектора, кодирующего и экспрессирующего один или более пептидов PPV5B, раскрытых в данной заявке. Экспрессированные белки либо удерживаются организмом, в котором они были экспрессированы, либо секретируются в культуральную среду. Экспрессию проводят в условиях, достаточных для получения PPV5B пептида, способного индуцировать иммунный ответ на PPV5B. PPV5B серотипы, к которым PPV5B пептиды индуцируют иммунный ответ, включают, но не ограничиваются таковыми, как последовательности, которые имеют, по крайней мере, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 или 90% идентичности.

Способы получения композиций в соответствии с настоящим изобретением могут дополнительно включать смешивание конъюгата одного или более пептидов PPV5B и молекулы носителя с физиологически приемлемым носителем, таким как фармацевтически или ветеринарно приемлемый носитель, адъювант или их комбинации. Специалистам в данной области техники будет понятно, что выбор носителя, адъюванта или комбинации будет зависеть от пути доставки, личных предпочтений и видов животных, среди прочих.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способу диагностики инфекции PPV5B у субъекта. Этот способ включает введение одного или более пептидов PPV5B; приведение в контакт одного или более пептидов PPV5B с образцом, полученным от субъекта; и идентификацию субъекта как такого, который имеет PPV5B инфекцию, если в образце обнаружено антитело, которое способно связываться с одним или более пептидов PPV5B.

В другом аспекте изобретение относится к способу установления факта того, что субъект ранее подвергался PPV5B инфекции и способен формировать иммунный ответ на PPV5B. Этот способ включает введение одного или более пептидов PPV5B; приведение в контакт одного или более пептидов PPV5B с образцом,

полученным от субъекта; и идентификацию субъекта как такого, который имеет PPV5B инфекцию, если в образце обнаружено антитело, которое способно связываться с одним или более пептидов PPV5B.

5 Изобретение также относится к наборам, которые включают иммуногенную композицию, которая содержит один или более пептидов PPV5B, предпочтительно вместе с молекулой носителя; контейнер для упаковки иммуногенной композиции; набор напечатанных инструкций; и дозатор, способный к введению иммуногенной композиции животному. Необязательно, один или более PPV5B пептидов и молекула носителя могут быть упакованы в виде конъюгата или в виде отдельных соединений. При отдельной поставке также обеспечиваются средства конъюгации 10 одного или более пептидов PPV5B и молекулы носителя, а также соответствующие напечатанные инструкции.

Изобретение также относится к наборам для вакцинации животного, включающим набор распечатанных инструкций; дозатор, способный к введению иммуногенной 15 композиции, как обеспечивается в данной заявке, включающей один или более PPV5B пептидов животного; и где, по крайней мере, один из пептидов PPV5B эффективно иммунизирует животных против, по крайней мере, одного заболевания, связанного с инфекцией PPV5B. Предпочтительно, один или более PPV5B пептидов выбирают из тех, которые предусмотрены в соответствии с настоящим изобретением. Наборы в соответствии с настоящим изобретением могут 20 дополнительно содержать ветеринарно приемлемый носитель, адъювант или их комбинацию.

Дозатор в наборе в соответствии с изобретением способен выделять свое содержимое в виде капель; а содержащаяся в наборе иммуногенная композиция, 25 которая включает в себя PPV5B пептиды, как это предусмотрено настоящим изобретением, способна уменьшать выраженность, по крайней мере, одного клинического признака при PPV5B инфекции при введении интраназально, перорально, подкожно или внутримышечно в организм животного. Предпочтительно, тяжесть клинических симптомов уменьшается, по крайней мере, 30 на 10% предпочтительно, по крайней мере, на 20%, еще более предпочтительно, по

крайней мере, на 30%, даже более предпочтительно, по крайней мере, на 50%, даже более предпочтительно, по крайней мере, на 70%, наиболее предпочтительно, по крайней мере, на 100%, по сравнению с зараженными животными, не подвергшимися лечению.

- 5 Также раскрываются способы лечения или профилактики инфекций, вызванных PPV5B. Способ включает введение эффективного количества иммуногенной композиции в соответствии с настоящим изобретением субъекту, который отличается тем, что лечение или профилактику выбирают из группы, которая состоит из снижения симптомов PPV5B инфекции, снижение тяжести или частоты  
10 клинических симптомов инфекции PPV5B, уменьшения смертности субъектов в результате PPV5B инфекции, и их комбинации.

Композиции в соответствии с изобретением дополнительно содержат ветеринарно приемлемый носитель, адъювант или их комбинации. Такие композиции могут использоваться в качестве вакцины и включать одну или более дополнительные  
15 аттенуированные вакцины, инактивированные вакцины или их комбинации. Такие вакцины вызывают протективный иммунный ответ, по крайней мере, против одного заболевания, связанного с вирусами, выбранными из группы, состоящей из свинных парвовирусов 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, других видов парвовирусов свиней, других патогенных вирусов и бактерий свиньи и их комбинации. Другие типы вакцин,  
20 которые могут быть совместно введены в комбинации с вакциной к PPV5B, включают, но не ограничиваются таковыми, как цирковир вирус свиней типа 2 (например, Ingelvac® CircoFLEX, Ingelvac® CircoFLEX-Mycoflex), вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней (например, Ingelvac® PPCC ATH, Ingelvac® PPCC MLV,), парвовирус свиней (например, ReproCyc® PPCC-PLE),  
25 микоплазму (например, Ingelvac® Mycoflex), и т.д.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что композиции, используемые в данной заявке, могут включать известные инъекционные, физиологически приемлемые стерильные растворы. Для приготовления готового к использованию раствора для парентерального введения или инфузии водные  
30 изотонические растворы, например, физиологические растворы или растворы белка

плазмы крови, является легко доступными. Кроме того, иммуногенные композиции и вакцины в соответствии с настоящим изобретением могут включать в себя фармацевтически или ветеринарно приемлемые носители, разбавители, изотонические агенты, стабилизаторы или адъюванты.

5 Способы в соответствии с изобретением могут также включать смешивание композиции в соответствии с изобретением с ветеринарно приемлемым носителем, адъювантом или их комбинацией. Специалистам в данной области техники будет понятно, что выбор основы, адъюванта или комбинации будет зависеть от способа доставки, личных предпочтений, видов животных и других факторов.

10 Изобретение также относится к способу снижения тяжести существующей PPV5B инфекции у животного путем введения композиции животному. Композиция может включать аттенуированную культуру вируса или один или более пептидов PPV5B в сочетании с приемлемым в ветеринарии носителем.

15 Предпочтительные способы введения включают назальный, пероральный (например, в питьевой воде), внутрикожный и внутримышечный. Внутримышечное введение, наиболее предпочтительно в виде единичной дозы, является предпочтительным. Специалисту в данной области будет понятно, что композиции в соответствии с изобретением могут также быть введены в виде двух или более доз, а также при использовании других путей введения. Например, такие другие  
20 способы включают подкожное, внутрикожное, внутривенное, интраваскулярное, внутриартериальное, интраперитонеальное, интратекальное, внутритрахеальное, внутрикожное, интракардиальное, интралобальное, интрамедуллярное, внутрилегочное или интравагинальное введение. В зависимости от желаемой продолжительности и эффективности лечения, композиции в соответствии с  
25 изобретением могут быть введены один или несколько раз, а также могут вводиться периодически, например, на ежедневной основе в течение нескольких дней, недель или месяцев и в различных дозировках.

Изобретение также относится к наборам для вакцинации животного, включающим комплект напечатанных инструкций; дозатор, способный к введению вакцины для

животного; и, по крайней мере, один изолят из клеточной культуры, в том числе, но не ограничиваясь таковым, из культуры клеток бактерий, грибов, насекомых или млекопитающих, который эффективно иммунизирует животных против, по крайней мере, одного заболевания, ассоциированного с PPV5B, другие штаммы парвовируса, другие патогены и/или их комбинацию. Наборы в соответствии с настоящим изобретением могут дополнительно включать ветеринарно приемлемый носитель, адъювант или их комбинацию.

Устройство для дозированного введения в наборе в соответствии с изобретением является способным высвобождать свое содержимое в виде капель; а изолят, который входит в состав набора, способен уменьшать выраженность, по крайней мере, одного клинического симптома инфекции PPV5B при введении интраназально, перорально, подкожно или внутримышечно в организм животного. В некоторых наборах изолят также является способным снижать тяжесть, по крайней мере, одного клинического симптома инфекции PPV5B. Предпочтительно, тяжесть клинического симптома уменьшается, по крайней мере, на 10% по сравнению с необработанным инфицированным животным.

Другие объекты, признаки и преимущества настоящего изобретения будут очевидными из приведенного ниже подробного описания. Следует понимать, однако, что подробное описание и конкретные примеры, показывающие предпочтительные варианты осуществления изобретения, приводятся только в качестве иллюстрации, поскольку различные изменения и модификации в пределах сущности и объема изобретения будут очевидными для специалистов в данной области техники из этого подробного описания.

### **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР**

Следующие чертежи являются частью настоящего описания и включены для дополнительной демонстрации определенных аспектов настоящего изобретения. Изобретение может быть более понятным со ссылкой на одну или более из этих фигур в сочетании с подробным описанием специфических вариантов осуществления изобретения, представленных в данной заявке. Заявка содержит, по

крайней мере один рисунок, выполненный в цвете. Копии публикации этой патентной заявки с цветным рисунком(ами) будет(ут) предоставлена(ы) Ведомству по запросу и после оплаты необходимой пошлины.

5 ФИГ. 1. показывает последовательность нуклеиновой кислоты PPV5B (SEQ ID NO: 1).

ФИГ. 2. показывает последовательность белка репликазы PPV5B (SEQ ID NO: 2).

ФИГ. 3. показывает последовательность открытой рамки считывания (ORF) белка PPV5B (SEQ ID NO: 3).

10 ФИГ. 4. показывает белковую последовательность капсидного белка PPV5B (SEQ ID NO: 4).

ФИГ. 5. показывает попарное сравнение идентичности аминокислот белковых последовательностей капсидного белка PPV5B и многочисленных других вирусных последовательностей. Ссылки на вирусные последовательности являются приведенными в Таблице 1:

15 ТАБЛИЦА 1

Последовательность	Идентифик. номер GenBank	Информация о журнале	Авторы
[1] Крупный рогатый скот	DQ_335247	J. Virol. 81 (21), 12080-12085 (2007)	Qiu,J., Cheng,F., Johnson,F.B. и Pintel,D
[2] Мелкие собачьи	NP_758521	Virology 302 (2), 219-223 (2002)	Schwartz,D., Green,B., Carmichael,L.E. и Parrish,C.R.
[3] GboV	NC_014358	PLoS ONE 5 (7), E11948 (2010)	Kapoor,A., Mehta,N., Esper,F., Poljsak-Prijatelj,M., Quan,P.L., Qaisar,N., Delwart,E. и Lipkin,W.I
[4] PBoV1a	HM_053693	PLoS ONE 5 (10), E13583 (2010)	Cheng,W.X., Li,J.S., Huang,C.P., Yao,D.P., Liu,N., Cui,S.X., Jin,Y. и Duan,Z.J.
[5] PBoV1b	HM_053694	PLoS ONE 5 (10), E13583 (2010)	Cheng,W.X., Li,J.S., Huang,C.P., Yao,D.P., Liu,N., Cui,S.X., Jin,Y. и Duan,Z.J.

<b>Последовательность</b>	<b>Идентифик. номер GenBank</b>	<b>Информация о журнале</b>	<b>Авторы</b>
<b>[6] HuVoca</b>	NC_007455	Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102 (36), 12891-12896 (2005)	Allander, T., Tammi, M. T., Eriksson, M., Bjerkner, A., Tiveljung-Lindell, A. и Andersson, B.
<b>[7] HuVoca2</b>	NC_012042	J. Infect. Dis. 199 (2), 196-200 (2009)	Kapoor, A., Slikas, E., Simmonds, P., Chieochansin, T., Naeem, A., Shaukat, S., Alam, M. M., Sharif, S., Angez, M., Zaidi, S. и Delwart, E.
<b>[8] HuVoca3</b>	NC_012564	PLoS Pathog. 5 (4), E1000391 (2009)	Arthur, J. L., Higgins, G. D., Davidson, G. P., Givney, R. C. и Ratcliff, R. M.
<b>[9] HuVoca4</b>	NC_012729	J. Infect. Dis. 201 (11), 1633-1643 (2010)	Kapoor, A., Simmonds, P., Slikas, E., Li, L., Bodhidatta, L., Sethabutr, O., Triki, H., Bahri, O., Oderinde, B. S., Baba, M. M., Bukbuk, D. N., Besser, J., Bartkus, J. и Delwart, E.
<b>[10] Densovirus</b>	NC_004287	DIRECT SUBMISSION TO GENBANK	Nonaka, K., Chiba, T., Nakahara, S., Kajiura, Z. и Nakagaki, M.
<b>[11] Hokovirus_a</b>	GQ_869543	Viol. J. 7, 171 (2010)	Adlhoch, C., Kaiser, M., Ellerbrok, H. и Pauli, G.

[12] Hokovirus_b	EU_200677	J. Gen. Virol. 89 (PT 8), 1840-1848 (2008)	Lau,S.K., Woo,P.C., Tse,H., Fu,C.T., Au,W.K., Chen,X.C., Tsoi,H.W., Tsang,T.H., Chan,J.S., Tsang,D.N., Li,K.S., Tse,C.W., Ng,T.K., Tsang,O.T., Zheng,B.J., Tam,S., Chan,K.H., Zhou,B. и Yuen,K.Y.
[13] PPV4a	HM_031135	Virol. J. 7 (1), 333 (2010)	Huang,L., Zhai,S.L., Cheung,A.K., Zhang,H.B., Long,J.X. и Yuan,S.S
[14] PPV4b	GQ_387499	Arch. Virol. 155 (5), 801-806 (2010)	Cheung,A.K., Wu,G., Wang,D.; Bayles,D.O., Lager,K.M. и Vincent,A.L.
[15] PPV5B			
[16] PPV1	NC_001718	Virology 197 (1), 86-98 (1993)	Bergeron,J., Menezes,J. и Tijssen,P.

ФИГ. 6 показывает филогенетический анализ участка VP1/CAP PPV5B по сравнению с вирусным VP1 и капсидными белками, приведенными в Таблице 1.

5 ФИГ. 7 показывает идентичность капсидного белка PPV5B (остатки 184-851 последовательности SEQ ID NO: 4) по отношению к самому близкому родственному белку PPV4 (номер доступа GenBank AFM73881 (SEQ ID NO: 5)), который демонстрирует идентичность последовательности на уровне 53% (367/690).

10 ФИГ. 8 показывает идентичность белка репликазы PPV5B (остатки 1-594 последовательности SEQ ID NO: 2) по отношению к самому близкому родственному белку PPV4 (номер доступа GenBank ADF59557 (SEQ ID NO: 11)), который демонстрирует идентичность последовательности на уровне 87% (517/597).

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

15 Изобретение обеспечивает нуклеиновые кислоты и их фрагменты, полипептиды и их иммунологически эффективные фрагменты, вакцины, иммунологически эффективные препараты, антитела, диагностические анализы и наборы, а также

способы получения и использования указанных составов и препаратов, связанных с раскрытым в данной заявке новым парвовирусом свиней 5В и его вариантами.

5 Осуществление настоящего изобретения будет использовать, если не указано иное, традиционные методики молекулярной биологии, микробиологии, рекомбинантной ДНК, химии белка и иммунологии, которые являются известными специалистам в данной области техники. Такие методики являются подробно описанными в литературе. Смотри, например,

10 Sambrook, Fritsch & Maniatis, *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, Vols. I, II и III, 2-ое изд. (1989); *DNA Cloning*, Vols. I и II (D. N. Glover ред. 1985); *Oligonucleotide Synthesis* (M. J. Gait ред. 1984); *Nucleic Acid Hybridization* (B. D. Hames & S. J. Higgins ред. 1984); *Animal Cell Culture* (R. K. ред., 1986); *Immobilized Cells and Enzymes* (IRL изд., 1986); Perbal, B., *A Practical Guide to Molecular Cloning* (1984); серии, *Methods In Enzymology* (S. Colowick и N. Kaplan ред., Academic Press, Inc.); *Protein purification methods – a practical approach* (E.L.V. Harris и S. Angal ред., IRL Press at Oxford University Press); и *Handbook of Experimental Immunology*, тома I-IV (D. M. Weir и C. C. Blackwell ред., 1986, Blackwell Scientific Publications).

20 Перед описанием настоящего изобретения более подробно следует понимать, что данное изобретение не ограничивается конкретной ДНК, полипептидом или последовательностями или параметрами процессов, которые, конечно, могут варьировать. Также следует понимать, что используемая в данной заявке терминология предназначена только для цели описания конкретных вариантов осуществления изобретения и не предназначена для ограничения. Следует отметить, что, как используется в данном описании и прилагаемой формуле изобретения, формы единственного числа "любой" или "этот" включают ссылки на 25 множественное число, если из содержания явно не следует иное. Так, например, ссылка на "любой антиген" включает в себя смесь двух или более антигенов, ссылка на "любой наполнитель" включает смеси двух или более наполнителей и тому подобное.

#### А. Определения

Если не указано иное, то все технические и научные термины, используемые в данной заявке, имеют то же значение, как обычно это понимается специалистом в данной области техники, к которой относится это изобретение, на момент подачи заявки. Смысл и объем терминов должен быть ясен; однако, в случае какой-либо скрытой двусмысленности, определения, представленные в данной заявке, главенствуют над любым словарем или внешним определением. Кроме того, если иное не предусмотрено контекстом, то особые условия должны включать множества, а множественные термины будут включать единственное число. При этом использование союза "или" означает "и/или", если не указано иное. Кроме того, использование термина "включающий", а также других форм, таких как "включает" и "включенный" не является ограничивающим. Все патенты и публикации, упомянутые в настоящем документе, являются введенными в данную заявку в качестве ссылки.

"Защита от болезни", "протективный иммунитет", "функциональный иммунитет" и подобные фразы, означают ответ, направленный против заболевания или состояния, который вызывается путем введения одной или более терапевтических композиций в соответствии с изобретением, или их комбинации, что приводит к более сниженным вредным эффектам, чем можно было бы ожидать у неиммунизированного субъекта, который подвергся заболеванию или инфекции. То есть, тяжесть вредных эффектов инфекции уменьшается у вакцинированного субъекта. Заражение может быть снижено, замедлено или, возможно, полностью предотвращено, у вакцинированного субъекта. При этом когда подразумевается полное предотвращение инфекции, то это специально указывается. Если полное предотвращение не указано, то термин включает в себя частичное предотвращение.

В данной заявке "снижение частоты возникновения заболевания и/или клинических признаков" или "снижение клинических симптомов" означает, но не ограничивается таковыми, уменьшение количества инфицированных субъектов в группе, уменьшение или устранение количества субъектов, которые проявляют клинические признаки инфекции, или уменьшение тяжести каких-либо клинических симптомов, которые присутствуют у одного или более субъектов, по

сравнению с инфекцией дикого типа. Например, следует упомянуть любое снижение нагрузки патогена, выделения патогена, снижение передачи патогена или уменьшение любого клинического признака симптоматической инфекции PPV5B. Предпочтительно, когда эти клинические признаки снижаются у одного или более  
5 субъектов, получающих терапевтическую композицию в соответствии с настоящим изобретением, по крайней мере, на 10% по сравнению с субъектами, не получающими композицию и которые являются инфицированными. Более предпочтительно, когда клинические признаки уменьшаются у субъектов, получающих композицию в соответствии с настоящим изобретением, по крайней  
10 мере, на 20%, предпочтительно, по крайней мере, на 30%, более предпочтительно, по крайней мере, на 40%, и даже более предпочтительно, по крайней мере, на 50%.

Термин "повышенная защита" в данном документе означает, но не ограничивается такими, как значительное снижение одного или более клинических симптомов, которые связаны с инфицированием с помощью инфекционного агента,  
15 предпочтительно PPV5B, в группе вакцинированных субъектов против невакцинированной контрольной группы испытуемых. Термин "значительное снижение клинических симптомов" означает, но без ограничения таким, частоту возникновения, по крайней мере, одного клинического симптома в группе вакцинированных субъектов, которая является, по крайней мере, на 10%,  
20 предпочтительно на 20%, более предпочтительно на 30%, еще более предпочтительно на 50%, и даже более предпочтительно на 70% ниже, чем в невакцинированной контрольной группе после заражения инфекционным агентом.

"Длительная защита" относится к "улучшению эффективности", которая сохраняется в течение не менее 3 недель, но более предпочтительно, по крайней  
25 мере, 3 месяца, еще более предпочтительно, по крайней мере, 6 месяцев. У крупного рогатого скота наиболее предпочтительно, когда длительная защита будет сохраняться до достижения среднего возраста, при котором животные продаются на мясо.

"Иммуногенная или иммунологическая композиция" относится к композиции  
30 вещества, которая содержит, по крайней мере, один белок или полипептид PPV5B,

или его иммуногенную часть, которая вызывает у хозяина опосредованный клетками или антителами иммунный ответ на композицию. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения иммуногенная композиция вызывает иммунный ответ и, более предпочтительно, обеспечивает протективный иммунитет в отношении одного или более из клинических признаков инфекции PPV5B.

Термин "иммуногенный" PPV5B полипептид или "антиген", используемый в данной заявке, относится к полипептиду или белку, который вызывает иммунный ответ, как описано в настоящем описании. "Иммуногенный" белок или полипептид PPV5B содержит полную последовательность любой из кодируемых последовательностей, указанных в настоящем документе, или их аналоги или их иммуногенные фрагменты. Термин "иммуногенный фрагмент" или "иммуногенная часть" относится к фрагменту или усеченной и/или замещенной форме аминокислотной последовательности PPV5B белка, которая включает один или более эпитопов и, таким образом, вызывает иммунный ответ, описанный в данной заявке. В общем случае, такие усеченные и/или замещенные формы или фрагменты будут содержать или кодировать, по крайней мере, 13 последовательных аминокислот из полного белка, например, белка капсида. Более предпочтительно, когда усеченные или замещенные формы или фрагменты будут содержать, по крайней мере, 15, более предпочтительно, по крайней мере, 17, и еще более предпочтительно, по крайней мере, 20, и даже более предпочтительно, 30 смежных аминокислот из полного белка, например, белка капсида

Термин "эпитоп" означает сегмент или фрагмент композиции вещества, например, белка или полипептида, который распознается иммунной системой, в частности, антителами, В-клетками или Т-клетками. В настоящем изобретении, как правило, эпитоп в общем случае представляет собой фрагмент или фрагменты полипептидной последовательности вирусного белка.

Такие фрагменты могут быть идентифицированы при использовании любой из ряда методик, которые используются для картирования эпитопов и которые являются хорошо известными в данной области техники. Смотри, например, Epitope Mapping

Protocols in Methods in Molecular Biology, Vol. 66 (Glenn E. Morris, ред., 1996) Humana Press, Totowa, New Jersey. Например, линейные эпитопы могут быть определены с помощью одновременного синтеза большого количества пептидов на твердых подложках, определения пептидов, соответствующих частям белковой молекулы и взаимодействия пептидов с антителами, в то время как пептиды все еще остаются присоединенными к подложкам. Такие методики известны и описаны в данной области техники, смотри, например, патент США № 4708871; Geysen и др. (1984) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:3998-4002; и Geysen и др. (1986) Molec. Immunol. 23:709-715. Аналогично, конформационные эпитопы легко идентифицируются с помощью определения пространственной конформации аминокислот, например, путем рентгеновской кристаллографии и двумерного ядерного магнитного резонанса. Смотри, Epitope Mapping Protocols, как описано выше. Синтетические антигены также являются включенными в определение, например, полиэпитопы, фланкирующие эпитопы и другие рекомбинантные или синтетически полученные антигены. Смотри, например, Bergmann и др. (1993) Eur. J. Immunol. 23:2777-2781; Bergmann и др. (1996), J. Immunol. 157:3242-3249; Suhrbier, A. (1997), Immunol. и Cell Biol. 75:402-408; и Gardner и др., (1998) 12-ая всемирная конференция по СПИДу, Женева, Швейцария, 28 июля 1998 года. (Раскрытие и содержание которых являются включенными в данную заявку в качестве ссылки.)

"Иммунный ответ" или "иммунологический ответ" означает, но не ограничивается таковыми, развитие клеточного и/или опосредованного антителами иммунного ответа на композиции или вакцины, представляющие интерес. Как правило, иммунный или иммунологический ответ включает в себя, но не ограничивается таковыми, как один или более из следующих эффектов: продукция или активация антител, В-клеток, Т-хелперов, супрессорных Т-клеток и/или цитотоксических Т-клеток, непосредственно направленные на антиген или антигены, включенные в композиции или вакцины, представляющие интерес. Предпочтительно, хозяин будет демонстрировать либо терапевтический, либо защитный иммунологический (иммунологическая память) ответ так, что сопротивление новой инфекции будет усиливаться и/или клиническая тяжесть заболевания будет снижаться. Такая защита

будет продемонстрироваться либо сокращением количества симптомов, тяжести симптомов, либо отсутствием одного или более симптомов, связанных с инфекцией патогеном, задержкой наступления вирусемии, снижением вирусной персистенции, снижением общей вирусной нагрузки и/или уменьшением экскреции вируса.

5 В данной заявке "специфически иммунореактивный" относится к иммунореактивному белку или полипептиду, который распознает антиген, характерный для PPV5B инфекции, но не реагирует с антигеном строгого имуногенного контроля. Для того чтобы определить специфичность  
10 потенциального PPV5B иммунореактивного белка или полипептида или другого полипептида, можно использовать различные иммунологические анализы (ELISA, IFA, вестерн-блоттинг анализ) для исследования белка, направленного против сыворотки животного, содержащей генетически подобные вирусы. Белок будет также подвергаться анализу в различных иммунологических анализах против  
15 материала, содержащего белки, связанные со способом экспрессии (бакуловирус, клетки Sf9, и т.д.).

Как используется в данной заявке, термин "фармацевтически или ветеринарно приемлемый носитель" или "наполнитель" включает любой и все растворители, дисперсионные среды, покрытия, адъюванты, стабилизирующие агенты, разбавители, консерванты, антибактериальные и противогрибковые агенты,  
20 изотонические агенты, агенты, замедляющие адсорбцию, и подобные им. В некоторых предпочтительных вариантах реализации, и особенно в тех, которые включают лиофилизированные иммуногенные композиции, стабилизирующие агенты для использования в настоящем изобретении, включают стабилизаторы для лиофилизации или сушки вымораживанием.

25 В некоторых воплощениях иммуногенная композиция в соответствии с настоящим изобретением содержит адъювант. "Адъюванты", как используется в данной заявке, могут включать гидроксид алюминия и фосфат алюминия, сапонины, например, Quil A, QS-21 (Cambridge Biotech Inc., Cambridge MA), GPI-0100 (Galenica Pharmaceuticals, Inc., Birmingham, AL), эмульсию вода-в-масле, масло-в-воде, вода-  
30 в-масле-в-воде. Эмульсия может основываться, в частности, на легком вазелиновом

масле (в соответствии с европейской фармакопеей); изопреноидном масле, таком, как сквалан или сквален; масле, полученном в результате олигомеризации алкенов, в частности, изобутена или децена; сложных эфирах кислот или спиртов, содержащих линейную алкильную группу, в частности, растительное масло, этилолеат, пропиленгликоль ди-(каприлат/капрат), глицерил три-(каприлат/капрат) или пропиленгликоль диолеат; сложных эфирах разветвленных жирных кислот или спиртов, в частности, сложных эфирах изостеариновой кислоты. Масло используют в комбинации с эмульгаторами с образованием эмульсии. Эмульгаторы предпочтительно представляют собой неионные поверхностно-активные вещества, в частности, сложные эфиры сорбитана, маннита (например, олеат ангидроманнита), гликоля, полиглицерина, пропиленгликоля и олеиновой, изостеариновой, рицинолеиновой или гидроксистеариновой кислоты, которые необязательно являются этоксилированными, и блоки сополимера полиоксипропилена-полиоксиэтилена, в частности, продукты Pluronic, в частности, L121. Смотри Hunter *и др.*, *The Theory и Practical Application of Adjuvants* (Ed. Stewart-Tull, D. E. S.), JohnWiley and Sons, NY, стр. 51-94 (1995) и Todd *и др.*, *Vaccine* 15:564-570 (1997). Типичные адьюванты представляют собой SPT эмульсию, описанную на стр. 147 "Vaccine Design, The Subunit and Adjuvant Approach" под ред. M. Powell и M. Newman, Plenum Press, 1995, и эмульсию MF59, описанную на стр. 183 этого же источника.

Еще одним примером адьюванта является соединение, выбранное из полимеров акриловой или метакриловой кислоты и сополимеров малеинового ангидрида и алкенильных производных. Предпочтительные адьювантные соединения представляют собой полимеры акриловой или метакриловой кислоты, которые являются перекрестно связанными, в частности, с полиалкениловыми эстерами сахаров или многоатомных спиртов. Эти соединения являются известными под термином карбомер (Фармакопея том 8, № 2, июнь 1996 г.). Специалисты в данной области техники могут также сослаться на патент США №2909462, который описывает такие акриловые полимеры, перекрестно сшитые с полигидроксилированным соединением, имеющим по крайней мере, 3 гидроксильные группы, предпочтительно не более 8, при этом атомы водорода, по

крайней мере, трех гидроксильных групп заменяются ненасыщенными алифатическими радикалами, содержащими, по крайней мере, 2 атома углерода. Предпочтительные радикалы представляют собой такие, которые содержат от 2 до 4 атомов углерода, например винилы, аллилы и другие этилен-ненасыщенные группы. Ненасыщенные радикалы сами по себе могут содержать другие заместители такие, как метил. Продукты, которые продаются под названием Carborol; (BF Goodrich, штат Огайо, США) являются особенно приемлемыми. Они являются перекрестно сшитыми с аллилсахарозой или пентаэритритолом. Среди них могут быть упомянуты Carborol 974P, 934P и 971P. Наиболее предпочтительным является использование Carborol 971P. Среди сополимеров малеинового ангидрида и производного алкенила следует упомянуть сополимеры ЕМА (Monsanto), которые представляют собой сополимеры малеинового ангидрида и этилена. Растворение этих полимеров в воде приводит к получению кислотного раствора, который будет нейтрализован, предпочтительно до физиологического значения рН, для того, чтобы ввести раствор адьювантов, в который будет включена иммуногенная или иммунологическая вакцина.

Другие подходящие вспомогательные вещества представляют собой, но не ограничиваются таковыми, адьювантную систему RIBI (Ribi Inc.), блок сополимер (CytRx, Atlanta GA), SAF-M (Chiron, Emeryville CA), монофосфорил липид А, адьювант Avridine на основе липид-амин, термолабильный энтеротоксин из *E.coli* (рекомбинантный или иной), холерный токсин, IMS 1314 или мурамилдипептид, либо природные, либо рекомбинантные цитокинины или их аналоги, или стимуляторы высвобождения эндогенных цитокинов, среди прочих.

Ожидается, что адьювант может быть добавлен в количестве от примерно 100 мкг до примерно 10 мг на дозу, предпочтительно в количестве от примерно 500 мкг до примерно 5 мг на дозу, более предпочтительно в количестве от примерно 750 мкг до примерно 2,5 мг на дозу, а большинство предпочтительно в количестве приблизительно 1 мг на дозу. Кроме того, адьювант может находиться в концентрации приблизительно от 0,01 до 50%, предпочтительно в концентрации приблизительно от 2% до 30%, более предпочтительно в концентрации

приблизительно от 5% до 25%, еще более предпочтительно в концентрации приблизительно от 7% до 22% и наиболее предпочтительно в концентрации от 10% до 20% от объема конечного продукта.

5 "Разбавители" могут включать воду, солевой раствор, декстрозу, этанол, глицерин и тому подобное. Изотонические агенты могут включать хлорид натрия, декстрозу, маннит, сорбит и лактозу, среди прочих. Стабилизаторы включают альбумин и щелочные соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, среди прочих.

10 "Изолированный" означает "измененный рукой человека" по сравнению с его естественным состоянием, то есть, если это происходит в природе, то он был изменен или удален из своей первоначальной окружающей среды или и то, и  
15 другое. Например, полинуклеотид или полипептид, который естественным образом присутствуют в живом организме не является "изолированным", но тот же полинуклеотид или полипептид, отделенный от сосуществующих с ним материалов в его естественном состоянии, является "изолированным" в том значении, как этот термин используется в данном документе.

"Безопасность" относится к отсутствию побочных эффектов у вакцинированных животных после вакцинации, в том числе, но не ограничиваясь таковыми: потенциальное превращение живой вирусной вакцины в вирулентную, клинически  
20 значимые побочные эффекты такие, как стойкие, системные болезни или неприемлемое воспаления в сайте введения вакцины.

Термины "вакцинация" или "вакцинирующий" или их варианты, как они используются в данной заявке, означают, но не ограничиваются такими, как процесс, который включает в себя введение иммуногенной композиции в соответствии с изобретением, которая при введении в организм животного,  
25 вызывает или может вызывать - непосредственно или опосредовано - иммунный ответ у животного против PPV5B.

"Смертность" в контексте настоящего изобретения относится к смерти, вызванной инфекцией PPV5B и/или сопутствующими инфекциями другими организмами,

которые усиливаются PPV5B инфекцией, и включает ситуацию, когда инфекция является настолько тяжелой, что животное подвергают эвтаназии, чтобы предотвратить страдания и обеспечить гуманное окончание его жизни.

5 "Аттенуирование" означает снижение вирулентности возбудителя. В настоящем изобретении "аттенуирование" является синонимом "авирулентности." В настоящем изобретении аттенуированный вирус представляет собой такой, в котором вирулентность была уменьшена так, что он не вызывает клинических признаков инфекции PPV5B, но способен индуцировать иммунный ответ у целевого млекопитающего, а также может означать, что клинические признаки снижаются в  
10 отношении частоты возникновения заболевания или тяжести у животных, зараженных ослабленным PPV5B, по сравнению с "контрольной группой" животных, инфицированных с помощью неаттенуированного PPV5B, и тех, которые не получают аттенуированный вирус. В этом контексте термин "снижение/сниженный" означает уменьшение, по крайней мере, на 10%,  
15 предпочтительно на 25%, еще более предпочтительно на 50%, еще более предпочтительно на 60%, даже более предпочтительно на 70%, еще более предпочтительно на 80%, еще более предпочтительно на 90% и наиболее предпочтительно на 100%, по сравнению с контрольной группой, как определено выше. Таким образом, аттенуированный авирулентный штамм PPV5B представляет  
20 собой такой, который является приемлемым для включения в состав иммуногенной композиции, содержащей модифицированный живой вирус PPV5B.

"Убитый" или "инактивированный" означает обработанный с помощью физического или химического агента, который приводит к тому, что вирус PPV5B становится мертвым и/или иным неспособным к размножению. PPV5B может быть  
25 убит с помощью обычных средств таких как, например, воздействие тепла, радиации или псоралена в присутствии ультрафиолетового света. PPV5B можно инактивировать с помощью обычных средств, таких как, например, с помощью химической инактивации с использованием одного или более химических агентов для инактивации, включая, но не ограничиваясь таковыми, один или более из  
30 бинарного этиленимина (BEI), пропиолактона, формалина, глутаральдегида и/или

додецилсульфата натрия. Способы ослабления вирулентных штаммов этих вирусов и способы получения инактивированного вирусного препарата являются известными в данной области и описаны, например, в патентах США №4567042 и №4567043. Антигены из PPV5B для использования в вакцинных композициях в соответствии с настоящим изобретением могут, таким образом, быть в виде цельного вируса, который представляет собой модифицированный и/или аттенуированный живой вирусный препарат, или убитый, или инактивированный вирусный препарат, среди прочих.

Термин "антитела", как используется в данной заявке, включает в себя анти-PPV5B антитела, например, моноклональные и поликлональные антитела, одноцепочечные антитела, химерные антитела, гуманизированные антитела, антитела человека, свиньи и CDR-привитые антитела, в том числе соединения, которые включают CDR последовательности, которые специфически распознают полипептид PPV5B в соответствии с изобретением. Термин "специфические для" указывает на то, что переменные области антител в соответствии с изобретением узнают и связывают исключительно PPV5B полипептид (т.е. являются в состоянии отличить единственный PPV5B полипептид от родственных полипептидов, несмотря на идентичность последовательностей, гомологию или сходство, которое обнаруживается в семействе полипептидов), и которые могут (не обязательно) взаимодействовать с другими белками (например, белком A *S. aureus* или другими стафилококковыми антителами в методах ELISA) посредством взаимодействия с последовательностями за пределами переменного участка антител и, в частности, в константном участке молекулы антитела. Анализы скрининга для определения специфичности связывания антитела в соответствии с изобретением являются хорошо известными и обычно практикуется в данной области техники. Для всестороннего обсуждения таких анализов смотри Harlow и др. (ред.), *Antibodies A Laboratory Manual: Cold Spring Harbor Laboratory; Cold Spring Harbor, NY (1988)*, глава 6. Антитела, которые распознают и связывают фрагменты PPV5B полипептидов в соответствии с настоящим изобретением, также рассматриваются, при условии, что антитела являются, в первую очередь, специфичными для PPV5B полипептида в соответствии с изобретением, как определено выше, из которого

этот фрагмент получен. Для целей ясности следует уточнить, что "антитело" относится к молекуле иммуноглобулина, которая может связываться со специфическим антигеном в результате иммунного ответа на этот антиген. Иммуноглобулины представляют собой сывороточные белки, состоящие из "легких" и "тяжелых" полипептидных цепей, имеющих "константные" и "вариабельные" участки и делятся на классы (например, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM и) на основе состава константного участка. Антитела могут существовать в различных формах, включая такие формы, как, Fv, Fab', F(ab')<sub>2</sub>, а также в виде одиночных цепей, и включают синтетические полипептиды, которые содержат все или часть одной или более полипептидных последовательностей одиночной цепи антитела.

В данной заявке "эффективная доза" означает, но не ограничивается таковыми, как количество антигена, которое вызывает или способно вызывать иммунный ответ, который обеспечивает уменьшение клинических симптомов у животного, которому вводят антиген.

Как используется в данной заявке, термин "эффективное количество" означает в контексте композиции количество иммуногенной композиции, способной индуцировать иммунный ответ, который уменьшает частоту или тяжесть инфекции, или частоту возникновения заболевания у животного. В частности, эффективное количество препарата живого аттенуированного вируса, как измеряется количеством бляшкообразующих единиц (БОЕ) на дозу или в эквивалентной мере, подвергается мониторингу при использовании средней инфекционной дозы культуры ткани (TCID<sub>50</sub>), то есть, количества патогенного агента, который будет вызывать патологические изменения в 50% инокулированных и чувствительных клеток культуры. Для убитой вакцины или антигенной субъединицы эффективное количество относится к относительному содержанию антигена (RAC), то есть, к уровню включения антигена на эффективную дозу. Кроме того, в контексте терапии термин "эффективное количество" относится к количеству терапии, которое является достаточным для того, чтобы снизить или ослабить тяжесть или продолжительность заболевания или расстройства, или их одного или более симптомов, предотвратить развитие заболевания или расстройства, вызвать

регрессию заболевания или расстройства, предотвратить рецидив, развитие, начало или прогрессирование одного или более симптомов, связанных с заболеванием или расстройством, или усиливать, или улучшить профилактику или лечения другой терапии или терапевтического агента.

5 "Идентичность последовательности", как это является известным в данной области техники, относится к отношениям между двумя или более полипептидными последовательностями или двумя или более полинуклеотидными последовательностями, в частности, референтной последовательности и заданной последовательности, для того, чтобы сравнить ее с референтной последовательностью. Идентичность последовательности определяется посредством сравнения данной последовательности и референтной последовательности после того, как последовательности были оптимально выровнены для получения самой высокой степени сходства последовательности, как определяется путем сравнения цепочек таких последовательностей, при 10 использовании пробелов, введенных в случае необходимости. После такого выравнивания идентичность последовательности определяется на основе положение-к-положению, например, последовательности являются "идентичными" в определенном положении, если в этом положении нуклеотиды или аминокислотные остатки являются идентичными. Общее количество таких 15 идентичных положений затем делится на общее число нуклеотидов или остатков в референтной последовательности, чтобы получить % идентичности последовательности. Идентичность последовательностей может быть легко вычислена с помощью известных способов, включая, но не ограничиваясь 20 такими, как те, что описаны в Computational Molecular Biology, Lesk, A. N., ред., Oxford University Press, New York (1988), Biocomputing: Informatics and Genome Projects, Smith, D.W., ред., Academic Press, New York (1993); Computer Analysis of Sequence Data, часть I, Griffin, A.M., и Griffin, H. G., ред., Humana Press, New Jersey (1994); Sequence Analysis in Molecular Biology, von Heinge, G., Academic Press (1987); Sequence Analysis Primer, Gribskov, M. и Devereux, J., ред., M. Stockton Press, 25 New York (1991); и Carillo, H., и Lipman, D., SIAM J. Applied Math., 48: 1073 (1988); раскрытие которых является введенным в данную заявку в качестве ссылки. 30

Предпочтительные способы определения идентичности последовательностей разработаны для того, чтобы обеспечить наибольшее совпадение между исследуемыми последовательностями. Способы определения идентичности последовательностей кодифицированы в общедоступных компьютерных программах, определяющих идентичность между данными последовательностями. Примеры таких программ включают, но не ограничиваются такими, как, пакет программ GCG (Devereux, J., и др., *Nucleic Acids Research*, 12(1): 387 (1984)), BLASTP, BLASTN и BLASTX (Altschul, S. F. и др., *J. Molec. Biol.*, 215:403-410 (1990)). Программа BLASTX является доступной от NCBI и других источников (BLAST Manual, Altschul, S. и др., NCVI NLM NIH Bethesda, MD 20894, Altschul, SF и др., *J. Biol Molec*, 215:.... 403-410 (1990), содержание которых является включенным в настоящее описание в качестве ссылки). Эти программы оптимально выравнивают последовательности при использовании штрафов за открытие гэпа по умолчанию для того, чтобы получить самый высокий уровень идентичности при сравнении рассматриваемой и референтной последовательностей. В качестве иллюстрации, под полинуклеотидом, который имеет последовательность нуклеотидов, являющуюся, по крайней мере, например, на 85%, предпочтительно на 90%, еще более предпочтительно на 95% идентичной с референтной нуклеотидной последовательностью, понимают тот факт, что нуклеотидная последовательность данного полинуклеотида является идентичной референтной последовательности за исключением того, что данная полинуклеотидная последовательность может включать вплоть до 15, предпочтительно вплоть до 10, еще более предпочтительно вплоть до 5 точечных мутаций на каждые 100 нуклеотидов референтной нуклеотидной последовательности. Другими словами, в полинуклеотиде с последовательностью нуклеотидов, имеющей, по крайней мере, 85%, предпочтительно 90%, еще более предпочтительно 95% идентичности по сравнению с референтной нуклеотидной последовательностью, вплоть до 15%, предпочтительно 10%, даже более предпочтительно 5% нуклеотидов в референтной последовательности может быть удалено или заменено другим нуклеотидом или несколькими нуклеотидами, или вплоть до 15%, предпочтительно 10%, еще более предпочтительно 5% от общего объема нуклеотидов в референтной

последовательности может быть встроено в референтную последовательность. Эти мутации референтной последовательности могут иметь место в 5 'или 3' концевых положениях референтной нуклеотидной последовательности или где-нибудь между этими концевыми положениями, при этом они могут перемежаться либо  
5 индивидуально среди нуклеотидов в референтной последовательности, либо в одной или более смежных группах референтной последовательности. Аналогично, под полипептидом, характеризующимся заданной аминокислотной последовательностью, имеющим, по крайней мере, например, 85%, предпочтительно 90%, еще более предпочтительно 95% идентичности по  
10 отношению к референтной аминокислотной последовательности, понимают тот факт, что данная аминокислотная последовательность полипептида является идентичной референтной последовательности за исключением того, что данная последовательность полипептида может включать в себя вплоть до 15, предпочтительно вплоть до 10, еще более предпочтительно вплоть до 5  
15 аминокислотных изменений на каждые 100 аминокислот референтной аминокислотной последовательности. Другими словами, для получения данной полипептидной последовательности, которая имеет, по крайней мере, 85%, предпочтительно 90%, еще более предпочтительно 95% идентичности последовательности с референтной аминокислотной последовательностью, вплоть  
20 до 15%, предпочтительно вплоть до 10%, еще более предпочтительно вплоть до 5% остатков аминокислот в референтной последовательности может быть удалено или замещено другой аминокислотой или количество аминокислот вплоть до 15%, предпочтительно вплоть до 10%, еще более предпочтительно вплоть до 5% от общего количества аминокислотных остатков в референтной последовательности  
25 может быть встроено в референтную последовательность. Эти изменения референтной последовательности могут иметь место в амино- или карбокситерминальных положениях референтной аминокислотной последовательности, перемежаясь либо индивидуально между остатками в референтной последовательности, либо в одной или более смежных групп в  
30 пределах референтной последовательности. Предпочтительно, положения остатков, которые не являются идентичными, отличаются консервативными

аминокислотными заменами. Тем не менее, консервативные замены не включены как совпадения при определении идентичности последовательности.

“Гомология последовательности”, как используется в данной заявке, относится к способу определения родства двух последовательностей. Для того чтобы  
5 определить гомологию последовательности две или более последовательностей подвергаются оптимальному выравниванию, и, при необходимости, вводятся пробелы. Тем не менее, в отличие от “идентичности последовательности”, консервативные замены аминокислот, также считаются как совпадения при определении гомологии последовательности. Другими словами, для получения  
10 полипептида, имеющего 95% гомологии последовательности с референтной последовательностью, 85%, предпочтительно 90%, даже более предпочтительно 95%, остатки аминокислот в референтной последовательности должны совпадать или содержат консервативную замену другой аминокислотой, или количество аминокислот вплоть до 15%, предпочтительно вплоть до 10%, еще более  
15 предпочтительно вплоть до 5% от общего количества аминокислотных остатков, в том числе неконсервативных замен, в референтной последовательности может быть встроено в референтную последовательность. Предпочтительно, гомологичная последовательность включает, по крайней мере, участок из 50, даже более предпочтительно из 100, даже более предпочтительно из 250, даже более  
20 предпочтительно из 500 нуклеотидов, кодирующих гомологичные аминокислоты.

Термин “консервативная замена” относится к замене аминокислотного остатка на другой аминокислотный остаток, который имеет аналогичные характеристики или свойства, включая размер, гидрофобность и т.д., таким образом, что общая функциональность существенно не изменяется. Это также может означать  
25 нуклеотидную замену, которая приводит к консервативной аминокислотной замене.

### В. Молекулы носителя

Молекулы носителя, с которыми могут быть конъюгированы или ковалентно связаны PPV5B белки или пептиды в соответствии с изобретением, предпочтительно представляют собой те, которые описаны выше.

Предпочтительные носители для использования у животных представляют собой бычий сывороточный альбумин и гемоцианин лимфы улитки. Предпочтительно, когда сам белок носителя представляет собой иммуноген.

5 PPV5B белки или пептиды в соответствии с изобретением могут быть ковалентно связаны с носителем любым удобным способом, известным в данной области техники. Несмотря на то, что использование симметричного линкера такого, как дигидразид адипиновой кислоты, как описано Schneerson и др., *J. Experimental Medicine*, 152, 361-376 (1980), или гетеробифункционального линкера такого, как N-сукцинимидил-3-(2-пиридилдитио)пропионат, как описано Fattom и др., *Infection and Immunity*, 56, 2292-2298 (1988), находится в пределах объема настоящего изобретения, является предпочтительным избежать использования какого-либо линкера, но вместо этого соединять PPV5B пептид в соответствии с изобретением непосредственно с молекулой носителя. Такое соединение может быть получено посредством восстановительного аминирования, как описано Landi и др., *J.*  
10  
15 *Immunology*, 127, 1011-1019 (1981).

Размер иммуногенной композиции, как определяется средним молекулярным весом, является переменной величиной и зависит от выбранного(ых) PPV5B белка(ов) или пептида(ов) и способа слияния PPV5B белка(ов) или пептида(ов) с носителем. Таким образом, он может быть таким малым, как 1000 дальтон ( $10^3$ ) или большим, чем  $10^6$  дальтон. При использовании способа слияния путем восстановительного аминирования молекулярная масса PPV5B белка(ов) или пептида(ов), как правило, находится в диапазоне от 5000 до 500000 дальтон или более; например, для капсидного белка последовательности SEQ ID NO: 4, молекулярная масса, как ожидается, составит примерно 101000 дальтон, что, как предполагают,  
20  
25 обеспечивает образование вирусоподобных частиц (VLP), состоящих из 60 мономерных белков.

Молекулы носителя, т.е. пептиды, их производные и аналоги, а также пептидные миметики, которые специфически связываются с белком PPV5B или пептидом в соответствии с изобретением, могут быть получены различными способами,  
30 известными в данной области техники, в том числе, но не ограничиваясь таковыми,

как твердофазный синтез или при использовании раствора (Nakanishi и др., 1993, Gene 137: 51-56; Merrifield, 1963, J. Am. Chem. Soc. 15: 2149-2154; Neurath, H. и др., ред., The Proteins, том II, 3-ья ред., стр. 105-237, Academic Press, New York, N.Y. (1976), указанные источники являются введенными в данное описание в качестве ссылки).

PPV5B белки или пептиды в соответствии с изобретением или антитела или их связывающие части в соответствии с настоящим изобретением могут быть введены при использовании инъеклируемых дозированных форм в виде раствора или суспензии в разбавителе с фармацевтическим или ветеринарным носителем.

10 Безопасность и эффективность таких молекул определяется с помощью стандартных процедур на клеточных культурах или на экспериментальных животных, как описано и регулируется Центром ветеринарной медицины (CVB). Токсичность и терапевтическая эффективность таких молекул может быть определена с помощью стандартных фармацевтических процедур на клеточных культурах или экспериментальных животных, например, для определения LD<sub>50</sub> (дозы, которая является летальной для 50% популяции).

20 Вакцины в соответствии с настоящим изобретением могут представлять собой поливалентные или одновалентные. Поливалентные вакцины получают путем иммуноконъюгации множественных белков или пептидов PPV5B с молекулой носителя.

В одном из аспектов белок или пептидные композиции PPV5B содержат эффективное иммунизирующее количество иммуногенного конъюгата, предпочтительно в комбинации с иммуностимулятором; и физиологически приемлемый носитель. Как используется в данном контексте, "иммуностимулятор" охватывает любое соединение или композицию, которая обладает способностью усиливать активность иммунной системы, будь-то специфический эффект потенцирования в комбинации со специфическим антигеном, или просто независимое влияние на активность одного или более элементов иммунного ответа. Иммуностимуляторные соединения включают, но не ограничиваются таковыми, как

- минеральные гели, например, гидроксид алюминия; поверхностно-активные вещества, такие как лизолецитин, полиолы Pluronic; полианионы; пептиды; масляные эмульсии; квасцы и MDP. Способы с использованием этих материалов являются хорошо известными в данной области техники, и в пределах компетенции
- 5 специалиста в данной области является определить оптимальное количество стимулятора для данной вакцины. В данной композиции может использоваться более чем один иммуностимулятор. Иммуноген может также быть включен в липосомы или конъюгирован с полисахаридами и/или другими полимерами для использования в композиции вакцины.
- 10 Композиции, если это является желательным, могут быть представлены в упаковке или дозирующем устройстве, которое может содержать одну или более стандартных лекарственных форм, содержащих активный ингредиент. Упаковка может, например, содержать металлическую или пластиковую упаковку, такую как блистерная упаковка. Упаковка или устройство дозатора может сопровождаться
- 15 инструкциями в отношении введения, предпочтительно для введения млекопитающему, в частности, свинье.

### C. Адьюванты

- Для дополнительного повышения иммуногенности иммуногенные композиции, которые обеспечиваются в данной заявке и которые содержат один или более
- 20 PPV5B белков или пептидов, могут также содержать один или более адьювантов.

- Адьювант может быть очищен с помощью любого из способов, описанных ранее или известных в данной области техники. Предпочтительным способом очистки является хроматография на силикагеле, в частности, "флэш" (быстрый) хроматографический способ, как описано W. Clark и др., J. Organic Chemistry, 43, 2923-2925 (1978). Тем не менее, другие хроматографические способы, в том числе
- 25 ВЭЖХ, могут быть использованы для очистки адьюванта. Кристаллизация также может использоваться для очистки адьюванта. В некоторых случаях никакой очистки не требуется, поскольку продукт с аналитической степенью чистоты получают непосредственно путем синтеза.

Вакцинные композиции в соответствии с настоящим изобретением получают путем физического смешивания адьюванта с РРV5В белком(ами) или пептида(ами) в соответствующих стерильных условиях в соответствии с известными методами для получения композиции с адьювантом. Комплексообразование РРV5В белка(ов) или пептида(ов) и адьюванта облегчается наличием суммарного отрицательного заряда на конъюгате, который электростатически притягивается к положительному заряду, присутствующему на длинноцепочечных алкильных соединениях адьюванта.

#### Д. Физиологически приемлемые носители

Вакцинные композиции в соответствии с данным изобретением могут быть приготовлены с использованием способов, аналогичных тем, которые используются для других фармацевтических полипептидных композиций. Таким образом, адьювант и РРV5В белок(белки) или пептид(ы), предпочтительно конъюгированный(е) с молекулой носителя и/или смешанный(е) с адьювантом, могут храниться в лиофилизированной форме и могут восстанавливаться в физиологически приемлемом носителе с образованием суспензии перед введением. Кроме того, конъюгат и адьювант могут храниться в носителе. Предпочтительные носители представляют собой стерильные растворы, в частности, стерильные буферные растворы такие, как фосфатно-солевой буфер. Любой способ сочетания адьюванта и конъюгата в носителе, таким образом, что улучшается иммунологическая эффективность иммуногенной композиции, является приемлемым.

Объем единичной дозы вакцины в соответствии с данным изобретением может варьировать, но будет в общем случае находиться в пределах диапазонов, которые обычно используются в обычных вакцинах. Объем единичной дозы предпочтительно составляет от приблизительно 0,1 мл до приблизительно 3 мл, предпочтительно от приблизительно 0,2 мл до 1,5 мл, более предпочтительно приблизительно 1,0 мл при концентрации конъюгата и адьюванта, указанных выше.

Вакцинные композиции в соответствии с настоящим изобретением могут быть введены с помощью любого удобного средства.

## Е. Композиция

Иммуногенные конъюгаты, включающие PPV5B белок(белки) или пептид(ы), слитый(е) с молекулой носителя, могут быть использованы в качестве вакцины для иммунизации против одного или более серотипов PPV5B. Вакцины, содержащие иммуногенный конъюгат в физиологически приемлемом носителе, являются пригодными в способе иммунизации животных, предпочтительно свиней, для лечения или профилактики инфекций, вызванных PPV5B.

Антитела, полученные против иммуногенных конъюгатов в соответствии с настоящим изобретением путем иммунизации при использовании иммуногенного конъюгата, могут быть использованы в пассивной иммунотерапии и для получения антиидиотипических антител для лечения или профилактики инфекции PPV5B.

Субъект, которому вводится композиция, предпочтительно представляет собой животных, в том числе, но не ограничиваясь таковыми, как коровы, лошади, овцы, свиньи, домашняя птица (например, куры) козы, кошки, собаки, хомяки, мыши и крысы; наиболее предпочтительными являются свиньи.

Композиции в соответствии с изобретением содержат эффективное иммунизирующее количество одной или более иммуногенных композиций или антитела к ним и физиологически приемлемый носитель. Вакцины содержат эффективное иммунизирующее количество одной или более иммуногенных композиций и физиологически приемлемый носитель. Композиция должна быть приемлемой для способа введения.

Иммуногенная композиция, если это является желательным, может также содержать незначительные количества смачивающих или эмульгирующих агентов или рН буферирующих агентов. Иммуногенная композиция может представлять собой жидкий раствор, суспензию, эмульсию, таблетки, пилюли, капсулы, композицию замедленного высвобождения или порошок. Пероральные препараты могут включать стандартные носители такие, как маннит, лактоза, крахмал, стеарат магния, сахарин натрия, целлюлоза, карбонат магния и т.п.

## Г. Эффективная доза

Соединения, описанные в данной заявке, могут быть введены субъекту в терапевтически эффективных дозах для лечения ассоциированных с PPV5B заболеваний. Дозировка будет зависеть от хозяина, который получает вакцину, а также от таких факторов, как размер, вес и возраст хозяина.

Точное количество иммуногенного конъюгата или антитела в соответствии с изобретением, которое используется в композиции, будет зависеть от пути введения и природы субъекта (например, вид, возраст, размер, стадия/уровень развития заболевания), и этот вопрос должен быть решен в соответствии с заключением лечащего врача и обстоятельствами для каждого субъекта в соответствии со стандартными клиническими методиками. Эффективное иммунизирующее количество представляет собой количество, достаточное для лечения или профилактики PPV5B инфекционного заболевания у субъекта. Эффективные дозы могут также быть выведены из кривых зависимости ответа от дозы, полученных из тест-систем для животных моделей, и могут изменяться от 0,1 мг/кг до 20 мг/кг, предпочтительно от 1 мг/кг до 10 мг/кг.

Иммуногенность композиции может быть определена с помощью мониторинга иммунного ответа исследуемых субъектов после иммунизации при использовании композиции с помощью любого иммуноанализа, известного в данной области техники. Получение гуморального (антитела) ответа и/или опосредованного клетками иммунитета, может быть принято в качестве показателя иммунного ответа. Исследуемые субъекты могут включать в себя животных таких, как свиньи, мыши, хомяки, собаки, кошки, кролики, коровы, лошади, овцы и птицы (например, куры, утки, гуси, индюки).

Иммунный ответ исследуемых субъектов может быть проанализирован с помощью различных подходов, таких как: реактивность полученной иммунной сыворотки по отношению к иммуногенному конъюгату, как оценивается с помощью известных методов, например, твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA), иммуноблоттинга, иммунопреципитации и т.д.; или путем защиты

иммунизированных хозяев от инфекции патогеном и/или ослабления симптомов, вызванных инфекцией патогеном, у иммунизированных хозяев, как определяется в соответствии с любым из способов, известных в данной области техники для количественной оценки уровней агента инфекционного заболевания, например, 5 количественной ПЦР, выделения вируса или другого способа, известного в данной области техники. Уровни агента инфекционного заболевания также могут быть определены путем измерения уровней антигена, против которого направлен иммуноглобулин. Снижение уровней агента инфекционного заболевания или облегчение симптомов инфекционной болезни показывает, что композиция 10 является эффективной.

Терапевтические средства в соответствии с изобретением могут быть проанализированы *in vitro* на желаемую терапевтическую или профилактическую активность перед использованием в условиях *in vivo* у животных. Например, анализы *in vitro*, которые могут использоваться для того, чтобы определить, 15 является ли показанным введение конкретного терапевтического агента, включают анализы *in vitro* в культуре клеток, в которых соответствующие клетки из клеточной линии или культивируемые клетки субъекта, имеющего конкретное заболевание или расстройство, подвергаются воздействию или иным образом вводятся терапевтически, и наблюдается эффект терапевтического агента на клетки.

20 Альтернативно, терапевтический агент может быть определен путем контактирования терапевтического агента с клетками (либо полученными от субъекта, либо клеток культивируемой линии), которые являются восприимчивыми к инфекции, вызванной агентом инфекционного заболевания, и последующего определения, является ли показатель инфекции клеток, контактировавших с 25 терапевтическим агентом, ниже, чем показатель инфекции клеток, не контактировавших с терапевтическим агентом. Заражение клеток агентом инфекционного заболевания может быть определено с помощью любого способа, известного в данной области техники.

Кроме того, терапевтический агент может быть оценен путем измерения уровня 30 молекулы, против которой направлено антитело, у субъекта в модели животного

при приемлемых интервалах времени до, во время или после лечения. Любое изменение или отсутствие изменений в количестве молекулы может быть идентифицировано и коррелирует с эффектом лечения субъекта. Уровень молекулы может быть определен любым способом, известным в данной области техники.

- 5 После вакцинации животного против PPV5B при использовании способов и композиций в соответствии с настоящим изобретением для оценки связывания полученного антитела и конкретной молекулы может быть использован любой анализ связывания, известный в данной области техники. Такие анализы могут быть также проведены для отбора антител, которые проявляют более высокое сродство или специфичность в отношении конкретного антигена.
- 10

#### G. Определение и диагностические способы

Антитела или их связывающие части, полученные в результате применения нативного PPV5B, аттенуированных вирусов, белков или пептидов в соответствии с настоящим изобретением, могут использоваться для обнаружения в образце присутствия PPV5B. Этот способ обнаружения включает следующие этапы:

15 обеспечение изолированного антитела или его связывающих частей, образовавшихся против нативного PPV5B, аттенуированного вируса, белка или пептида в соответствии с изобретением, прибавление к изолированному антителу или его связывающим частям образца, предположительно содержащего некоторое количество вируса PPV5B, и обнаружение присутствия комплекса, содержащего

20 изолированное антитело или его связывающие части, связанного с вирусом PPV5B.

Антитела или их связывающие части в соответствии с настоящим изобретением также являются полезными для обнаружения в образце наличия белка или пептида PPV5B. Этот способ обнаружения включает следующие этапы: обеспечение

25 изолированного антитела или его связывающих частей, индуцированных против нативного PPV5B, ослабленного вируса, белка или пептида, прибавление к изолированному антителу или его связывающей части образца, предположительно содержащего некоторое количество белка или пептида PPV5B, и обнаружение

присутствия комплекса, содержащего выделенное антитело или его связывающие части, связанного с белком или пептидом PPV5B.

5 Иммуноглобулины, в частности, антитела, (и функционально активные фрагменты), которые связываются со специфической молекулой, которая является членом связывающей пары, могут быть использованы в качестве диагностических и прогностических агентов, как описано в данной заявке. В различных вариантах осуществления настоящее изобретение обеспечивает измерение члена пары связывания, и использование таких измерений в клинической практике. Иммуноглобулины в соответствии с настоящим изобретением могут  
10 использоваться, например, при обнаружении антигена в биологическом образце, посредством чего субъекты могут подвергаться анализу на aberrантные уровни молекулы, с которой связывается иммуноглобулин и/или на присутствие аномальных форм таких молекул. Под термином "аномальный уровень" подразумевается увеличенное или уменьшенное по сравнению с присутствующим  
15 или стандартным уровнем, который присутствует в аналогичном образце из субъекта или из части тела субъекта, не имеющего этого заболевания. Антитела в соответствии с данным изобретением могут быть также включены в качестве реагента в виде набора для применения в диагностической или прогностической методике.

20 В одном аспекте антитело в соответствии с изобретением, которое иммуноспецифически связывается с PPV5B нативного или аттенуированного вируса, белком или пептидом, может использоваться для диагностики, прогнозирования или скрининга на PPV5B инфекцию.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способу диагностики или  
25 скрининга на наличие PPV5B инфекции или иммунитета к ней, включающему измерение у субъекта уровня иммуноспецифического связывания антитела с образцом, полученным от субъекта, у котором антитело иммуноспецифически связывает белок или пептид PPV5B, в котором увеличение уровня связывания указанного иммуноспецифического связывания по отношению к уровню

иммуноспецифического связывания в аналогичном образце от субъекта, не имеющего агента инфекционного заболевания, указывает на наличие PPV5B.

5 Примеры подходящих анализов для обнаружения присутствия пептидов или антагонистов PPV5B включают, но не ограничиваются таковыми, как ELISA, радиоиммуноанализ, анализ на основе гель-диффузионной реакции преципитации, иммунодиффузия, анализ агглютинации, реакция флуоресцентного иммуноанализа, иммуноанализ на основе белка А или иммуноэлектрофоретический анализ.

10 Иммуноанализы для конкретной молекулы будут типично включать инкубацию образца, такого, как биологическая жидкость, экстракт ткани, свежесобранные клетки или лизаты культивируемых клеток, в присутствии антитела с меткой и обнаружение связанного антитела с помощью любого из ряда способов, хорошо известных в данной области техники.

15 Связывающая активность данного антитела может быть определена в соответствии с хорошо известными способами. Специалисты в данной области техники смогут определить рабочие и оптимальные условия анализа для каждого определения с использованием обычного экспериментирования.

20 Дополнительный аспект настоящего изобретения относится к диагностическим наборам для обнаружения или измерения PPV5B. Обеспечиваются наборы для диагностики, которые содержат в одном или более контейнерах антитела против PPV5B и, необязательно, меченый партнер связывания для антитела. Кроме того, антитела против PPV5B могут подвергаться мечению (со способным к выявлению маркером, например, хемилюминесцентным, ферментативным, флуоресцентным или радиоактивным фрагментом). Соответственно, настоящее изобретение обеспечивает диагностический набор, включающий, анти-PPV5B антитела и 25 контрольный иммуноглобулин. В конкретном варианте осуществления одно из указанных выше соединений контейнера можно пометить с помощью способной к обнаружению метки. Комплект может дополнительно содержать в контейнере предварительно определенное количество вируса, белка или пептида PPV5B,

распознаваемого антителом набора, для использования в качестве стандарта или контроля.

#### Н. Введение субъекту

Способы введения включают, но не ограничиваются таковыми, как интраназальное, пероральное (например, в питьевой воде), внутрикожное и внутримышечное введение. Внутримышечное введение является особенно предпочтительным. Специалисту в данной области техники будет понятно, что композиции в соответствии с изобретением могут также быть введены в виде одной, двух или более доз, а также при использовании других путей введения. Например, такие способы включают также подкожное, внутрикожное, внутривенное, интраваскулярное, внутриартериальное, интраперитонеальное, интратекальное, внутритрахеальное, внутрисердечное, интралобулярное, интрамедуллярное, внутрилегочное и интравагинальное введение. В зависимости от желаемой продолжительности и эффективности лечения композиции в соответствии с изобретением могут быть введены один или несколько раз, а также периодически, например, на ежедневной основе в течение нескольких дней, недель или месяцев и в разных дозировках.

Следующие ниже примеры включены для демонстрации предпочтительных вариантов осуществления изобретения. Специалистам в данной области техники должно быть понятным, что способы, раскрытые в примерах, представляют собой методы, раскрытые изобретателями для нормального осуществления настоящего изобретения, и, таким образом, могут рассматриваться как предпочтительные способы его практического применения. Тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидным в свете настоящего описания, что многие изменения могут быть сделаны в конкретных вариантах, которые раскрыты, и при этом также удастся получить похожий или аналогичный результат без отступления от сущности и объема настоящего изобретения.

Данная заявка является связанной с заявкой, поданной 17 декабря 2012 года под названием "Парвовирус свиней 5А, способы применения и вакцины,"

регистрационный номер 61/738,110, содержание которой является включенным в данное описание в качестве ссылки во всей своей полноте.

## ПРИМЕРЫ

### Материалы и методы

- 5 **Источник материалов:** Гомогенаты ткани от трех свиней были получены в результате нестандартной вспышки заболевания. Клиническая история на ферме представляла собой свиней весом 200 фунтов с мышечным тремором всего тела, который присутствовал в состоянии покоя, но усиливался во время движения. После тщательного исследования в ветеринарной диагностической лаборатории, которая предположила наличие вирусного агента (на основе микроскопических повреждений), но приводила только к идентификации агента X (неклассическая чума свиней, ассоциированная с пестивирусом), образцы были предоставлены изобретателям, чтобы помочь определить основную причину симптомов со стороны ЦНС у этих животных.
- 10
- 15 **Анализ ДНК и белка:** Анализ ДНК образцов, полученных от заболевших свиней, был проведен при использовании высокоэффективного секвенирования от 454 Life Sciences (Branford CT) ("454 технология"), которое осуществляли при использовании Operon (Huntsville AL). Образцы были обогащены вирусными последовательностями благодаря обработке нуклеазой защищенных нуклеиновых кислот вирусной частицы с последующей экстракцией, случайной амплификацией и высокоэффективным секвенированием; которые осуществляли так, как описано у Victoria и др. PLoS pathogen 2008 Sep 26;4(9): e1000163.
- 20

Полученные последовательности изначально характеризовали при использовании BLASTX анализа как девергентные члены семейства *Parvoviridae*.

25 Последовательности собирали с использованием программного обеспечения Sequencher, и результаты этих анализов ДНК сочетали с нацеленным секвенированием, что обеспечивало получение последовательности ДНК SEQ ID NO: 1, которая представляла собой путативную полную кодирующую

последовательность вируса, который обозначается как PPV5B. Дальнейший анализ последовательности ДНК при использовании программного обеспечения Sequencher приводил к идентификации трех путативных кодирующих участков, соответствующих тем, которые встречаются у других видов парвовируса, включая вирусную репликазу (SEQ ID NO: 2), открытую рамка считывания "ORF3" (SEQ ID NO: 3) и белок вирусного капсида (SEQ ID NO: 4).

### **ПРИМЕР 1: Идентификация нового вируса**

Последовательности ДНК были определены с помощью 454 технологии (вирусная метагеномика) в образцах гомогенатов легких двух неродственных свиней из различных штатов. BLASTN и BLASTX анализ показал тесную идентичность с парвовирусом свиней 4, максимум 67% идентичности нуклеотидов в консервативных участках гена репликазы (REP), в то время как кодирующие участки капсида (CAP) не проявляли заметного совпадения на уровне нуклеотидов. На уровне белка определяли, что белок путативной репликазы продемонстрировал ~ 60% идентичности аминокислот, а капсидный белок показал ~ 50% идентичности. Вирус был определен в качестве нового вида, парвовируса свиней (PPV5B). Специфические праймеры были разработаны на основе кодирующей последовательности капсида и скрининга гомогенатов на основе ПЦР, которые были подобными в отношении тканевых и патологических / клинических характеристик, что выявило присутствие агента в ~ 16% образцов. На основании проведенных клинических симптомов и вирусологических данных, ассоциированных с тканями, которые подвергали скринингу, наблюдали статистически значимую связь с некоторыми другими вирусными агентами и клинической патологией / гистопатологией.

### **ПРИМЕР 2: Идентификация PPV5B в качестве нового парвовируса и филогенетический анализ**

Попарная идентичность аминокислот как для путативной репликазы (REP), так и белков капсида (VP1/CAP), для различных известных видов вирусов является представленной на Фиг. 5. Идентичность последовательности PPV5B с таковой

PPV4, ближайшим родственным организмом в отношении как REP, так и CAP (~90% / 65%, соответственно) поддержали определение PPV5B в качестве нового вида.

5 Филогенетический анализ (Фиг. 6) выявил, что вирус относится к новому виду парвовируса в рамках семейства *Parvoviridae* на основе консервативного участка белка CAP. Подобные результаты получали при использовании более консервативной белковой последовательности REP (не показано).

### **ПРИМЕР 3: Подтверждение PPV5B в качестве агента, который вызывает заболевание**

10 Гомогенаты мозга, полученные от инфицированных PPV5B CDCD свиней, использовали для инокуляции полученных путем кесарева сечения, не получающих  
 15 молозива (CDCD) животных для амплификации вируса и определения, приводила ли совместная инфекция новыми парвовирусами и PRRSV к увеличению клинических респираторных симптомов. В этом исследовании неожиданно  
 20 получали большое количество случаев смертности (20-22%) в группах, инокулированных при использовании гомогената ткани, содержащего новые парвовирусы, и высокие титры PPV5B были определены в сыворотке с помощью специфического для PPV5B ПЦР нацеливания на кодирующую область капсида. Ткани из одного животного в этом исследовании затем использовали для индукции  
 25 CDCD свиней для воспроизведения клинических признаков. В этом исследовании были показаны системные инфекции с высокими титрами виремии у большинства зараженных животных. В группах, которые получали инокуляты, содержащие PPV5B, было высокое значение смертности (20%), хромота, снижался среднесуточный прирост, наблюдалась гипертермия, а также макро- и микроскопические повреждения.

### **ПРИМЕР 4: Культивирование, изоляция и очистка PPV5B**

Небольшие участки ПЦР положительных тканей (например, селезенки, головного мозга, легких, кишечника и т.д.) измельчали при использовании стерильной ступки

и пестика. Измельченную ткань ресуспендировали в 5-10 мл модифицированной среды ЕМЕМ, содержащей НЕРЕС буфер и антибиотики, и осветляли для устранения больших кусочков ткани. Супернатанты собирали и последовательно пропускали через различные фильтры, чтобы устранить большинство крупных частиц, включая бактерии. Кроме того, образцы суспензии фекалий и сыворотку положительных по ПЦР животных также обрабатывали путем последовательной фильтрации для выделения вируса.

Разведения фильтрата обрабатывали трипсином или оставляли без обработки и адсорбировали на стабильных первичных клеточных культурах (перечисленных ниже) в планшетах на 6 ячеек при определенных температурах. Отсасывали жидкость из инокулята и заменяли 2 мл свежей поддерживающей среды. Затем планшеты инкубировали при 33-37°C в атмосфере 5% CO<sub>2</sub> и ежедневно наблюдали за появлением цитопатического эффекта, такого как округление клеток, клеточное слияние, некротизация клеток, клеточная кластеризация и т.д., по сравнению с контрольной обычной средой (среда без агента). Потенциальные положительные ячейки подвергали скринингу на рост вируса/изоляцию с помощью ПЦР.

Стабильные клеточные линии, используемые для изоляции вируса, включали: ST (свинные яички), SK6 (почка свиньи), ВНК-21 (почка хомячка), VIDO R1 (сетчатка плода свиньи), РК-15 NADC (почка свиньи), РК/WRL (почка свиньи), HRT-180 (колоректальная аденокарцинома человека), Her2 (человеческие эпителиальные клетки), Vero (почка африканской зеленой обезьяны) и RK-13 (почка кролика) и другие.

Первичные культуры клеток, используемые в способе, включали: эмбриональные ткани легкого свиньи, почки, семенники, трахеи и культуру кишечника, среди прочих.

Поскольку вирус изолировали, то его подвергали очистке при использовании нескольких циклов очистки бляшек или предельного разведения и размножали в больших количествах для получения маточных культур для экспериментов на животных.

**ПРИМЕР 5: Получение инактивированного вируса и вакцины**

Инактивацию осуществляли при температурах приблизительно 35-39°C и в присутствии от 2 до 15 мМ ВЕI, еще более предпочтительно в присутствии примерно 10 мМ ВЕI. Инактивацию осуществляли в течение, по крайней мере, 24 часов, вплоть до 24 - 72 часов. Затем добавляли эквивалентное количество агента, который нейтрализует агент инактивации в растворе; например, тиосульфата натрия. Инактивированный препарат вируса готовили в соответствии со способами, известными в данной области техники, например, как описано у Preuss, T., и др., Comparison of Two Different Methods for Inactivation of Viruses in Serum, CLINICAL and DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY, (1997), 504-508 или Bahnemann, H.G., Inactivation of viral antigens for vaccine preparation with particular reference to the application of binary ethylenimine, VACCINE, (1990), 299-303. После получения инактивированного вируса материал соединяли с препаратом носителя для рецептирования заключительной вакцины.

**ПРИМЕР 6: Получение аттенуированного вируса и вакцины**

Препарат аттенуированного вируса получали в соответствии с методами, известными в данной области техники, например, как раскрыто в Vaccine Protocols, 2-ое изд.; Robinson, Husdon, Cranage, ред., Humana Press 2003. Например, "... вирусы дикого типа экстенсивно пассируют в тканевой культуре / животных-хозяевах, до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый баланс между потерей вирулентности и сохранением иммуногенности ..."

Аттенуированный вирус очищали при использовании множества циклов очистки бляшек или путем предельных разведений. ПЦР анализы, глубокое секвенирование или иммунофлюоресцентные анализы использовали для определения специфичности культурального материала.

Аттенуированную вирусную вакцину получали путем соединения препарата очищенного аттенуированного вируса с препаратом носителя.

**ПРИМЕР 7: Получение субъединичной вакцины, включающей  
капсидный белок**

Капсидный белок последовательности SEQ ID NO: 4 получали путем экспрессии клонированной последовательности SEQ ID NO: 4 или ее фрагментов в различных системах экспрессии белка.

Бакуловирусная экспрессия: Капсидный белок PPV5B последовательности SEQ ID NO: 4 экспрессировали в бакуловирусной системе экспрессии, как правило, в соответствии со способами, описанными у Kost и др. (6), 2012: Этот белок был обнаружен в незначительном количестве в нерастворимой фракции после начальной очистки. Способы для повышения выхода и растворимости включали, но не ограничивались таковыми, как использование альтернативных буферных условий (например, гидрохлорида гуанидина или мочевины), альтернативное связывание и условия очистки (например, кобальтовые или никелевые аффинные колонки, анионо- или катионо-обменные колонки) или альтернативные условия экспрессии (например, температура, время, альтернативные линии клеток).

Бактериальная экспрессия: Капсидный белок PPV5B последовательности SEQ ID NO: 4 экспрессировали в бактериальной системе экспрессии, как правило, в соответствии со способами, описанными в EMD Chemicals Inc. Novagen User Protocol TB184. Этот способ включал добавление присущей His-метки, содержащейся в бактериальном векторе (EMD Chemicals Inc., 2011 (7)), чтобы способствовать очистке полученного белка. Экспрессированный в бактериях меченый капсидный белок очищали, как правило, в соответствии со способами, описанными в GE Healthcare, 2012 (8), и полученные продукты использовали для получения специфических антител к PPV5B, как описано в Примере 8.

Аттенуированную субъединичную вакцину получали путем соединения препарата очищенного капсидного белка с препаратом носителя.

**ПРИМЕР 8: Получение антител, которые специфически связываются с  
PPV5B**

Антитела, которые специфически связываются с PPV5B, получали путем иммунизации кроликов с помощью антигенных препаратов вируса PPV5B или субъединичных препаратов белков капсида (SEQ ID NO: 4) или их фрагментов. Образцы сыворотки, полученные от инокулированных кроликов, подвергали скринингу на поликлональные антитела, которые связываются с антигенами PPV5B. Селезенки, полученные из инокулированных мышей, которые были определены для получения антител к антигену, сливали с клетками миеломы для получения гибридом. Гибридомы затем подвергали скринингу на связывание с антигеном PPV5B.

10 Поликлональные антитела: Меченный с помощью HIS экспрессированный в бактериях капсидный белок, полученный в соответствии с Примером 7, использовали при иммунизации двух новозеландских белых кроликов в службе производства антител на заказ (Rockland Antibodies and Assays; Gilbertsville, PA). Кроликов иммунизировали при использовании приблизительно 100 мкг антигена/кролик в D0, D7, D14 и D28. Для инокуляции в D0 и D7 животных инокулировали интрадермально; инокуляции, которые проводили в D14 и D28, осуществляли подкожно. Полный адъювант Фрейнда использовали в первой инокуляции; неполный адъювант Фрейнда использовали для последующих прививок. Образцы сыворотки от обоих кроликов собирали до иммунизации и через 20 38 и 45 дней после иммунизации.

Препараты поликлональных антител подвергали скринингу на анти-PPV5B специфичность в соответствии с Rockland Antibodies and Assays. Были получены антитела, имеющие специфичность связывания с очищенным или частично очищенным белком PPV5B, с помощью иммунофлуоресцентного анализа (ИФА), вестерн-блоттинга и твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA). 25 Параметры для специфичности каждого анализа были следующими: специфичность в вестерн-блоттинге измеряли с помощью обнаружения прогнозируемого белка весом 79,0 кДа, ИФА специфичность измеряли по сравнению с неинфицированными клетками, а ELISA специфичность определяли путем покрытия планшетов при 30 использовании нерелевантного белка.

Моноклональные антитела: Меченный с помощью HIS экспрессированный в бакуловирусах капсидный белок, полученный в соответствии с Примером 7, использовали для создания моноклональных антител у Balb/c мышей в службе производства антител на заказ (Rockland Antibodies and Assays; Gilbertsville, PA).  
5 Мышей иммунизировали при использовании различных антигенных препаратов PPV5B в соответствии со стандартными прописями, разработанными на службе производства антител на заказ. Иммунный ответ после инокуляции подвергали мониторингу в службе по производству антител. Стандартные прописи для получения моноклональных антител являются хорошо известными специалистам в  
10 данной области техники, например, как раскрывается у Gabriele и др. (9), стр. 117-135.

Гибридомы получали путем слияния опухолевых В-клеток, культивируемых в среде для выращивания гибридомы до фазы пролиферации, с клетками селезенки, полученными от инокулированных мышей, которых определяли как таких, которые  
15 вырабатывают антитела к антигенам PPV5B в соответствии со стандартными прописями, как описано у Gabriele и др. (9), стр. 117-135. После слияния и культивирования гибридомы подвергали скринингу на связывания с PPV5B антигенами, и отбирали анти-PPV5B антитела, которые вырабатываются гибридомами. Моноклональные антитела, которые вырабатываются гибридомами,  
20 очищали при использовании аффинной хроматографии в соответствии со стандартными прописями, как описано у Gabriele и др. (9), стр. 209-232.

Высокоаффинные антитела, специфические для PPV5B, идентифицировали и дополнительно характеризовали, включая определение эпитопов, с которыми они связываются, специфичности антитела в отношении родственных видов вирусов, и  
25 отбирали приемлемые высокоаффинные антитела с высокой специфичностью для PPV5B вирусного(ых) антигена(ов), при использовании иммунологических методик, хорошо известных в данной области техники, например, ELISA, вестерн-блоттинг анализ и картирование эпитопов (Epitope Mapping Protocols in Methods in  
Molecular Biology, том 66 (Glenn E. Morris, ред., 1996) Humana Press, Totowa, New  
30 Jersey).

**ПРИМЕР 9: Диагностические анализы для PPV5B**

Анализ ELISA: Антитела, полученные в соответствии с Примером 8, использовали для измерения PPV5B в биологическом образце с применением ELISA процедур. Анализ осуществляли так, как описано ниже:

- 5 Антиген для покрытия, выбранный из капсидного белка последовательности SEQ ID NO: 4, разводили в буфере для покрытия (0,05 М карбонат-бикарбонатный буфер; pH 9,6) для получения заключительной концентрации 0,25 нг/мкл. Планшеты (планшеты для высокоэффективного связывания ELISA на 96 ячеек Phenix каталожный номер MPG-655061) покрывали при использовании 50
- 10 мкл/ячейка антигена для покрытия. Планшеты закрывали и инкубировали в течение 1 часа при 37°C или в течение ночи при 4°C. Удаляли раствор для покрытия и планшеты промывали три раза с помощью 200 мкл/ячейка PBST (1X PBS + 0,05% Твин-20). Планшет покрывали при использовании 300 мкл/ячейка блокирующего раствора (0,5% вес./об. обезжиренного сухого молока в PBS), закрывали и
- 15 инкубировали в течение 1 часа при 37°C. Блокирующий раствор удаляли, и планшет три раза промывали с помощью 200 мкл/ячейка PBST. Образцы разводили 1:100 в блокирующем растворе; прибавляли к планшету 100 мкл/ячейка образцов крови. Планшеты закрывали и инкубировали в течение 1 часа при 37°C. Удаляли образцы сыворотки и планшеты трижды промывали с помощью 200 мкл/ячейка PBST.
- 20 Вторичное антитело (конъюгированный с пероксидазой хрена козий анти-свиной IgG (H+L); Jackson Immuno-Research 114-035-003) разводили до 1:10000 в блокирующем растворе и использовали для покрытия планшета из расчета 100 мкл/ячейка. Планшеты закрывали и инкубировали в течение 1 часа при 37°C. Вторичное антитело удаляли и планшет три раза промывали с помощью 200
- 25 мкл/ячейка PBST. Планшеты покрывали при использовании 50 мкл/ячейка ТМВ (3,5,3',5'-тетраметилбензидин; KPL каталожный номер 53-00-01). Планшеты инкубировали при комнатной температуре в темноте приблизительно в течение 10 минут. Планшеты покрывали при использовании стоп-раствора из расчета 50 мкл/ячейка (2М H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; KPL каталожный номер 50-85-04). Считывали оптическую
- 30 плотность при 450 нм.

ПЦР анализы: Оптимизировали анализы ПЦР в геле и количественную ПЦР для PPV5B. Эти анализы осуществляли так, как описано ниже: Для количественного анализа ПЦР каждую реакцию осуществляли при прибавлении следующих реагентов: 10 мкл/реакция 2X SsoFast Probe Supermix (BioRad, каталожный номер 172-5233), 5 мкл/реакция обработанной DEPC воды, 1 мкл/реакция прямого праймера при концентрации 6 мкМ (ACC AGA GAA CAG GCG ACA T: SEQ ID NO: 6), 1 мкл/реакция обратного праймера при концентрации 6 мкМ (AAA CAC ATG ATG GGA CCA TAA T: SEQ ID NO: 7), 1 мкл/реакция зонда при концентрации 4 мкМ (6-FAM/TC ACT CAA CAG CCA GGA CCG AGA ACA CAG GAA /BHQ\_1: SEQ ID NO: 8) и 2 мкл/реакция экстрагированной ДНК. Реакцию осуществляли на T100 термоблоке для проведения реакций (Bio-Rad) в течение одного цикла при 95°C на протяжении 2 минут, после чего осуществляли сорок циклов при следующих температурах: 95°C в течение 5 секунд, а потом 60°C в течение 5 секунд. Данные считывали при использовании системы для формирования изображений (Bio-Rad). Для гелевого анализа каждую реакцию осуществляли путем прибавления следующих реагентов: 12,5 мкл/реакция 2X AmpliTaq Gold Mastermix (Applied Biosystems, каталожный номер 4302758), 8,0 мкл/реакция обработанной DEPC воды, 1,25 мкл/реакция прямого праймера (GAT TTA CAT TTT GAG CAG STA ACA CAG TAC: SEQ ID NO: 9) при концентрации 10 мкМ, 1,25 мкл/реакция обратного праймера (TTAT AAG CCC AAA TCT GAC ACT STA G: SEQ ID NO: 10) при концентрации 10 мкМ и 2 мкл/реакция экстрагированной ДНК. Реакцию осуществляли на T100 термоблоке для проведения реакций (Bio-Rad) в течение одного цикла при 95°C на протяжении 5 минут, после чего осуществляли сорок циклов при следующих температурах: 95°C в течение 30 секунд, 60°C в течение 30 секунд и 72°C в течение 45 секунд, и далее проводили заключительное удлинение при 72°C в течение 10 минут.

#### **ПРИМЕР 10: Оценка эффективности PPV5B вакцины у свиней**

Для оценки эффективности композиции вещества, которое содержит, по крайней мере, один белок или полипептид PPV5B (прототипная вакцина PPV5B) у свиней, осуществляли рандомизированное исследование при использовании полученных

путем кесарева сечения животных в возрасте пяти недель, которые не получали  
 молозива (CDCD), рандомизированных в три группы (см Таблицу 2). Животные  
 были вакцинированы с помощью композиции или плацебо (физиологический  
 раствор с фосфатным буфером; PBS) в день исследования 0 (D0) и D14. Животным  
 5 в D28 вводили материал, который содержал PPV5B. Осуществляли клинические  
 наблюдения, измеряли ректальные температуры, вес и брали анализы крови. В D56  
 животных забивали и осуществляли вскрытие для оценки макроскопических  
 повреждений. Эффективность вакцины PPV5B определялась статистически путем  
 сравнения процента смертности, виремии (титры и длительность), сероконверсии  
 10 (титры и длительность) и клинических признаков вакцинированных и  
 невакцинированных животных.

Таблица 2.

Номер группы	Группа	Кол-во	Клетка	Вакцинация	Стимуляция антигеном
1	PPV5B-Vx	10	1 и 2	PPV5B прототип	Да
2	PBS-Vx	10	1 и 2	PBS	Да
3	Строгий контроль	5	3	Отсутствует	Нет

Все композиции и способы, раскрытые и заявленные в данной заявке, могут быть  
 15 получены и осуществлены без излишних экспериментов в свете настоящего  
 описания. Хотя композиции и способы в соответствии с данным изобретением были  
 описаны в контексте предпочтительных вариантов осуществления, специалистам в  
 данной области техники будет очевидным, что в композиции и способы могут быть  
 внесены изменения, а также в этапы или в последовательности этапов описанного в  
 20 данной заявке способа без отступления от концепции и объема настоящего  
 изобретения. Более конкретно, будет очевидным, что определенные агенты,  
 которые являются как химически, так и физиологически, родственными, могут быть  
 заменены на агенты, описанные в данной заявке в то время как будут достигнуты те  
 же или аналогичные результаты. Все такие подобные замены и модификации,  
 25 очевидные для специалистов в данной области техники, подразумеваются как

такие, которые соответствуют объему и концепции изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения.

## ССЫЛКИ

Следующие ссылки в той степени, в которой они обеспечивают иллюстративные или другие детали, дополнительные к тем, которые изложены в данном описании, специально включены в данную заявку в качестве ссылки.

- 5 (1) Cságola A, и др., Detection, prevalence and analysis of emerging parvovirus swine infections. *Arch Virol*. Jun; 157(6):1003-10 (2012).
- (2) Hijikata M, и др., Identification of new parvovirus DNA sequence in swine sera from Myanmar. *Jpn J Infect Dis* 54:244–245 (2001).
- (3) Wang F, и др., Novel parvovirus sublineage in the family of Parvoviridae. *Virus Genes* 41:305–308 (2010).
- 10 (4) Lau SK, и др., Identification of novel porcine and bovine parvoviruses closely related to human parvovirus 4. *J Gen Virol* 89:1840–1848 (2008).
- (5) Cheung AK, и др., Identification and molecular cloning of a novel porcine parvovirus. *Arch Virol* 155(5):801–806 (2010).
- 15 (6) Kost и др., Recombinant baculoviruses as mammalian cell gene-delivery vectors, *Trends in Biotechnology*, 20, 173-180, Apr. 2002. цитируются другими .
- (7) EMD Chemicals Inc. 2011. *Xa/LIC Kits, User Protocol TB184*.
- (8) GE Healthcare. *Recombinant Protein Purification Handbook*. 18-1142-75.
- (9) Gabriele и др. (eds.), *Antibody Methods and Protocols*, *Methods in Molecular*
- 20 *Biology*, 2012, том 901, глава 7.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

<110> БЁРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ВЕТМЕДИКА, ИНК.

<120> ПАРВОВИРУС СВИНЕЙ 5В, СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВАКЦИНА

<130> 10-0153-РСТ

<140>

<141>

<150> 13/800,413

<151> 2013-03-13

<150> 61/765,204

<151> 2013-02-15

<160> 11

<170> PatentIn версия 3.5

<210> 1

<211> 5302

<212> ДНК

<213> Парвовирус свиней 5В

<400> 1

gcttcaagtc tattaatttg cataatttat gcaaagagga agttaacctg attggtcagt	60
tttttgccgg gaagcaattt gattggacgg gaactcaagt cctaatttgc attgacgtgg	120
accaatcaga attgagtaca tattatataa ggaggccgaa aaagaggaag tttgtcattt	180
gcgttttgga gaccatcgcg agcagaactc cgtcgttttc ggctgtatt tgaagatgga	240
aacctactgg acaggtattt gcagactttt tcctgatggt ttaaaaatac ctgggtgtta	300
tgaaggacgc tatatttttg aagttcctgt ttctaccaga gactttatga aatggcctga	360
tatatttcaa aatgaaaaaa ataatgaaaa ctgtgagtct ggcgcggcgc ctgcggcgcc	420
gcgcgatgaa attgacagta atctagtaac ggctgttaga caaggggagg ctctatttag	480
agagcttcaa aaagaactta gaaaatcctg tagattagga gtagatcctg gcattttcat	540
gcaattggaa agagttgact caaaaggtgg cttacatttg cattgggtgtg tgtctgtgtc	600
cgctggtacc ccgcgagatg ttttaactat attcaaaaaat acagaaaaaa aagtttcatt	660
atattacttt ggtgttgagg gacttagctt ttttgtgcc acaaaaaata aacacggagc	720
atggaaaagc acagatgaag ggtttattta taattatttg ctaaaaaaac taccactgaa	780
agaatgtctt tatgcatgga ctacaattgg aggtacaata ggtgaagcct gtttaatac	840
agaaaaaaga aaagaactat tagataatag acaagatcca gcagttattg aagaattatc	900
tgctcccatg taaaaatgtg ccaactggaga aaaaatgcta gacattgtac agtggttggt	960
agacaataat atttgttctg aatccagatg ggagggaaaa aatgctctaa gcttatactc	1020
attcttagcc acacaagctg gaggatatat ggcaaaaaca tgcttgagaa tcgctcagca	1080
aaaattacta aaagaaaaat cactaggggtt aaccttaatg gattttaaaa acatggatgc	1140

tttaagagct	ttccaacaaa	gtgacatgga	gtgctcattc	gatcataaca	gaatacatta	1200
catttttgca	gctaacaact	atgatcctaa	aattgctgca	gttataatgt	ttcactggag	1260
catgaaacaa	acgggaaaaa	gaaactgtgt	atggttttac	ggtcctgcta	caacaggaaa	1320
aacaaatatt	gcacaggcaa	tctgccatag	ctcagctaata	tatggcaatg	ttaactggaa	1380
caatccaaat	tttctttttc	aagatattgt	aggagctcag	gtaggggtgt	gggaagaagg	1440
gaaaatgaca	ggagacatgg	tagaagctgc	aaaagctttg	ctggggggaa	ctgctttgcg	1500
catcgaccgc	aaatgtatgc	aatctgttga	agtcaacagt	ccaccgttta	ttataacatc	1560
gaatgtggac	atgaccgtgg	ttcaagaagg	aagttttgta	agctttgaac	accaacagcc	1620
gttagaggac	aggatgataa	aattttcatt	taacctgaca	ctacctggaa	actttggctt	1680
gattacaact	gaagaagtga	aatctttttt	ccggatgggt	gcaaaacttt	cagttaaacc	1740
tgaaatcatg	aattgccaaa	ttttcaaaaag	aggacctgcc	agcatccgcc	acctagtctc	1800
tcttgagaaa	attcctccac	caaaggagat	gcataaaaaa	cgacagccac	tctatttgag	1860
agctgaacca	gatgaagaac	aagaaacacc	agacgtcttg	gatcattggt	ttgaagaacc	1920
aagtcaaaaa	agaaagaaga	cagaagaccc	tgcaaacacg	acacctcctg	cggcttatga	1980
gaatttagat	gacaactttg	aacctgttcc	aggtaagaat	tttgcattta	tcatttttta	2040
atgttccaaa	acaatagagc	aaactggtga	tatgtgcata	attcttacag	atagccaagt	2100
gaacctgata	tttgacgtgg	tctacgaaga	gacaccagag	gtggacgaag	tggaggaaca	2160
atgagcttta	gtgggtattc	taaaaatctc	ccccgggtt	tagaggaagt	tacattccca	2220
ttttgggttg	attttttgct	tgccagaata	gctgatttta	ttaattggtg	tgggtattat	2280
aatattaaat	gtccagaagc	agaaaaggta	tttagtattg	gacaatctac	acaggtttta	2340
cttaaattggc	cgggtgcaca	gggaaaagaa	aaccgagtta	agaactttac	cgaagctgcg	2400
tttccatata	tgaaagtacc	tgtgagacca	gacaacattg	aatggattaa	aatccatgag	2460
atgctacata	attatgatag	acaaataaca	ccgcagacaa	ctgagaatga	tttacttgca	2520
gctatcactg	ctgacttcga	tcagagagag	atcatccatc	cagtcaccgg	cgagaaatgg	2580
gttttcggta	agaaaacaga	agcttttgct	actgatttgg	aagaagccgt	ggatgaagaa	2640
gatcctgata	cagagaaaaa	acaacctact	gataaaacac	aaagtaataa	caagaaaggg	2700
gaaattggtg	aaaagaaaga	agaaggtgat	acccttacgt	caaatgagga	acatcaccaa	2760
tcaagaaaac	tattagaaca	cgactcaagc	gaagaacaac	cagaagaagc	tggtcaccga	2820
gaacagaaaag	aactagaaga	caatattgaa	gacatcaaac	atggagcggg	agaagaccaa	2880
accggaaccg	gtatcaactg	gccaggacat	cgctacacag	gtcctggaaa	tccactccct	2940
cacggagctc	ctcgcaatga	aattgatctc	tctgctgcca	aacatgatat	caggtacaaa	3000
caatattctc	gatatggtca	ctggccatac	atttgggcgc	catatattga	taaaaaatg	3060

caagaagata ttagagagat agtaaaaaaa ggttttaggat tagaaggtaa acttttaggt 3120  
aaccttatat cagctttatg gcaagcaaaa tacagattag gagccccgat atatgaaatt 3180  
ttaaaaacaa ttttaccccc gaaaagtatg cctactaaag aatctgtaga aaaacattta 3240  
ccaaaacctt tgcccattga tcctccacag acatccttac caggtgcatc tcctcctcga 3300  
actcctgact tgggtggcga gactggaatg aatgaagagc ctccagcaaa aagaagaatg 3360  
acagaagaca gatgtgacag caccacaagg tgcgaaacat tggacacaca atatgaggat 3420  
tctaaaatgg cgggaggggg tgggggggga gggaatcaac ctaaaagttc ttggattggg 3480  
ggggcctttct ttactgatac gacggttact acttatggta ctagaagggtg tgtgcttagc 3540  
tcttttccgc ataactactg caccacagag agcggggatc atatacctag ccttgttgtc 3600  
tgtactccat ggtactatta tgatcttaac attctatcag ctcatcttc tcctctgct 3660  
tggcaaacgc ttttagaaga gtatgatgct tttaaacctt taaaattgga agttaaatt 3720  
aaagagatag ttgttaaaga tgtaataat atgacaggga aacaatgctg tgacacagtt 3780  
tctgacaatg ccatggctgc agtgctgtgt tttgaggata cacattacga gctgccatat 3840  
gttttgggag ggggacagct aacagtgcct ggtcatcttc caggacaaac ttatgaactt 3900  
ccaaaatact gctatagaac tgtgggaaaa ccgcatagcg agatgtggtc acctgtagat 3960  
ggttccaaaa gagcccactt agacatgcct tttgttcagc caacacagaa cactgagttc 4020  
tttatttttag agaacagaca ctctaccatc cttcacacag gcaatgaatt ctttcaaacc 4080  
tatgactttc cagatttaca ttttgagcag ctaacacagt acatgtggga cgcgaggaga 4140  
cttgacaatc caatgaaagg tcaaagaata caggttatga aaaacaaacc tacagaaaac 4200  
aaagatcaaa tgtttggat cagagcttcg agttacctg ttcctggat tgtcaactct 4260  
ctaaacagac ctgctatggt ttacaagga ggaagattaa aagacgggga ttattccatt 4320  
gttgggcctg ggaccagaga acaggcgaca taccactact ttaatgatac acctgtcgtg 4380  
gttgaaagag atatttacia atttacaact agtatgctta aaagagaaac tcaacagcca 4440  
ggaccgagaa cacaggaaac aacggtaaaa acacctgatg ggaccataat tataacaact 4500  
aacagtttag cgtatggaca ggtgcctgaa aacattgata acataccgag tgatcacaaa 4560  
gccgctttcg gggttacagg gtacaggctt gctgtcgtg aacagagagg gtatagcaca 4620  
cctggaatgc cttctcatat aaggagata ttattgacaa aaacaccgaa actattagaa 4680  
aaagatcagc aagaaatcac atttccaaac tttgaagggt ctgtcagcga aaaaacttcc 4740  
gctaacttag agtctcagat ttgggcttat atccctaaca ctgatacaa acataactgc 4800  
ggaacgcccc ctttatctat atggggaatg gaaaatcctc cacctatggt tttttgagg 4860  
ttactccctc aactgggacc ccctgaaaaa tccagctggt ctggaagcaa accttctaaa 4920  
aagttcttga atcagtactg ccaattttta ctggaatata ctgtaacatg ggctgttgtg 4980

aggcgaaaga aacatactcc gaggtggaac cctatgccgg gggtcacaat tccaacttat 5040  
 aacaacgatc ctgtgtacat ccttgaccaa aatggatttt ataaattgcc agaaactggt 5100  
 tggacagcaa agcaacgtgt tagagcgcgga agataataaa aaaaaatttg agaaaaaaaa 5160  
 agttacttcc tctttttttt tgaatttgaa aagcgccagg cctctcgccg gtcgcccctg 5220  
 acgtcacatc cgcttccggg tcaaagggcg gggtcaaagg tcaaaggtct tcatacgtca 5280  
 tatccgcttc cgggtcatga cc 5302

<210> 2

<211> 601

<212> Белок

<213> Парвовирус свиной 5В

<400> 2

Met Glu Thr Tyr Trp Thr Gly Ile Cys Arg Leu Phe Pro Asp Val Leu  
 1 5 10 15

Lys Ile Pro Gly Val Tyr Glu Gly Arg Tyr Ile Phe Glu Val Pro Val  
 20 25 30

Ser Thr Arg Asp Phe Met Lys Trp Pro Asp Ile Phe Gln Asn Glu Lys  
 35 40 45

Asn Asn Glu Asn Cys Glu Ser Gly Ala Ala Pro Ala Ala Pro Arg Asp  
 50 55 60

Glu Ile Asp Ser Asn Leu Val Thr Ala Val Arg Gln Gly Glu Ala Leu  
 65 70 75 80

Phe Arg Glu Leu Gln Lys Glu Leu Arg Lys Ser Cys Arg Leu Gly Val  
 85 90 95

Asp Pro Gly Ile Phe Met Gln Leu Glu Arg Val Asp Ser Lys Gly Gly  
 100 105 110

Leu His Leu His Trp Cys Val Ser Val Ser Ala Gly Thr Pro Arg Asp  
 115 120 125

Val Leu Thr Ile Phe Lys Asn Thr Glu Lys Lys Val Ser Leu Tyr Tyr  
 130 135 140

Phe Gly Val Glu Gly Leu Ser Phe Phe Val Pro His Lys Asn Lys His  
 145 150 155 160

Gly Ala Trp Lys Ser Thr Asp Glu Gly Phe Ile Tyr Asn Tyr Leu Leu  
 165 170 175

Lys Lys Leu Pro Leu Lys Glu Cys Leu Tyr Ala Trp Thr Thr Ile Gly  
 180 185 190

Gly Thr Ile Gly Glu Ala Cys Leu Asn Thr Glu Lys Arg Lys Glu Leu  
 195 200 205

Leu Asp Asn Arg Gln Asp Pro Ala Val Ile Glu Glu Leu Ser Ala Pro  
 210 215 220

Met Tyr Lys Cys Ala Thr Gly Glu Lys Met Leu Asp Ile Val Gln Trp  
 225 230 235 240

Leu Val Asp Asn Asn Ile Cys Ser Glu Ser Arg Trp Glu Gly Lys Asn  
 245 250 255

Ala Leu Ser Leu Tyr Ser Phe Leu Ala Thr Gln Ala Gly Gly Tyr Met  
 260 265 270

Ala Lys Gln Cys Leu Arg Ile Ala Gln Gln Lys Leu Leu Lys Glu Lys  
 275 280 285

Ser Leu Gly Leu Thr Leu Met Asp Phe Lys Asn Met Asp Ala Leu Arg  
 290 295 300

Ala Phe Gln Gln Ser Asp Met Glu Cys Ser Phe Asp His Asn Arg Ile  
 305 310 315 320

His Tyr Ile Phe Ala Ala Asn Asn Tyr Asp Pro Lys Ile Ala Ala Val  
 325 330 335

Ile Met Phe His Trp Ser Met Lys Gln Thr Gly Lys Arg Asn Cys Val  
 340 345 350

Trp Phe Tyr Gly Pro Ala Thr Thr Gly Lys Thr Asn Ile Ala Gln Ala  
 355 360 365

Ile Cys His Ser Ser Ala Asn Tyr Gly Asn Val Asn Trp Asn Asn Pro  
 370 375 380

Asn Phe Pro Phe Gln Asp Ile Val Gly Ala Gln Val Gly Trp Trp Glu  
 385 390 395 400

Glu Gly Lys Met Thr Gly Asp Met Val Glu Ala Ala Lys Ala Leu Leu  
 405 410 415

Gly Gly Thr Ala Leu Arg Ile Asp Arg Lys Cys Met Gln Ser Val Glu  
 420 425 430

Val Asn Ser Pro Pro Phe Ile Ile Thr Ser Asn Val Asp Met Thr Val  
 435 440 445

Val Gln Glu Gly Ser Phe Val Ser Phe Glu His Gln Gln Pro Leu Glu  
 450 455 460

Asp Arg Met Ile Lys Phe Ser Phe Asn Leu Thr Leu Pro Gly Asn Phe  
 465 470 475 480

Gly Leu Ile Thr Thr Glu Glu Val Lys Ser Phe Phe Arg Met Gly Ala  
 485 490 495

Lys Leu Ser Val Lys Pro Glu Ile Met Asn Cys Gln Ile Phe Lys Arg  
 500 505 510

Gly Pro Ala Ser Ile Arg His Leu Val Pro Leu Gly Glu Ile Pro Pro  
 515 520 525

Pro Lys Glu Met His Lys Lys Arg Gln Pro Leu Tyr Leu Arg Ala Glu  
 530 535 540

Pro Asp Glu Glu Gln Glu Thr Pro Asp Val Leu Asp His Trp Phe Glu  
 545 550 555 560

Glu Pro Ser Gln Lys Arg Lys Lys Thr Glu Asp Pro Ala Asn Thr Thr  
 565 570 575

Pro Pro Ala Ala Tyr Glu Asn Leu Asp Asp Asn Phe Glu Pro Val Pro  
 580 585 590

Gly Lys Asn Phe Ala Phe Ile Ile Phe  
 595 600

<210> 3  
 <211> 233  
 <212> Белок  
 <213> Парвовирус свиней 5В

<400> 3  
 Met Ser Phe Ser Gly Tyr Ser Lys Asn Leu Pro Pro Gly Leu Glu Glu  
 1 5 10 15

Val Thr Phe Pro Phe Trp Val Asp Phe Leu Leu Ala Arg Ile Ala Asp  
 20 25 30

Phe Ile Asn Trp Cys Gly Tyr Tyr Asn Ile Lys Cys Pro Glu Ala Glu  
 35 40 45

Lys Val Phe Ser Ile Gly Gln Ser Thr Gln Val Leu Leu Lys Trp Pro  
 50 55 60

Gly Ala Gln Gly Lys Glu Asn Arg Val Lys Asn Phe Thr Glu Ala Ala  
65 70 75 80

Phe Pro Tyr Met Lys Val Pro Val Arg Pro Asp Asn Ile Glu Trp Ile  
85 90 95

Lys Ile His Glu Met Leu His Asn Tyr Asp Arg Gln Ile Thr Pro Gln  
100 105 110

Thr Thr Glu Asn Asp Leu Leu Ala Ala Ile Thr Ala Asp Phe Asp Gln  
115 120 125

Arg Glu Ile Ile His Pro Val Thr Gly Glu Lys Trp Val Phe Gly Lys  
130 135 140

Lys Thr Glu Ala Phe Ala Thr Asp Leu Glu Glu Ala Val Asp Glu Glu  
145 150 155 160

Asp Pro Asp Thr Glu Lys Lys Gln Pro Thr Asp Lys Thr Gln Ser Asn  
165 170 175

Asn Lys Lys Gly Glu Ile Gly Glu Lys Lys Glu Glu Gly Asp Thr Leu  
180 185 190

Thr Ser Asn Glu Glu His His Gln Ser Arg Lys Leu Leu Glu His Asp  
195 200 205

Ser Ser Glu Glu Gln Pro Glu Glu Ala Gly His Arg Glu Gln Lys Glu  
210 215 220

Leu Glu Asp Asn Ile Glu Asp Ile Lys  
225 230

<210> 4

<211> 891

<212> Белок

<213> Парвовирус свиной 5В

<400> 4

Met Leu His Asn Tyr Asp Arg Gln Ile Thr Pro Gln Thr Thr Glu Asn  
1 5 10 15

Asp Leu Leu Ala Ala Ile Thr Ala Asp Phe Asp Gln Arg Glu Ile Ile  
20 25 30

His Pro Val Thr Gly Glu Lys Trp Val Phe Gly Lys Lys Thr Glu Ala  
35 40 45

Phe Ala Thr Asp Leu Glu Glu Ala Val Asp Glu Glu Asp Pro Asp Thr  
 50 55 60

Glu Lys Lys Gln Pro Thr Asp Lys Thr Gln Ser Asn Asn Lys Lys Gly  
 65 70 75 80

Glu Ile Gly Glu Lys Lys Glu Glu Gly Asp Thr Leu Thr Ser Asn Glu  
 85 90 95

Glu His His Gln Ser Arg Lys Leu Leu Glu His Asp Ser Ser Glu Glu  
 100 105 110

Gln Pro Glu Glu Ala Gly His Arg Glu Gln Lys Glu Leu Glu Asp Asn  
 115 120 125

Ile Glu Asp Ile Lys His Gly Ala Gly Glu Asp Gln Thr Gly Thr Gly  
 130 135 140

Ile Asn Trp Pro Gly His Arg Tyr Thr Gly Pro Gly Asn Pro Leu Pro  
 145 150 155 160

His Gly Ala Pro Arg Asn Glu Ile Asp Leu Ser Ala Ala Lys His Asp  
 165 170 175

Ile Arg Tyr Lys Gln Tyr Ser Arg Tyr Gly His Trp Pro Tyr Ile Trp  
 180 185 190

Ala Pro Tyr Ile Asp Lys Lys Met Gln Glu Asp Ile Arg Glu Ile Val  
 195 200 205

Lys Lys Gly Leu Gly Leu Glu Gly Lys Leu Leu Gly Asn Leu Ile Ser  
 210 215 220

Ala Leu Trp Gln Ala Lys Tyr Arg Leu Gly Ala Pro Ile Tyr Glu Ile  
 225 230 235 240

Leu Lys Thr Ile Leu Pro Pro Lys Ser Met Pro Thr Lys Glu Ser Val  
 245 250 255

Glu Lys His Leu Pro Lys Pro Leu Pro Ile Asp Pro Pro Gln Thr Ser  
 260 265 270

Leu Pro Gly Ala Ser Pro Pro Arg Thr Pro Asp Leu Gly Gly Glu Thr  
 275 280 285

Gly Met Asn Glu Glu Pro Pro Ala Lys Arg Arg Met Thr Glu Asp Arg  
 290 295 300

Cys Asp Ser Thr Thr Arg Cys Glu Thr Leu Asp Thr Gln Tyr Glu Asp  
 305 310 315 320

Ser Lys Met Ala Gly Gly Gly Gly Gly Gly Gly Asn Gln Pro Lys Ser  
 325 330 335

Ser Trp Ile Gly Gly Ala Phe Phe Thr Asp Thr Thr Val Thr Thr Tyr  
 340 345 350

Gly Thr Arg Arg Cys Val Leu Ser Ser Phe Pro His Asn Tyr Cys Thr  
 355 360 365

Thr Glu Ser Gly Asp His Ile Pro Ser Leu Val Val Cys Thr Pro Trp  
 370 375 380

Tyr Tyr Tyr Asp Leu Asn Ile Leu Ser Ala His Phe Ser Pro Ser Ala  
 385 390 395 400

Trp Gln Thr Leu Leu Glu Glu Tyr Asp Ala Phe Lys Pro Leu Lys Leu  
 405 410 415

Glu Val Lys Ile Lys Glu Ile Val Val Lys Asp Val Asn Asn Met Thr  
 420 425 430

Gly Lys Gln Cys Cys Asp Thr Val Ser Asp Asn Ala Met Ala Ala Val  
 435 440 445

Leu Cys Phe Glu Asp Thr His Tyr Glu Leu Pro Tyr Val Leu Gly Gly  
 450 455 460

Gly Gln Leu Thr Val Pro Gly His Leu Pro Gly Gln Thr Tyr Glu Leu  
 465 470 475 480

Pro Lys Tyr Cys Tyr Arg Thr Val Gly Lys Pro His Ser Glu Met Trp  
 485 490 495

Ser Pro Val Asp Gly Ser Lys Arg Ala His Leu Asp Met Pro Phe Val  
 500 505 510

Gln Pro Thr Gln Asn Thr Glu Phe Phe Ile Leu Glu Asn Arg His Ser  
 515 520 525

Thr Ile Leu His Thr Gly Asn Glu Phe Phe Gln Thr Tyr Asp Phe Pro  
 530 535 540

Asp Leu His Phe Glu Gln Leu Thr Gln Tyr Met Trp Asp Ala Arg Arg  
 545 550 555 560

Leu Asp Asn Pro Met Lys Gly Gln Arg Ile Gln Val Met Lys Asn Lys  
 565 570 575

Pro Thr Glu Asn Lys Asp Gln Met Phe Gly Ile Arg Ala Ser Ser Tyr  
 580 585 590

Leu Val Pro Trp Ile Val Asn Ser Leu Asn Arg Pro Ala Met Phe Leu  
 595 600 605

Gln Gly Gly Arg Leu Lys Asp Gly Asp Tyr Ser Ile Val Gly Pro Gly  
 610 615 620

Thr Arg Glu Gln Ala Thr Tyr His Tyr Phe Asn Asp Thr Pro Val Val  
 625 630 635 640

Val Glu Arg Asp Ile Tyr Lys Phe Thr Thr Ser Met Leu Lys Arg Glu  
 645 650 655

Thr Gln Gln Pro Gly Pro Arg Thr Gln Glu Thr Thr Val Lys Thr Pro  
 660 665 670

Asp Gly Thr Ile Ile Ile Thr Thr Asn Ser Leu Ala Tyr Gly Gln Val  
 675 680 685

Pro Glu Asn Ile Asp Asn Ile Pro Ser Asp His Lys Ala Ala Phe Gly  
 690 695 700

Val Thr Gly Tyr Arg Leu Ala Val Ala Glu Gln Arg Gly Tyr Ser Thr  
 705 710 715 720

Pro Gly Met Pro Ser His Ile Arg Glu Ile Leu Leu Thr Lys Thr Pro  
 725 730 735

Lys Leu Leu Glu Lys Asp Gln Gln Glu Ile Thr Phe Pro Asn Phe Glu  
 740 745 750

Gly Ser Val Ser Glu Lys Thr Ser Ala Asn Leu Glu Ser Gln Ile Trp  
 755 760 765

Ala Tyr Ile Pro Asn Thr Asp Asn Lys His Asn Cys Gly Thr Pro Pro  
 770 775 780

Leu Ser Ile Trp Gly Met Glu Asn Pro Pro Pro Met Val Phe Leu Arg  
 785 790 795 800

Leu Leu Pro Gln Leu Gly Pro Pro Glu Lys Ser Ser Cys Ser Gly Ser  
 805 810 815

Lys Pro Ser Lys Lys Phe Leu Asn Gln Tyr Cys Gln Phe Leu Leu Glu  
 820 825 830

Tyr Thr Val Thr Trp Ala Val Val Arg Arg Lys Lys His Thr Pro Arg  
 835 840 845

Trp Asn Pro Met Pro Gly Val Thr Ile Pro Thr Tyr Asn Asn Asp Pro  
 850 855 860

Val Tyr Ile Leu Asp Gln Asn Gly Phe Tyr Lys Leu Pro Glu Thr Val  
 865 870 875 880

Trp Thr Ala Lys Gln Arg Val Arg Ala Arg Arg  
 885 890

<210> 5  
 <211> 685  
 <212> Белок  
 <213> Парвовирус свиной 4

<400> 5  
 Lys His Gly His Trp Pro His Leu Trp Ala Pro Phe Val Asp Arg Gln  
 1 5 10 15

Met Ser Gln Glu Ile Gln Gln Val Leu Lys Gly Ser Thr Lys Leu Ser  
 20 25 30

Gln Lys Leu Leu Ala Asn Phe Ile Ile Ala Leu Trp Arg Ala Lys Glu  
 35 40 45

Lys Ile Gly Ala Pro Ile Tyr Glu Ile Val Lys Gly Val Phe Pro Ser  
 50 55 60

Val Asp Lys Lys Thr Val Glu Ser Leu Leu Pro His Pro Asp Pro Ile  
 65 70 75 80

Pro Ala Pro Pro Ser Ser Pro Gln Arg Gly Ser Lys Arg Ala Ser Pro  
 85 90 95

Pro Gln Ser Pro Asn Ala His Asp Glu Asp Thr Met Ser Gly His Lys  
 100 105 110

Arg Gln Lys Thr Met Glu Val Glu Ser Glu Cys Asp Lys Ser Leu Leu  
 115 120 125

Cys Pro Thr Gln Asn Ala Gly Ala Asp Phe Glu Leu Cys Gly Thr Gly  
 130 135 140

Gly Gly Ala Thr Asn Glu Lys Gly Thr Trp Val Gly Gly Thr Gln Phe  
 145 150 155 160

Thr Asp Thr Ser Ile Arg Thr Phe Gly Thr Arg Arg Cys Val Leu Ser  
 165 170 175

Ala Phe Pro Asp Thr Tyr Cys Ser Met Met Ser Gly Asp Ala Ile Pro  
 180 185 190

Ser Ile Ile Phe Asn Thr Pro Trp Tyr Tyr Tyr Asp Leu Asn Ile Met  
 195 200 205

Ser Cys His Phe Ser Pro Ser Ala Phe Gln Thr Leu Ile Glu Asp Tyr  
 210 215 220

Asp Ala Phe Arg Pro Arg Ser Leu Thr Val His Leu Lys Glu Leu Val  
 225 230 235 240

Ile Lys Asp Val Cys Gln Gln Gln Gly Leu Gln Ala Glu Gln Val Ser  
 245 250 255

Asp Asn Asn Ser Ala Thr Leu Leu Ala Phe Glu Asp Val Asn Tyr Glu  
 260 265 270

Leu Pro Tyr Val Leu Gly Gly Gly Gln Val Ser Val Pro Gly His Leu  
 275 280 285

Pro Gly Gln Pro Tyr Gln Leu Pro Lys Tyr Ser Tyr Arg Thr Val Gly  
 290 295 300

Lys Pro Asp Pro Asn Ser Gly Phe Val Pro Gly Arg Asn Thr His Pro  
 305 310 315 320

Asp Gln Gly Pro Gly His Pro Lys Ala Ser Lys Thr Ile Trp Tyr Ser  
 325 330 335

Gln Tyr Leu Glu Thr Gln Asp Thr Glu Phe Tyr Ile Leu Glu Asn His  
 340 345 350

Lys Ala Thr Ile Leu His Ser Gly Asn Thr Phe Ser Gln Asn Tyr Asn  
 355 360 365

Phe Pro Asp Leu Pro Phe Glu Gln Leu Thr Gln Tyr Met Trp Asp Ala  
 370 375 380

Arg Arg Gln Asp Asn Pro Leu Ile Asp Gln Arg Ile Gln Val Met Ser  
 385 390 395 400

Arg Met Tyr Asp Asp Gly Pro Gln Lys Thr Phe Ala Ile Lys Val Asn  
 405 410 415

Pro Tyr Ile Val Pro Phe Thr Val Lys Ser Thr Ser Arg Pro Ala Met  
 420 425 430

Phe Leu Ala Gly Gly Arg Phe Lys Asp Gly Asp Tyr Ser Ile Thr Gly  
 435 440 445

Pro Gly Asp Arg Glu Lys Thr Ser Phe Arg Tyr Tyr Asn Asp Pro Pro  
 450 455 460

Trp Ile Ile Thr Arg Asp Thr Tyr Leu Phe Ser Ser Asp Leu Ala Lys  
 465 470 475 480

Thr Glu Arg Glu Gln Pro Gly Pro Arg Gln Gly Asp Thr Val Val Arg  
 485 490 495

Thr Pro Asp Gly Thr Leu Ile Val Thr Thr Asn Ala Leu Ala Tyr Gly  
 500 505 510

Tyr Thr Thr Glu Tyr Leu Lys Asn Ile Pro Leu Leu Ser Ser Lys Tyr  
 515 520 525

His Gly Val Glu Asn Phe Arg Leu Ala Val Glu Asn Glu Arg Gly Tyr  
 530 535 540

Ser Met Pro Gly His Pro Ser His Ile Arg Glu Thr Leu Phe Arg Gly  
 545 550 555 560

Lys Leu Pro Ser Glu Ile Arg Glu Ser Thr Ile Lys Ser Glu Asp Gln  
 565 570 575

Arg Lys Glu Ile Thr Phe Pro Asp Tyr Met Gly Ser Val Asn Glu Lys  
 580 585 590

Thr Thr Ala Asn Leu Glu Ser Gln Ile Trp Ser Gln Ile Pro Asn Thr  
 595 600 605

Asp Ile Thr Glu Lys Cys Thr Thr Pro Pro Leu Ser Ile Trp Gly Met  
 610 615 620

Lys Asn Pro Pro Pro Met Val Phe Leu Arg Leu Leu Ala Gln Met Gly  
 625 630 635 640

Pro Pro Arg Arg Ser Ala Cys Ser Gly Ser Ile Pro Ser Asn Thr Tyr  
 645 650 655

Leu Asn Gln Tyr Cys Gln Phe Leu Leu Thr Tyr Glu Met Glu Trp Asp  
 660 665 670

Val Ile Lys Arg Thr Arg Lys Thr Val Arg Trp Asn Pro  
 675 680 685

<210> 6  
 <211> 19  
 <212> ДНК  
 <213> Искусственная последовательность

<220>  
 <221> Источник  
 <223> /примечание=Описание искусственной последовательности: Синтетический праймер"

<400> 6  
 ассагагаас аггсгасат 19

<210> 7  
 <211> 22  
 <212> ДНК  
 <213> Искусственная последовательность

<220>  
 <221> Источник  
 <223> /примечание=Описание искусственной последовательности: Синтетический праймер"

<400> 7  
 ааасасстга тgggaccata at 22

<210> 8  
 <211> 30  
 <212> ДНК  
 <213> Искусственная последовательность

<220>  
 <221> Источник  
 <223> /примечание=Описание искусственной последовательности: Синтетический праймер"

<400> 8  
 актсаасагс саggaccсгаg аасасаggaa 30

<210> 9  
 <211> 33  
 <212> ДНК  
 <213> Искусственная последовательность

<220>  
 <221> Источник  
 <223> /примечание=Описание искусственной последовательности: Синтетический праймер"

<400> 9  
 ссаgatttac атттtgagca gctaасасag tac 33

<210> 10  
 <211> 28

<212> ДНК  
 <213> Искусственная последовательность  
 <220>  
 <221> Источник  
 <223> /примечание=Описание искусственной последовательности: Синтетический  
 праймер"

<400> 10  
 ggatataaagc cсааатctga gactctag 28

<210> 11  
 <211> 597  
 <212> Белок  
 <213> Парвовирус свиней 4

<400> 11  
 Met Glu Thr Tyr Trp Thr Gly Ile Cys Arg Leu Phe Pro Asp Val Leu  
 1 5 10 15

Lys Ile Pro Gly Val Tyr Glu Gly Arg Tyr Ile Phe Glu Val Pro Ile  
 20 25 30

Ser Thr Arg Asp Cys Met Lys Trp Pro Asp Ile Phe Gly Asn Glu Asn  
 35 40 45

Asn Ser Glu Asn Gln Gln Ser Gly Ala Ala Pro Ala Ala Pro Arg Glu  
 50 55 60

Asn Leu Asn Ser Asn Leu Val Ile Ala Val Arg Gln Ala Glu Ala Leu  
 65 70 75 80

Phe Arg Glu Leu Gln Lys Glu Leu Arg Lys Ser Cys Arg Leu Gly Val  
 85 90 95

Asp Pro Gly Ile Phe Met Gln Leu Glu Glu Val Asp Ser Lys Gly Gly  
 100 105 110

Leu His Leu His Trp Cys Val Ser Val Ser Ala Gly Thr Pro Arg Asp  
 115 120 125

Val Leu Thr Ile Phe Lys Asn Thr Glu Lys Lys Val Ser Leu Tyr Tyr  
 130 135 140

Phe Gly Val Glu Gly Leu Ser Phe Phe Val Pro His Lys Asn Lys His  
 145 150 155 160

Gly Ala Trp Lys Ser Thr Asp Glu Gly Phe Ile Tyr Asn Tyr Leu Leu  
 165 170 175

Lys Lys Leu Pro Leu Lys Glu Cys Leu Tyr Ala Trp Thr Thr Ile Gly  
 180 185 190

Gly Ala Ile Gly Asp Ala Cys Leu Asn Thr Asp Lys Arg Lys Glu Leu  
 195 200 205

Leu Asp Asn Arg Gln Asp Pro Ala Val Ile Glu Glu Leu Ser Ala Pro  
 210 215 220

Met Tyr Lys Cys Ala Thr Gly Glu Lys Met Leu Asp Ile Val Gln Trp  
 225 230 235 240

Leu Val Asp Asn Asn Ile Cys Ser Glu Ser Arg Trp Glu Asn Lys Asn  
 245 250 255

Ala Leu Ser Leu Tyr Ser Phe Leu Ala Thr Gln Ala Gly Gly Tyr Met  
 260 265 270

Ala Lys Gln Cys Leu Arg Ile Ala Gln Gln Lys Leu Leu Lys Glu Lys  
 275 280 285

Pro Leu Gly Leu Thr Leu Met Glu Phe Lys Asp Met Asn Ala Leu Arg  
 290 295 300

Arg Phe Gln Gln Asp Glu Gly Glu Met Thr Phe Asp Asn Asn Arg Met  
 305 310 315 320

His Tyr Ile Phe Ala Ile Asn Asn Tyr Asp Pro Lys Ile Ala Ser Val  
 325 330 335

Ile Met Tyr Phe Trp Ser Met Lys Gln Thr Gly Lys Arg Asn Cys Val  
 340 345 350

Trp Phe Tyr Gly Pro Ala Thr Thr Gly Lys Thr Asn Met Ala Gln Ala  
 355 360 365

Ile Cys His Ser Ser Ala Asn Tyr Gly Asn Val Asn Trp Asn Asn Ala  
 370 375 380

Asn Phe Pro Phe Gln Asp Ile Val Gly Ala Gln Val Gly Trp Trp Glu  
 385 390 395 400

Glu Gly Lys Met Thr Gly Asp Met Val Glu Ala Ala Lys Ala Leu Leu  
 405 410 415

Gly Gly Thr Ala Leu Arg Ile Asp Arg Lys Cys Met Gln Ser Ile Glu  
 420 425 430

Val Asn Ser Pro Pro Phe Leu Ile Thr Ser Asn Val Asp Met Thr Ile  
 435 440 445

Val Gln Glu Gly Ser Phe Val Ser Phe Glu His Gln Gln Pro Leu Glu  
 450 455 460

Asp Arg Met Ile Lys Phe Ser Phe Asn Met Thr Leu Pro Gly Asn Phe  
 465 470 475 480

Gly Leu Ile Thr Ser Glu Glu Val Lys Ser Phe Phe Arg Met Gly Ala  
 485 490 495

Lys Leu Ala Ala Gln Pro Asp Ile Met Asn Cys Pro Ile Phe Lys Lys  
 500 505 510

Gly Pro Ala Ser Ile Arg His Leu Val Pro Val Gly Glu Ile Pro Pro  
 515 520 525

Pro Lys Glu Met Lys His Lys Arg Gln Pro Leu Tyr Met Arg Ala Glu  
 530 535 540

Pro Asp Glu Ile Gln Asp Asn Pro Glu Glu Leu Asp His Trp Phe Glu  
 545 550 555 560

Glu Glu Ala Pro Arg Lys Lys Lys Gln Lys Thr Lys Asn Thr Ala Thr  
 565 570 575

Lys Asn Pro Ala Glu Thr Val Glu Ile Ile Thr Glu Thr Glu Phe Ile  
 580 585 590

Pro Ala Pro Gly Lys  
 595

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Изолированный полинуклеотид, который включает полинуклеотид
  - a) имеющий последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1;
  - 5 b) имеющий последовательность нуклеиновой кислоты, которая кодирует полипептид последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;
  - c) имеющий последовательность нуклеиновой кислоты, которая является, по крайней мере, на 80% идентичной SEQ ID NO: 1, которая кодирует полипептид, имеющий биологическую или иммунологически  
10 эффективную активность полипептида последовательности SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;
  - d) который представляет собой фрагмент последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1, который включает, по крайней мере, 30 смежных нуклеотидов нуклеотидных последовательностей, кодирующих SEQ ID NO: 4, или  
15
  - e) который представляет собой фрагмент последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1, который включает, по крайней мере, 30 смежных нуклеотидов последовательности SEQ ID NO: 1, и который кодирует иммунологически эффективную активность  
20 аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4.
  
2. Изолированный полипептид, который включает полипептид
  - a) имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;
  - 25 b) имеющий аминокислотную последовательность, по крайней мере, на 80% идентичную SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4 и имеющий биологическую или иммунологически эффективную активность полипептида, кодируемого последовательностью SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;
  - 30 c) который представляет собой фрагмент аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4, который

включает, по крайней мере, 13 смежных аминокислот SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4;

5 d) который представляет собой фрагмент аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4, который включает, по крайней мере, 13 смежных аминокислот последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4, и имеет иммунологически эффективную активность; или

10 e) фрагмент белка, который кодируется полинуклеотидом, который включает, по крайней мере, 39 нуклеотидов, включенных в последовательность нуклеотидов 2161-2860 SEQ ID NO: 1, или нуклеотидов 2861-5014 SEQ ID NO: 1.

3. Изолированный парвовирус свиней 5B (PPV5B), включающий

15 a) последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1 или

15 b) последовательность нуклеиновой кислоты, которая является, по крайней мере, на 80% идентичной последовательности SEQ ID NO: 1, которая кодирует полипептид, имеющий биологическую или иммунологически эффективную активность полипептида последовательности SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4.

20 4 PPV5B в соответствии с пунктом 3, включающий аттенуированную невирулентную форму PPV5B.

25 5. Вакцина для лечения или предотвращения инфекции вирулентным PPV5B, включающая убитую или аттенуированную форму PPV5B в соответствии с пунктом 3.

30 6. Вакцина для лечения или предотвращения инфекции вирулентным PPV5B, включающая субъединицу убитой или аттенуированной формы PPV5B в соответствии с пунктом 3.

7. Вакцина в соответствии с пунктом 6, где субъединица представляет собой капсидный белок последовательности SEQ ID NO: 4.
- 5 8. Вакцина в соответствии с пунктом 6, где субъединица представляет собой иммунологически эффективный фрагмент полипептидной последовательности SEQ ID NO: 4.
- 10 9. Иммуногенный препарат, включающий иммунологически эффективное количество полипептида в соответствии с пунктом 2 и фармацевтически или ветеринарно приемлемый носитель, наполнитель или разбавитель.
- 15 10. Способ формирования иммунного ответа у млекопитающего, включающий введение иммунологически эффективного количества PPV5B в соответствии с пунктом 3.
11. Способ формирования иммунного ответа у млекопитающего, включающий введение иммунологически эффективного количества полипептида в соответствии с пунктом 2.
- 20 12. Способ формирования иммунного ответа у млекопитающего, включающий введение иммунологически эффективного количества вакцины в соответствии с пунктом 5.
- 25 13. Способ формирования иммунного ответа у млекопитающего, включающий введение иммунологически эффективного количества вакцины в соответствии с пунктом 6.
- 30 14. Способ формирования иммунного ответа у млекопитающего, включающий введение иммунологически эффективного количества вакцины в соответствии с пунктом 7.

15. Способ в соответствии с пунктом 10, где животное представляет собой свинью, а иммунный ответ обеспечивает протективный иммунитет к заболеванию, вызванному PPV5B инфекцией.
- 5 16. Способ в соответствии с пунктом 11, где животное представляет собой свинью, а иммунный ответ обеспечивает протективный иммунитет к заболеванию, вызванному PPV5B инфекцией.
- 10 17. Способ в соответствии с пунктом 12, где животное представляет собой свинью, а иммунный ответ обеспечивает протективный иммунитет к заболеванию, вызванному PPV5B инфекцией.
- 15 18. Способ в соответствии с пунктом 13, где животное представляет собой свинью, а иммунный ответ обеспечивает протективный иммунитет к заболеванию, вызванному PPV5B инфекцией.
- 20 19. Способ в соответствии с пунктом 14, где животное представляет собой свинью, а иммунный ответ обеспечивает протективный иммунитет к заболеванию, вызванному PPV5B инфекцией.
- 25 20. Изолированное антитело, которое специфически связывается с PPV5B полипептидом, кодируемым полинуклеотидом парвовируса свиней 5B, имеющим последовательность SEQ ID NO: 1, где указанный полипептид имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3 или SEQ ID NO: 4, и где указанное антитело не связывается с полипептидом, кодируемым отличным парвовирусом.
- 30 21. Способ идентификации присутствия PPV5B в биологическом образце, включающий
- а) контакт биологического образца с антителом в соответствии с пунктом 20,

b) определение образования комплекса между антителом и PPV5B полипептидом,

где присутствие указанного комплекса свидетельствует о присутствии PPV5B в биологическом образце.

5

22. Вектор или плазида, который включает полинуклеотид в соответствии с пунктом 1.

23. Хозяйская клетка, которая включает вектор в соответствии с пунктом 22.

10

24. Гибридома, которая экспрессирует антитело в соответствии с пунктом 20.

25. Диагностический набор для идентификации присутствия PPV5B в биологическом образце, включающий

15

a) антитело в соответствии с пунктом 20, и

b) реагенты для определения образования комплекса между антителом и PPV5B полипептидом.

26. Иммуногенный набор, включающий

20

a) по крайней мере, один иммуногенный PPV5B пептид, который является эффективным для иммунизации животного против, по крайней мере, одного заболевания, ассоциированного с PPV5B инфекцией;

b) по крайней мере, одну молекулу адъюванта или носителя;

c) контейнер для упаковки иммуногенной композиции;

25

d) комплект распечатанных инструкций; и

e) дозирующее устройство, способное к введению иммуногенной композиции животному.

27. Иммуногенный набор в соответствии с пунктом 26, который дополнительно

30

включает, по крайней мере, один иммуногенный белок, который является эффективным для иммунизации указанного животного против, по крайней

мере, одного патогенного вируса свиней или бактерии, которые вызывают заболевание, ассоциированное с инфекцией указанным вирусом или бактерией.

ФИГ. 1:  
Последовательность ДНК PPV5B

## PPV5B\_эталон:

ген 935..2024  
/метка = "Спрогнозированная репликаза"  
ген 2161..2860  
/метка="Спрогнозированный ген с неизвестной функцией/ORF3"  
ген 2861..5014  
/метка = "Спрогнозированный капсид"

## Последовательность :

GCTTCAAGTСТАТТААТТТGCАТААТТТАТGСААAGAGGAAGTTAACCTGATTGGTCAGTTT  
 TTTGGCGGGAAGCAATTTGATTGGACGGGAACSTCAAGTCСТААТТТGCАТТGACGTGGACCA  
 АТCAGAАТТGAGTACАТАТТАТААAGGAGGCCGААААAGAGGAAGTTTGTCAТТТGCGTTT  
 TGGAGACCАТCГCGAGCAGAАСТCCGTCGTTTTCGGCCTGTАТТТGAAGATGGAAACCTACT  
 GGACAGGTАТТТGCAGACTTTTTCCTGATGTТТТАААААТАCCTGGTGTТТАТGAAGGACGC  
 ТАТАТТТТТGAAGTTCCTGTTTCTACCAGAGACTTTATGAAATGGCCTGATАТАТТТCАААА  
 TGАААААААТААТGААААСТGTGAGTCTGGCGCGGCCCTGCGGCGCCGCGGATGAAАТТG  
 ACAGTAАТCTAGTAACGGCTGTТАGACAAGGGGAGGCTCTАТТТАGAGAGCTTCAАААAGAA  
 СТТАGААААТCCTGTAGАТТАGGAGTAGATCCTGGCАТТТТCАТGCAАТТGGAAAGAGTTGA  
 CTCАААAGGTGGCTTACАТТТGCАТТGGTGTGTGTCTGTGTCCGCTGGTACCCCGCGAGATG  
 TTTТААСТАТАТТCААААТАCAGААААААAGTTTCAТТАТАТТАCTTTGGTGTТGAGGGA  
 СТТАGCTTTTТТGTGCCACААААААТАAACACGGAGCATGGAAAGCACAGATGAAGGGTT  
 ТАТТТАТААТТАТТТGTCTААААААСТACCАСТGAAAGAAАТGTCTTTATGCATGGACTACAA  
 TTGGAGGTACAАТАGGTGAAGCCTGTТТАААТАCAGАААААAGAAАGAАСТАТТАGATAАТ  
 AGACAAGATCCAGCAGTTАТТGAAGAАТТАТCTGCTCCCATGTACAAАТGTGCCACTGGAGA  
 АААААТGCTAGACАТТGTACAGTGGTTGGTAGACAАТААТАТТТGTТCTGAATCCAGATGGG  
 AGGGААААААТGCTCTAAGCTTATACTCAТТCTTAGCCACACAAGCTGGAGGATATATGGCA  
 ААСААТGCTTGAGAАТCГCTCAGCAААААТТАCTАААAGAAААТCACTAGGGTTAACCTT  
 ААТGGATTTТАААААСАТGGATGCTTTТАAGAGCTTTCCAACAAGTGACATGGAGTGCTCAT  
 TCGATCATAACAGAАТАСАТТАСАТТТТТGCAGCTAACAАСТАТGATCCTААААТТGCTGCA  
 GTТАТААТGTТТCACTGGAGCATGAAACAАACGGGААААAGAAАСТGTGTATGGTTTACGG  
 TCCTGCTACAACAGGАААААСАААТАТТGCACAGGCAATCTGCCATAGCTCAGCTAАТТАТG  
 GCAATGTТААСТGGAACAАТCCAААТТТТCCTTTTCAAGATАТТGTAGGAGCTCAGGTAGGG  
 TGGTGGGAAGAAGGGААААТGACAGGAGACATGGTAGAAGCTGCAААAGCTTTGCTGGGGGG  
 ААСТGCTTTTGCGCATCGACCГCAААТGTATGCAATCTGTТGAAGTCAACAGTCCACCГТТТА  
 TTATAACATCGAАТGTGGACATGACCГTGGTTCAAGAAGGAAGTTTТGTAAGCTTTGAACAC  
 CAACAGCCGTТАGAGGACAGGATGATAАААТТТТCAТТТАACCTGACACTACCTGGAAАСТT  
 TGGTCTGATTACAАСТGAAGAAGTGAААТCTTTTТCСGGATGGGTGCAАААСТTTСAGTTA  
 AACCTGAAАТCAТGAАТТGCCAAАТТТТCАААAGAGGACCTGCCAGCATCCGCCACCTAGTT  
 CCTCTTGGAGAAАТТCCTCCACCААAGGAGATGCATAАААААACGACAGCCACTCTАТТТGAG  
 AGCTGAACCAGATGAAGAACAAGAAACACCAGACGCTCTTGGATCAТТGGTTTGAAGAACCA  
 GTCAААААAGAAAGAAGACAGAAGACCCTGCAАACACGACACCTCCTGCGGCTTATGAGAАТ  
 TTAGATGACAАСТTTGAACCTGTТCCAGGTAAGAАТТТТGCАТТТАТCAТТТТТТААТGTTC  
 CААААСААТАGAGCAААСТGGTGATATGTGCATAАТТCTTACAGATAGCCAAGTGAACCTGA  
 ТАТТТGACGTGGTCTACGAAGAGACACCAGAGGTGGACGAAGTGGAGGAACAАТGAGCTTTA  
 GTGGGTАТТТCТААААТCTCCСCCGGGTTТАGAGGAAGTTACАТТТCАТТТТGGGTGAT  
 TTTTGCCTGGCAGAАТАGCTGАТТТТАТААТТGGTGTGGGTАТТТАТААТТАААТGTCC  
 AGAAGCAGAAАAGGTАТТТАGТАТТGGACAАТCTACACAGGTТТТАCTТАААТGGCCGGGTG  
 CACAGGGАААAGAAАACCGAGTTAAGAАСТTTACCGAAGCTGCGTTTCC

ФИГ. 1 (продолжение)

ATATATGAAAGTACCTGTGAGACCAGACAACATTGAATGGATTAAAAATCCATGAGATGCTACATAAT  
TATGATAGACAAATAACACCCGCAGACAACCTGAGAATGATTTACTTGCAGCTATCACTGCTGACTTCG  
ATCAGAGAGAGATCATCCATCCAGTCACCGGCGAGAAATGGGTTTTTCGGTAAGAAAACAGAAGCTTT  
TGCTACTGATTTGGAAGAAGCCGTGGATGAAGAAGATCCTGATACAGAGAAAAACAACCTACTGAT  
AAAACACAAAGTAATAACAAGAAAGGGGAAATTTGGTGAAAAGAAAGAAGGTGATACCCTTACGT  
CAATGAGGAACATCACCAATCAAGAAAACCTATTAGAACACGACTCAAGCGAAGAACAACCAGAAGA  
AGCTGGTCACCGAGAACAGAAAAGACTAGAAGACAATATTGAAGACATCAAACATGGAGCGGGAGAA  
GACCAAACCCGGAACCGGTATCAACTGGCCAGGACATCGCTACACAGGTCCTGGAAAATCCACTCCCTC  
ACGGAGCTCCTCGCAATGAAATTGATCTCTCTGCTGCGAAACATGATATCAGGTACAAACAATATTC  
TCGATATGGTCACTGGCCATACATTTGGGCGCCATATATTGATAAAAAAATGCAAGAAGATATTAGA  
GAGATAGTAAAAAAGGTTTTAGGATTAGAAGGTAAACTTTTAGGTAACCTTATATCAGCTTTATGGC  
AAGCAAATACAGATTAGGAGCCCCGATATATGAAATTTTAAAAACAATTTTACCCCCGAAAAGTAT  
GCCTACTAAAGAATCTGTAGAAAACATTTACCAAACCTTTGCCCATGATCCTCCACAGACATCC  
TTACCAGGTGCATCTCCTCCTCGAACTCCTGACTTGGGTGGCGAGACTGGAATGAATGAAGAGCCTC  
CAGCAAAAAGAAGAATGACAGAAGACAGATGTGACAGCACCACAAGGTGCGAAACATTTGGACACACA  
ATATGAGGATTCTAAAATGGCGGGAGGGGGTGGGGGGGGAGGGAATCAACCTAAAAGTTCTTGGATT  
GGGGGGGCTTTCTTTACTGATACGACGGTTACTACTTATGGTACTAGAAGGTGTGTGCTTAGCTCTT  
TTCCGCATAACTACTGCACCACAGAGAGCGGGGATCATATACCTAGCCTTGTGTCTGTACTCCATG  
GTAATATTATGATCTTAACATTTCTATCAGCTCATTTCTCTCCCTCTGCTTGGCAAACGCTTTTAGAA  
GAGTATGATGCTTTTAAACCTTTAAAATTGGAAGTTAAAATTAAAGAGATAGTTGTTAAAGATGTTA  
ATAATATGACAGGGAAACAATGCTGTGACACAGTTTCTGACAATGCCATGGCTGCAGTGTGTGTTTT  
TGAGGATACACATTACGAGCTGCCATATGTTTTGGGAGGGGGACAGCTAACAGTGCCTGGTCATCTT  
CCAGGACAAACTTATGAACTTCCAAAATACTGCTATAGAACTGTGGGAAAACCGCATAGCGAGATGT  
GGTCACCTGTAGATGGTTCCAAAGAGCCCACTTAGACATGCCTTTTGTTCAGCCAACACAGAACAC  
TGAGTTCTTTATTTTAGAGAACAGACACTCTACCATCCTTCACACAGGCAATGAATTTCTTCAAAC  
TATGACTTTCCAGATTTACATTTTGGAGCAGTAAACACAGTACATGTGGGACCGGAGGAGACTTGACA  
ATCCAATGAAAGGTCAAAGAATACAGGTTATGAAAACAACCTACAGAAAACAAGATCAAATGTT  
TGGTATCAGAGCTTCGAGTTACCTCGTTCCTGGATTGTCAACTCTTAAACAGACCTGCTATGTTT  
TTACAAGGAGGAAGATTAAGACGGGGATTATCCATTGTTGGGCCTGGGACCAGAGAACAGGCGA  
CATACCACTACTTTAATGATACACCTGTCGTGGTTGAAAGAGATATTTACAAATTTACAACCTAGTAT  
GCTTAAAAGAGAACTCAACAGCCAGGACCGAGAACACAGGAAACAACGGTAAAAACACCTGATGGG  
ACCATAATTATAACAACCTAACAGTTTAGCGTATGGACAGGTGCCTGAAAACATTTGATAACATACCGA  
GTGATCACAAAGCCGCTTTCGGGGTTACAGGGTACAGGCTTGCTGTGCTGAACAGAGAGGGTATAG  
CACACCTGGAATGCCTTCTCATATAAGGGAGATATTTATGACAAAAACACCGAAACTATTAGAAAAA  
GATCAGCAAGAAATCACATTTCCAAACTTTGAAGGGTCTGTGAGCGAAAAAATTTCCGCTAATCTAG  
AGTCTCAGATTTGGGCTTATATCCCTAACACTGATAACAAACATAACTGCGGAACGCCCCCTTTATC  
TATATGGGGAAATGGAATACTCCACCTATGGTTTTTTTGGAGGTTACTCCCTCAACTGGGACCCCTT  
GAAAAATCCAGCTGTTCTGGAAGCAAACCTTCTAAAAAGTTCTTGAATCAGTACTGCCAATTTTTTAC  
TGGAATATACTGTAACATGGGCTGTTGTGAGGCGAAAGAAACATACTCCGAGGTGGAACCCCTATGCC  
GGGGGTCACAATTTCAACTTATAACAACGATCCTGTGTACATCCTTGACCAAATGGATTTTATAAA  
TTGCCAGAACTGTTTGGACAGCAAAGCAACGTGTAGAGCGCGAAGATAATAAAAAAAAATTTGAG  
AAAAAAAAGTTACTTCTCTTTTTTTTTTGAATTTGAAAAGCGCCAGGCCTCTCGCCGGTCCGCCCT  
GACGTCACATCCGCTTCCGGGTCAAAGGGCGGGGTCAAAGGTCAAAGGTCTTCATACGTCATATCCG  
CTTCCGGGTCATGACC

3/9

ФИГ. 2:

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БЕЛКА РЕПЛИКАЗЫ PPV5B

METYWTGICRLFPDVLKIPGVYEGRYIFEVPSVTRDFMKWPDIFQNEKNNENCESGAAPAAPRDEIDSNLVT  
AVRQGEALFRELQKELRKSCRLGVDPGIFMQLERVDSKGGHLHLWCVSVSAGTPRDVLTIFKNTEKKVSLYY  
FGVEGLSFFVPHKNKHGAWKSTDEGFIYNYLLKKLPLKECLYAWTTIGGTIGEACLNTEKRKELLDNRQDPA  
VIEELSAPMYKCATGEKMLDIVQWLVDNNICSESRWEGKNALSLYSFLATQAGGYMAKQCLRIAQQKLLKEK  
SLGLTLMDFKNMDALRAFQOSDMECSFDHNRIHYIFAANNYDPKIAAVIMFHWSMKQTGKRNCVWFYGPATT  
GKTNIAQAICHSSANYGNVNWNNPNFPFQDIVGAQVGWEEGKMTGDMVEAAKALLGGTALRIDRKCMQSVE  
VNSPPFIITSNVDMTVVQEGSFVSFEHQPLEDRMIKFSFNLTLPGNFGLITTEEVKSFFRMGAKLSVKPEI  
MNCQIFKRGPASIRHLVPLGEIPPPKEMHKKRQPLYLRAEPDEEQETPDVLDHWFEEPSQKRKKTEDPANTT  
PPAAYENLDDNFEPVPGKNFAFIIF

**4/9**

**ФИГ. 3:  
ORF3 PPV5B**

MSFSGYSKNLPPGLEEVTFPFWVDFLLARIADFINWCGYNIKCPAEKVF SIGQSTQVLLKWPGAQGKENR  
VKNFTEAAFPYMKVPVRPDNIEWIKIHEMLHNYDRQITPQTENDLLAAITADFDQREI IHPVTGEKWVFGK  
KTEAFATDLEEAVDEEDPDTEKKQPTDKTQSNKKGEIGEKKEEGDTLTSNEEHHQSRKLEHDSSEEQPEE  
AGHREQKELEDNIEDIK

5/9


ФИГ. 4:

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БЕЛКА КАПСИДА PPV5B**

MLHNYDRQITPQTTENDLLAAITADFDQREI IHPVTGEKWVFGKKTEAFATDLEEAVDEEDPDTEKKQPTDK  
TQSNNKKGEIGEKKEEGDTLTSNEEHHQSRKLEHDSSEEQPEEAGHREQKELEDNIEDIKHGAGEDQTGTG  
INWPGHRYTGPGNPLPHGAPRNEIDL SAAKHDIRYKQYSRYGHWPYIWAPYIDKKMQEDI REIVKKGLGLEG  
KLLGNLISALWQAKYRLGAPIYEILKTI LPPKSMPTKESVEKHLPKPLPIDPPQTS L PGASPPRTPDLGGET  
GMNEEPPAKRRMTEDRCDSTTRCETLDTQYEDSKMAGGGGGGNQPKSSWIGGAFFTDTTVTTYGTRRCVLS  
SFPHNYCTTESGDHIPSLVVCTPWYYYDLNILSAHFSPSAWQTLLEEYDAFKPLKLEVKIKEIVVKDVNNMT  
GKQCCDTVSDNAMA AVL CFEDTHYELPYVLGGGQLTVPGHLPGQTYELPKYCYRTVGKPHSEMWS PVDGSKR  
AHLDMPFVQPTQNT EFFILENRHSTILHTGNEFFQTYDFPDLHFEQLTQYMWDARRLDNPMKGQRIQVMKNK  
PTENKQMF GIRASSYLVPWIVNSLNR PAMFLQGGRLKDGDISIVGPGTREQATYHYFNDTPVVVERDIYKF  
TTSMLKRETQQPGPRTQETTVKTPDGTIIIT TNSLAYGQVPENIDNIPSDHKA AFGVTGYRLAVAEQRGYST  
PGMP SHIREILLTKTPKLEKDQOEITFPNFEGSVSEKTSANLESQIWAYIPNTDNKHNCGTPPLSIWGMEN  
PPPMVFLRLLPQLGPPEKSSCSGSKPSKFLNQCQFLLEYTVTWAVVRRKKHTPRWNPMPGVTIPTYNNDP  
VYILDQNGFYKLPETVWTAKQVRARR

Попарное сравнение аминокислот на идентичность																
	[ 1]	[ 2]	[ 3]	[ 4]	[ 5]	[ 6]	[ 7]	[ 8]	[ 9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
[ 1] Крупный рогатый скот		47.2%	52.3%	50.3%	50.5%	52.8%	52.8%	52.8%	52.6%	6.6%	22.7%	22.5%	20.7%	20.7%	<b>20.2%</b>	18.4%
[ 2] Мелкие собачьи	43.3%		51.0%	60.2%	61.0%	50.5%	51.3%	50.5%	51.8%	7.4%	25.0%	24.7%	21.7%	21.7%	<b>21.4%</b>	18.1%
[ 3] GboV	43.7%	49.8%		50.0%	50.3%	91.3%	83.7%	83.7%	84.2%	6.6%	23.7%	23.7%	21.7%	21.7%	<b>22.5%</b>	17.6%
[ 4] PBoV1a	42.8%	53.5%	49.1%		93.9%	51.8%	50.5%	49.7%	51.5%	7.1%	24.0%	24.0%	20.9%	20.9%	<b>22.2%</b>	19.9%
[ 5] PBoV1b	43.3%	53.7%	49.5%	94.7%		51.8%	51.3%	49.7%	51.8%	7.9%	24.5%	24.5%	20.4%	20.4%	<b>22.5%</b>	20.2%
[ 6] HuVoca	44.2%	50.9%	93.3%	50.0%	50.7%		82.7%	82.7%	83.2%	6.9%	24.2%	24.2%	21.2%	21.2%	<b>22.5%</b>	17.9%
[ 7] HuVoca2	47.0%	50.5%	78.4%	50.0%	50.2%	80.5%		91.8%	91.1%	7.9%	23.5%	23.2%	20.9%	20.9%	<b>24.0%</b>	18.4%
[ 8] HuVoca3	44.7%	51.2%	92.6%	50.2%	50.5%	93.3%	80.0%		92.1%	8.7%	24.0%	23.7%	21.7%	21.7%	<b>23.0%</b>	18.6%
[ 9] HuVoca4	46.5%	50.2%	77.7%	50.0%	50.5%	80.2%	96.5%	79.3%		8.2%	23.5%	23.7%	21.4%	21.4%	<b>23.2%</b>	19.1%
[10] Densovirus	7.9%	7.0%	6.5%	7.7%	8.1%	6.5%	6.1%	6.7%	5.8%		7.7%	7.4%	8.4%	8.2%	<b>8.7%</b>	6.6%
[11] Hokovirus_a	20.5%	20.7%	20.5%	22.6%	22.3%	20.9%	20.2%	20.7%	20.5%	7.9%		99.5%	33.9%	34.2%	<b>32.9%</b>	17.6%
[12] Hokovirus_b	20.0%	20.9%	20.5%	22.6%	22.3%	20.9%	20.2%	20.7%	20.5%	8.1%	98.6%		33.9%	34.2%	<b>32.9%</b>	17.9%
[13] PPV4a	21.4%	21.2%	22.1%	22.1%	21.6%	22.8%	21.2%	22.8%	21.4%	6.3%	29.1%	29.1%		99.5%	<b>65.3%</b>	17.1%
[14] PPV4b	21.4%	21.2%	22.1%	22.1%	21.6%	22.8%	21.4%	22.8%	21.6%	6.3%	29.3%	29.3%	<b>22.1%</b>	<b>22.3%</b>	<b>65.6%</b>	<b>23.3%</b>
[15] BIVI_PPV5B	<b>21.4%</b>	<b>22.3%</b>	<b>23.0%</b>	<b>21.9%</b>	<b>21.9%</b>	<b>23.5%</b>	<b>21.9%</b>	<b>23.0%</b>	<b>21.9%</b>	<b>6.5%</b>	<b>29.1%</b>	<b>29.1%</b>	<b>90.5%</b>	<b>90.0%</b>		<b>18.4%</b>
[16] PPV1	18.6%	25.4%	23.3%	20.5%	21.2%	22.8%	26.1%	23.5%	25.1%	5.8%	16.5%	16.5%	18.4%	18.4%	<b>17.4%</b>	
Сверху = аминокислотная идентичность VP1/CAP																
Внизу = аминокислотная идентичность REP																

ФИГ. 6:  
Филогенетический анализ VP1/CAP участка PPV5B



### Результаты BLASTp капсида PPV5B против общих последовательностей GenBank

Самое близкое совпадение: парвовирус свиньи 4 PPV4 - депоз.номер GenBank: AFM73881

Идентичность последовательности: 53% (367/690)

Гомология последовательности: 68% (468/690)

PPV5B	50	RYGHWPYIWAPYIDKKMQEDIREIVKKGLEGLKLLGNLISALWQAKYRLGAPIYEILKT	109
		++GHWP++WAP++D++M ++I++++K L KLL N I ALW+AK ++GAPIYEI+K	
PPV4_	3	KHGHWPHLWAPFVDRQMSQEIQQVLKGSTKLSQKLLANFIIALWRAKEKIGAPIYEIVKG	62
PPV5B	110	ILPPKSMPTKESV-EKHLPKPLPIDPPQTSLPGASPPRTPDLGGETGMNEEPPAKRRMTE	168
		+ P T ES+ P P P PQ ASPP++P+ E M+ K E	
PPV4_	63	VFPSVDKKTVESLLPHDPPIAPPSSPQRGSKRASPPQSPNAHDEDTMSGHKRQKTMEVE	122
PPV5B	169	DRCDSSTTRCETLDTQYEDSKMAGGGGGGGNQPKSSWIGGAFFTDTTVTTYGTRRCVLSFF	228
		CD + C T + D ++ G GGG N+ K +W+GG FTDT++ T+GTRRCVLS+F	
PPV4_	123	SECDKSLLCPTQAG-ADFELCGTGGGATNE-KGTWVGGTQFTDTSIRTFGTRRCVLSAF	180
PPV5B	229	PHNYCTTESGDHIPSLVVCTPWYYDLNILSAHFSPSAWQTLLEEYDAFKPLKLEVKIKE	288
		P YC+ SGD IPS++ TPWYYDLNI+S HFSPSA+QTL+E+YDAF+P L V +KE	
PPV4_	181	PDTYCSMMSGDAIPSIIFNTPWYYDLNIMSFSPSAFQTLIEDYDAFRPRSLTVHLKE	240
PPV5B	289	IVVKDNNMTGKQCCDTSVDNAMAALVCFEDTHYELPYVLGGGQLTVPGHLPGQTYELPK	348
		+V+KDV G Q + VSDN A +L FED +YELPYVLGGGQ++VPGHLPGQ Y+LPK	
PPV4_	241	LVIKDVCQQQLQA-EQVSDNNSATLLAFEDVNYELPYVLGGGQVSVPGHLPGQPYQLPK	299
PPV5B	349	YCYRTVKGPHSEMWSVDGSKRAHLDMPFVQP-----TQNTTEFFILENRHST	395
		Y YRTVGRP S + H D P TQ+TEF+ILEN +T	
PPV4_	300	YSYRTVGRPDPN--SGFVPGRNTHPDQPGHPKASKTIWYSQYLETQDTEFYILENHKAT	357
PPV5B	396	ILHTGNEFFQTYDFPDLHFEQLTQYMWDARRLDNPMKGQRIQVMKNKPTENKQDMFGIRA	455
		ILH+GN F Q Y+FPDL FEQLTQYMWDARR DNP+ QRIQVM + + F I+	
PPV4_	358	ILHSGNTFSQNYNFPDLPFEQLTQYMWDARRQDNPLIDQRIQVMSRMYDDGPGQKTFAIKV	417
PPV5B	456	SSYLVPWIVNSLNRPAMFLQGGRLKGDYSIVGPGTREQATYHYFNTPVVVERDIYKFT	515
		+ Y+VP+ V S +RPAMFL GGR KGDYSI GPG RE+ ++ Y+ND P ++ RD Y F+	
PPV4_	418	NPYIVPFTVKSTSRPAMFLAGGRFKGDYSITGPGDREKTSFRYNDPPWIITRDTYLFS	477
PPV5B	516	TSMLKRETQPGPRTQETTIVKTPDGTIIITNSLAYGQVPENIDNIPSDHKAAPGVTGYR	575
		+ + K E +QPGPR +T V+TPDGT+I+TTN+LAYG E + NIP GV +R	
PPV4_	478	SDLAKTEREQPGPRQGDVVVTPDGTLIIVTTNALAYGYTTEYLKNIPLLSSKYHGVENFR	537
PPV5B	576	LAVAEQRGYSTPGMPSHIREILLT-KTPKLL-----EKDQQEITFPNFEKSVSEKTS	627
		LAV +RGYS PG PSHIRE L K P + E ++EITFP++ GSV+EKT+A	
PPV4_	538	LAVENERGYSMGPHPSHIRETLFRGKLPSEIRESTIKSEDQRKEITFPDYMGSVNEKTTA	597
PPV5B	628	NLESQIWAYIPNTDNKHNCGTPPLSIWGMENPPPMVFLRLLPQLGPPEKSSCSGSKPSKK	687
		NLESQIW+ IPNTD C TPPLSIWGM+NPPPMVFLRLL Q+GPP +S+CSGS PS	
PPV4_	598	NLESQIWSQIPNTDITEKCTTPPLSIWGMKNPPPMVFLRLLAQMGPPRRSACSISPSNT	657
PPV5B	688	FLNQYCQFLLEYTVTWAVVRRKKHTPRWNP 717	
		+LNQYCQFLL Y + W V++R + T RWNP	
PPV4_	658	YLNQYCQFLLTYEMEWDVIKTRKTRKTVRWNP 687	

ФИГ. 8:

**Результаты BLASTp репликазы PPV5B против общих последовательностей GenBank**

Самое близкое совпадение: парвовирус свиньи 4 PPV4 - депоз.номер GenBank: ADF59557

Идентичность последовательности: 87% (517/597)

Гомология последовательности: 93% (555/597)

Запрос	1	METYWTGICRLFPDVLKIPGVYEGRYIFEVVPVSTRDFMKWPDIFQNEKNNENCESGAAPA	60
Объект	1	METYWTGICRLFPDVLKIPGVYEGRYIFEVVP+STRD MKWPDIF NE N+EN +SGAAPA METYWTGICRLFPDVLKIPGVYEGRYIFEVPISTRDCMKWPDIFGNENNSENQQSGAAPA	60
Запрос	61	APRDEIDSNLVTAVRQGEALFRELQKELRKSCRLGVDPGIFMQLERVDSKGGHLHLHWCVS	120
Объект	61	APR+ ++SNLV AVRQ EALFRELQKELRKSCRLGVDPGIFMQLE VDSKGGHLHLHWCVS APRENLSNLVIAVRQAEALFRELQKELRKSCRLGVDPGIFMQLEEVDSKGGHLHLHWCVS	120
Запрос	121	VSAGTPRDVLTIFKNTEKKVSLYYFGVEGLSFFVPHKNKHGAWKSTDEGFIYNYLLKKLP	180
Объект	121	VSAGTPRDVLTIFKNTEKKVSLYYFGVEGLSFFVPHKNKHGAWKSTDEGFIYNYLLKKLP VSAGTPRDVLTIFKNTEKKVSLYYFGVEGLSFFVPHKNKHGAWKSTDEGFIYNYLLKKLP	180
Запрос	181	LKECLYAWTTIGGTIGEACLNTEKRKELLDNRQDPAVIEELSAPMYKCATGEKMLDIVQW	240
Объект	181	LKECLYAWTTIGG IG+ACLNT+KRKELLDNRQDPAVIEELSAPMYKCATGEKMLDIVQW LKECLYAWTTIGGAIGDAACLNTDKRKELLDNRQDPAVIEELSAPMYKCATGEKMLDIVQW	240
Запрос	241	LVDNNICSESRWEGKNALSLSYFLATQAGGYMAKQCLRIAQQKLLKEKSLGLTLMDFKNM	300
Объект	241	LVDNNICSESRWE KNALSLSYFLATQAGGYMAKQCLRIAQQKLLKEK LGLTLM+FK+M LVDNNICSESRWENKNALSLSYFLATQAGGYMAKQCLRIAQQKLLKEKPLGLTLMFEFKDM	300
Запрос	301	DALRAFQQSDMECSFDHNRIHYIFAANNYDPKIAAVIMFHWMSMKQTGKRNCVWFYGPATT	360
Объект	301	+ALR FQQ + E +FD+NR+HYIFA NNYDPKIA+VIM+ WSMKQTGKRNCVWFYGPATT NALRRFQQDEGEMTFDNNRMHYIFA INNYDPKIASVIMYFWSMKQTGKRNCVWFYGPATT	360
Запрос	361	GKTNIAQAICHSSANYGNVNWNNPNFPFQDIVGAQVGWEEGKMTGDMVEAAKALLGGTA	420
Объект	361	GKTN+QAICHSSANYGNVNWNN NFPFQDIVGAQVGWEEGKMTGDMVEAAKALLGGTA GKTNMAQAICHSSANYGNVNWNNANFPFQDIVGAQVGWEEGKMTGDMVEAAKALLGGTA	420
Запрос	421	LRIDRKCMQSVEVNSPPFIITSNVDMTVVQEGSFVSFEHQQPLEDRMIKFSFNLTLPGNF	480
Объект	421	LRIDRKCMQS+EVNSPPF+ITSNVDMT+VQEGSFVSFEHQQPLEDRMIKFSFN+TLPGNF LRIDRKCMQSIEVNSPPFLITSNVDMTIVQEGSFVSFEHQQPLEDRMIKFSFNMTLPGNF	480
Запрос	481	GLITTEEVKSFFRMGAKLSVKPEIMNCQIFKRGPASIRHLVPLGEIPPPKEMHKRQPLY	540
Объект	481	GLIT+EEVKSFFRMGAKL+ +P+IMNC IFK+GPASIRHLV+GEIPPPKEM KRQPLY GLITSEEVKSFFRMGAKLAAQPDIMNCPIFKKGPASIRHLVPGVEIPPPKEMHKRQPLY	540
Запрос	541	LRAEPDEEQETPDVLDHWFEE--PSQKRKKTEDPANTTPPAAYENLDDN-FEPVPGK	594
Объект	541	+RAEPDE Q+ P+ LDHWFEE P +K++KT++ A P E + + F P PGK MRAEPDEIQDNPEELDHWFEEDAPRKKKQKTKNTATKNPAETVEIITETEFIPAPGK	597