

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(21) **202200046** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки  
**2023.06.22**

(51) Int. Cl. *A61K 51/04* (2006.01)  
*A61K 103/00* (2006.01)

(22) Дата подачи заявки  
**2021.12.08**

---

(54) **СИНТЕЗ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46**

---

(96) **2021/033 (AZ) 2021.12.08**

(72) Изобретатель:

(71) Заявитель:  
**ШУКУРОВ РАЗИМ ТАИР ОГЛУ;  
СУЛЕЙМАНОВ ТАИР АББАСАЛИ  
ОГЛУ (AZ)**

**Сулейманов Таир Аббасали оглу,  
Шукуров Разим Таир оглу (AZ)**

(57) Изобретение относится к способу получения комплекса, содержащего изотоп  $^{68}\text{Ga}$ , используемого в качестве радиомаркера в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), и касается буферных комплексообразующих растворов. Сущностью настоящего изобретения является синтез  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46 и разработка состава буферного раствора (агента) для осуществления синтеза. Технический эффект заявляемого изобретения состоит в решении поставленной задачи. Заявляемый способ синтеза радиоактивного препарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46 позволяет получить  $\geq 70\%$  готового продукта и снизить стоимость производства и самого радиофармпрепарата.

**202200046**  
**A1**

**202200046**

**A1**

## СИНТЕЗ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46

Изобретение относится к способу получения комплекса, содержащего изотоп  $^{68}\text{Ga}$ , используемого в качестве радиомаркера в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и касается буферных комплексообразующих растворов.

Посредством позитронно-эмиссионной томографии  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$  / компьютерной томографии (ПЭТ / КТ) исследователям удалось вывести на экран чёткое изображение более 30 видов злокачественной опухоли. Однако, его широкое применение в повседневной ядерной медицине осложнялось из-за ограниченного времени между использованием РФП и процессом введения метки (синтезом) из-за короткого периода полураспада изотопа (68 минут). В то же время малый период полураспада  $^{68}\text{Ga}$  ( $T_{1/2}=68,1$  мин) позволяет использовать РФП необходимой активности, не создавая при этом значительной дозовой нагрузки на пациента. Кроме того, катион  $^{68}\text{Ga}^{3+}$  может формировать устойчивые комплексные соединения со многими лигандами, содержащими кислород, азот и серу как атомы-доноры, что делает его пригодным для синтеза большого количества хелатных комплексов и макромолекул различного функционального назначения. Проблема короткого периода между активностью радионуклидного комплекса и его использования в медицинских целях, решилась для большинства медицинских учреждений возможностью получения изотопа  $^{68}\text{Ga}$  непосредственно в клинике и использования модуля синтеза для процесса введения метки. В настоящее время в ядерной медицине одним из наиболее распространенных примеров новых радиоактивных препаратов, содержащих FAP $\alpha$ , является радиоактивный препарат  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46, синтезированный с использованием ингибитора FAP $\alpha$ -46. Однако, еще одна проблема в синтезировании комплекса и использовании его, состоит в том, что в каждом модуле синтеза используется

свой регламент комплексообразования с определенным набором атрибутов (kit) и составом буферного раствора, что представляет собой коммерческую тайну и не всегда доступна потребителю.

Для синтеза комплекса с  $^{68}\text{Ga}$  - перспективным генераторным радионуклидом, обладающим оптимальными ядерно-физическими свойствами ( $T_{1/2}=68$  мин,  $\beta^+=89\%$ ,  $E_{\beta^{\max}}=1,9$  МэВ) и для создания широкого спектра РФЛП, величина рН – одна из ключевых параметров процесса, так как даже при незначительном смещении интервала значений рН падает выход целевого продукта, а самые незначительные примеси, содержащиеся в исходном элюате, образуют другие комплексы, которые на экране ПЭТ – не видимы. При формировании комплекса радиоактивного металла необходим подходящий буфер для обеспечения оптимального для комплекса рН. Выбор подходящего буфера, способного обеспечить стандартный рН, является предметом непрерывных исследований специалистов в данной области введения метки  $^{68}\text{Ga}$  и остается открытым.

Известны (1) двадцать буферных растворов (Буферы Гуда) для биохимических и биологических исследований, выбранных и описанных Норманом Гудом и его коллегами в 1966–1980 годах. Среди них наиболее эффективный и в основном используемый является буферный агент (раствор) - HEPES (4- (2-гидроксиэтил) -1-пиперазинэтансульфоновая кислота ), однако он позволяет работать только в строго определенном диапазоне рН и не может сохранять необходимую буферную емкость при незначительном изменении кислотности элюата, которая зависит от нескольких факторов, в том числе и от используемой генераторной установки.

Известен (2) способ получения комплексов, содержащих  $^{68}\text{Ga}$ , в котором в реакцию комплексообразования проводят в буфере муравьиная кислота/водный раствор формиата, и возможно в присутствии соединений, способных поглощать катионы металлов.

Однако известно, что для получения известных комплексов, содержащих  $^{68}\text{Ga}$ , в том числе и комплекса  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46 существует ряд различных моделей генераторов и модулей для синтеза комплекса, с различными техническими характеристиками и набором необходимых реагентов, но без соответствующего регламента для проведения процесса синтеза, в котором ключевое значение имеет буферный раствор.

Задачей настоящего изобретения является синтез  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46 и разработка состава буферного раствора (агента) для осуществления синтеза.

Сущность изобретения состоит в способе получения комплексов  $^{68}\text{Ga}$  ( $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46), в котором реакцию комплексообразования радиоактивных ингибиторов на основе хинолина для идентификации активного белка фибробластов, проводят в растворе буфера, содержащем 1 мл 0,3 М ацетата натрия и 100 мкл 0,2 М аскорбата натрия, в диапазоне pH 3,5 - 4,5 и нагревании при  $95^{\circ}\text{C}$  в течение 10 мин, полученный комплекс фильтруют через HLB и элюируют 70% раствором этанола.

Автором изобретения был впервые синтезирован этот новый вид радиоактивного препарата на полностью автоматизированном устройстве TAVIS miniAIO (Бельгия). Для этого были разработаны параметры синтеза и состав буферного раствора (агента), процесс прошел валидацию.

Новизной заявляемого изобретения является состав буферного раствора (агента), содержащим 1 мл 0,3 М ацетата натрия и 100 мкл 0,2 М аскорбата натрия.

Радионуклид галлия  $^{68}$  ( $^{68}\text{Ga}$ ) (4 мл), использованный для синтеза, был получен из генератора  $^{68}\text{Ge} / ^{68}\text{Ga}$  (ITG - Германия) и прекурсор FAPI-46 (SOFIE Biosciences - США) (50 мкг). Для синтеза препарата использовалась одноразовая реакционная посуда - синтезная кассета. Для определения радиохимической чистоты синтезированных радиоактивных препаратов  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46 авторами была разработана изократическая подвижная фаза. Способ синтеза осуществляется следующим образом.

Из образцов, включенных в набор реагентов, используемых в синтезе, и прилагаемых к используемой модели синтеза был разработан качественный и количественный состав буферного раствора для поддержания pH реакции в пределах 3,5-4,5, который содержит 1 мл 0,32 М тригидрат ацетата натрия ( $\geq 99\%$  136.08 г/мол) и 0,1 мл 0,2 М раствора аскорбата натрия (+ Sodium L ascorbate  $\geq 99\%$ , 198.11 г/мол). Для подготовки 0,32 М тригидрата ацетата натрия 435 мг вещества растворяют в 10 мл воды. Для реакции синтеза используют 1 мл приготовленного раствора. Второе вещество в буферном растворе - 0,2 М аскорбат натрия. Для его приготовления 198 мг аскорбата натрия смешивают с 5 мл воды. Для реакции используют 0,1 мл этого раствора. Прекурсор FAPI-46. Упаковка прекурсора – флакон содержит 1,2 мг. Вещество растворяют в 1,2 мл воды и по 50 мкг, распределяют по другим стерильным флаконам.

Перед началом процесса синтеза готовят смесь прекурсор + буферный раствор. Для этого в стерильный флакон добавляют 50 мкг предшественника (раствор прекурсора) FAPI-46 и 1,1 мл буферного раствора. Смесь раствора помещается в соответствующее место кассеты для синтеза. 4 мл HCl (0.05 М) и 5 мл раствора этанола также помещают в соответствующие места в кассете для синтеза.

Этапы процесса синтеза происходят в следующей последовательности:

1. Смесь предшественник FAPI-46 + буферный раствор переносят в реакционный сосуд кассеты для синтеза.
2. Радионуклид  $^{68}\text{Ga}^{3+}$  из генератора  $^{68}\text{Ge} / ^{68}\text{Ga}$  элюируют 4 мл раствора HCl и добавляют в реакционный сосуд.
3. Раствор нагревают при  $95^\circ\text{C}$  в течение 10 минут.
4. Для очистки синтезированного радиофармпрепарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46 от свободных  $^{68}\text{Ga}$  радионуклидов не участвующих в реакции, раствор пропускают через фильтр HLB, в результате которого готовый продукт остается на фильтре, а свободные радионуклиды  $^{68}\text{Ga}$  попадают в емкость для отходов.

5. На следующем этапе  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46, осажденный на фильтр HLB, элюируют 70% -ным раствором этанола и пропускают через стерильный фильтр в стерильный флакон.
6. Конечный объем готового продукта составляет 10 мл с 0,9% раствором NaCl

Определение радиохимической чистоты синтезированных радиоактивных препаратов  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46 были выполнены высокоэффективной жидкостной хроматографией с использованием изократической подвижной фазы, состав которой был разработан авторами изобретения и который, по сравнению с существующими методами, отличается высокой точностью и чувствительностью и является более рентабельным. Метод может быть успешно использован для определения радиохимической чистоты радиоактивного препарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAPI-46.

Анализ ВЖХК был выполнен на приборе типа Agilent 1260 (США) с детекторами УФ (ультрафиолетовый) и RAD (радиационный детектор). Хроматографическая трубка типа Eclipse XDB-C18 (Agilent) (диаметр 4,6 мм, длина 150 мм) использована в качестве стационарной фазы в аналитическом методе, а в качестве подвижной фазы – смесь раствора из ацетонитрила (13%), воды (87%) и TFA (0,1%). Температура колонки 25 ° С, скорость потока мобильной фазы 1 мл / мин, объем пробы 20 мкл, время анализа 20 мин. Для анализа радиохимической чистоты полученного радиоактивного лекарственного средства сначала были сняты хроматограммы стандартного (эталонного) раствора FAPI-46 в высокоэффективном жидкостном хроматографе. Хроматограммы, полученные с помощью УФ-детектора (254 нм), установленного на хроматографическом устройстве, которые определяют время появления площадей пиков эталонного раствора (*FAPI-46* (S)-2,2',2''-(10-(2-(4-(3-((4-((2-(2-сyано-4,4-дифлуоропирролидин-1-yl)-2-охоethyl)carbamoyl)quinolin-6yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)-2-azaethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid). Затем на основе результатов, полученных с радиоактивного детектора, установленного на приборе

высокоэффективной жидкостной хроматографии (CPS-Count Per Secunt), было определено время появления площадей пиков на хроматограммах радиоактивного препарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46. Проведенный сравнительный анализ результатов, полученных как в УФ, так и в радиоактивных детекторах показал, что время удерживания площади пиков исследованных по стандарту FAP $\alpha$ -46, совпадают с пиками на хроматограмме полученного радиоактивного препарата. Результаты, полученных как в УФ, так и в радиоактивных детекторах представлены на фиг.1 - Хроматограмма стандартного раствора FAP $\alpha$ -46, полученного на УФ-детекторе в ВЭЖХ; фиг.2- Хроматограмма образца радиофармацевтического препарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46, полученного на радиоактивном детекторе ВЭЖХ.

Технический эффект заявляемого изобретения состоит в решении поставленной задачи. Заявляемый способ синтеза радиоактивного препарата  $^{68}\text{Ga}$ -FAP $\alpha$ -46 позволяет получить  $\geq 70\%$  выход готового продукта и снизить стоимость производства и самого радиофармпрепарата.

Автор:



проф. Сулейманов Таир Аббасали оглу



Шукуров Разим Таир оглу

## ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.dia-m.ru/news/hepes-khepes-dlya-kulturalnykh-rabot/>
2. Патент RU № 2 605 090 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ  $^{68}\text{Ga}$ »,  
20.09.2015.



## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ получения комплексов  $^{68}\text{Ga}$ , в котором реакцию комплексообразования радиоактивных ингибиторов на основе хинолина для идентификации активного белка фибробластов, проводят в буфере содержащем 1 мл 0,3 М ацетата натрия и 100 мл 0,2 М аскорбата натрия, в диапазоне рН 3,5 - 4,5 и нагревании при 95°C в течение 10 мин, полученный комплекс фильтруют через HLB и элюируют 70% раствором этанола.

Автор:




проф. Сулейманов Таир Аббасали оглу




Шукуров Разим Таир оглу

# СИНТЕЗ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА 68Ga-FAP1-46



Фиг.1



Фиг.2

Автор: проф. Сулейманов Т. А.  
Шукюров Р.Т.

**ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ**

(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:

**202200046****А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:**А61К 51/04 (2006.01)  
А61К 103/00 (2006.01)

Согласно Международной патентной классификации (МПК)

**Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:**Просмотренная документация (система классификации и индексы МПК)  
А61К 51/04, А61К 103/00Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)  
Espacenet, ЕАПАТИС, ЕРОQUE Net, Reaxys, Google**В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ**

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	MEYER Catherina et al. Radiation dosimetry and biodistribution of <sup>68</sup> Ga-FAPI-46 PET imaging in cancer patients, Journal of Nuclear Medicine. 13.12.2019, p. 1-17 doi:10.2967/jnumed.119.236786, с. 4-5, раздел "Radiopharmaceutical Synthesis", реферат	1
A	SPRECKELMEYER Sarah et al. Fully-automated production of [ <sup>68</sup> Ga]Ga-FAPI-46 for clinical application. EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry, 17.12.2020, v. 5, no. 31, p. 1-10, doi: 10.1186/s41181-020-00112-x, с. 8, второй абзац - с. 9, первый абзац, реферат	1
A	JUSSING Emma et al. Clinically Applicable Cyclotron-Produced Gallium-68 Gives High-Yield Radiolabeling of DOTA-Based Tracers. Biomolecules, 29.07.2021, v. 11, p. 1-12, doi:10.3390/biom11081118, с.5-6, раздел "Synthesis of [ <sup>68</sup> Ga]Ga-FAPI-46 and [ <sup>68</sup> Ga]Ga-DOTATOC"	1
A	US 2021/0038749 A1 (UNIVERSITAT HEIDELBERG) 11.02.2021, [0258], [0259], [0298], пункты формулы 1, 9, 11, 14	1
A	CHOUTHKANTHIWA Vrinda et al. Development of ready-to-use <sup>177</sup> Lu-PSMA-617 formulation for treatment of inoperable metastatic prostate cancer. Trends in Radiopharmaceuticals (ISTR-2019), Proceedings of an International Symposium, 2020, реферат	1

 последующие документы указаны в продолжении

\* Особые категории ссылочных документов:

«А» - документ, определяющий общий уровень техники

«D» - документ, приведенный в евразийской заявке

«Е» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи евразийской заявки или после нее

«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.

"P" - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки, но после даты испрашиваемого приоритета"

«Т» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения


«Х» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности

«У» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий изобретательский уровень в сочетании с другими документами той же категории

«&amp;» - документ, являющийся патентом-аналогом

«L» - документ, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: 14 октября 2022 (14.10.2022)

Уполномоченное лицо:  
Начальник Управления экспертизы

С.Е. Аверкиев