

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(11) **048049**

(13) **B1**

**(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ**

**(45)** Дата публикации и выдачи патента  
**2024.10.22**

**(21)** Номер заявки  
**202292656**

**(22)** Дата подачи заявки  
**2021.04.12**

**(51)** Int. Cl. *A01P 3/00* (2006.01)  
*A01N 37/46* (2006.01)  
*A01N 37/52* (2006.01)  
*A01N 43/36* (2006.01)  
*A01N 43/42* (2006.01)  
*A01N 43/54* (2006.01)  
*A01N 47/32* (2006.01)  
*A01N 43/653* (2006.01)  
*A01N 43/30* (2006.01)  
*A01N 43/56* (2006.01)  
*A01N 43/40* (2006.01)  
*A01N 43/88* (2006.01)  
*A01N 37/50* (2006.01)  
*A01N 37/34* (2006.01)  
*A01N 47/14* (2006.01)  
*A01N 59/16* (2006.01)

---

**(54) КОМБИНАЦИИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СОДЕРЖАЩИЕ ИХ ФУНГИЦИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ**

---

**(31)** 20169945.1

**(32)** 2020.04.16

**(33)** EP

**(43)** 2023.02.06

**(86)** PCT/EP2021/059401

**(87)** WO 2021/209366 2021.10.21

**(71)(73)** Заявитель и патентовладелец:  
**БАЙЕР АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ  
(DE)**

**(72)** Изобретатель:  
**Гёртц Андреас, Гёлих Франк (DE)**

**(74)** Представитель:  
**Беляева Е.Н., Беляев С.Б. (BY)**

**(56)** WO-A1-2019093522  
WO-A1-2014095994  
WO-A1-2018145921

---

**(57)** Изобретение касается комбинации активных соединений для борьбы с фитопатогенными грибами, содержащей (A) в качестве соединения (A) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, (B) в качестве дополнительного активного соединения (B) (13.004) проквиназид, и (C) по меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (C), выбранное из (1.018) протиоконазола и (1.020) спироксамина.

---

**B1**

**048049**

**048049**

**B1**

Изобретение касается комбинаций активных соединений, содержащих в качестве соединения (А) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановую кислоту и их смеси, и в качестве соединения (В) и (С) по меньшей мере, два дополнительных указанных фунгицида. Более того изобретение касается фунгицидных композиций, содержащих указанную комбинацию соединений, а также применения комбинаций соединений и фунгицидных композиций в качестве биологически активного вещества, в частности, для борьбы с фитопатогенными грибами в области защиты растений и защиты промышленных материалов и в качестве регуляторов роста растений.

По всему тексту данной заявки термины "композиция" и "препаративная форма" используются как синонимы и относятся к смесям комбинации соединений по изобретению и, по меньшей мере, одному пригодному в области сельского хозяйства вспомогательному веществу.

Метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат и 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановая кислота, их приготовление и фунгицидное действие указанных соединений известно из WO 2019/093522 A1. WO 2019/093522 A1 также раскрывает композиции, содержащие, по меньшей мере, одно из указанных соединений, и, кроме того, также композиции активных соединений, содержащие, по меньшей мере, одно из указанных соединений и, по меньшей мере, одно дополнительное активное вещество, в частности, дополнительный фунгицид.

Метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановая кислота и известные комбинации соединений, содержащие любое из указанных соединений, обеспечивают превосходное средство защиты растений от болезней, вызываемых грибами. Однако по-прежнему существует необходимость в совершенствовании этих средств для удовлетворения постоянно растущих экологических и экономических требований, предъявляемых к современным средствам и композициям для защиты растений. Это включает, например, улучшение спектра действия, профиля безопасности, селективности, скорости нанесения, образования остатков и благоприятной способности к приготовлению, а также разработку новых композиций для решения потенциальных проблем, таких как устойчивость.

Настоящее изобретение предоставляет композиции активных соединений и композиции, содержащие указанные комбинации, которые, по меньшей мере, в некоторых аспектах достигают заявленной цели.

Соответственно, настоящее изобретение предоставляет композиции активных соединений, содержащие

(А) в качестве соединения (А) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, 2-[2-хлор-4-(4-хлорфеноксифенил)-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановую кислоту и их смеси,

(В) одно дополнительное активное соединение (В), и

(С) по меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (С),

причем соединение (В) выбрано из следующих групп (4) и (6) - (15) и, по меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (С) выбрано из следующих групп (1) - (15):

(1) ингибиторы синтеза эргостерола,

(2) ингибиторы дыхательной цепи в комплексе I или II,

(3) ингибиторы дыхательной цепи в комплексе III, выбранные из группы, состоящей из (3.001) амектрадина, (3.002) амисульброма, (3.003) азоксистробина, (3.004) коуметоксистробина, (3.005) коумоксистробина, (3.006) циазофамида, (3.007) димоксистробина, (3.008) эноккастрибина, (3.009) фамоксадона, (3.010) фенамидона, (3.011) флуфеноксистробина, (3.012) флуоккастрибина, (3.013) крезоксим-метила, (3.014) метоминострибина, (3.015) оризастрибина, (3.016) пикоксистробина, (3.017) пиракlostробина, (3.018) пираметостробина, (3.019) пираоксистробина, (3.020) трифлуксистробина, (3.021) (2E)-2-{2-[[{(1E)-1-(3-{[(E)-1-фтор-2-фенилвинил]окси}фенил)этилиден]амино}окси]метил]фенил}-2-(метоксиимино)-N-метилацетамида, (3.022) (2E,3Z)-5-[[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]окси]-2-(метоксиимино)-N, 3-диметилпент-3-енамида, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-диметилфеноксифенил)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-диметилфеноксифенил)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.025) фенпикоксамида, (3.026) мандестробина, (3.027) N-(3-этил-3,5,5-триметилциклогексил)-3-формамид-2-гидроксибензамида, (3.028) (2E,3Z)-5-[[1-(4-хлор-2-фторфенил)-1H-пиразол-3-ил]окси]-2-(метоксиимино)-N,3-диметилпент-3-енамида, (3.029) метил {5-[3-(2,4-диметилфенил)-1H-пиразол-1-ил]-2-метилбензил} карбамата, (3.030) метилтетрапрола и (3.031) флорипикоксамида,

(4) ингибиторы митоза и клеточного деления,

(5) соединения, способные оказывать мультисайтовое действие,

(6) соединения, способные индуцировать иммунную защиту,

(7) ингибиторы биосинтеза аминокислоты и/или белка,

(8) ингибиторы производства АТФ,

(9) ингибиторы синтеза клеточной стенки,


(10) ингибиторы синтеза липидов и мембраны,

(11) ингибиторы биосинтеза меланина,  
 (12) ингибиторы синтеза нуклеиновой кислоты,  
 (13) ингибиторы сигнальной трансдукции,  
 (14) соединения, способные действовать как разобщитель,  
 (15) дополнительные фунгициды, выбранные из группы, состоящей из (15.001) абсцизовой кислоты, (15.002) бентазола, (15.003) бетоказина, (15.004) капсимицина, (15.005) карвона, (15.006) хинометтионата, (15.007) куфранеба, (15.008) цифлуфенамида, (15.009) цимоксанила, (15.010) ципросульфамида, (15.011) флутианила, (15.012) фосетил-алюминия, (15.013) фосетил-кальция, (15.014) фосетил-натрия, (15.015) метил изотиоцианата, (15.016) метрафенона, (15.017) милдиомицина, (15.018) натамицина, (15.019) диметилдитиокарбамата никеля, (15.020) нитротал-изопропила, (15.021) оксамокарба, (15.022) оксатиапипролина, (15.023) оксифентиина, (15.024) пентахлорфенола и солей, (15.025) фосфорной кислоты и ее солей, (15.026) пропамокарб-фосетилата, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.028) тебуфлуквина, (15.029) теклофталама, (15.030) толнифанида, (15.031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанона, (15.032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-1-ил]этанона, (15.033) 2-(6-бензилпиперидин-2-ил)хиназолина, (15.034) дипиметитрона, (15.035) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.036) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-хлор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.037) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-фтор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.038) 2-[6-(3-фтор-4-метоксифенил)-5-метилпиперидин-2-ил]хиназолина, (15.039) 2-[(5R)-3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил]-3-хлорфенил метансульфоната, (15.040) 2-[(5S)-3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил]-3-хлорфенил метансульфоната, (15.041) ипфлуфеноквина, (15.042) 2-{2-фтор-6-[(8-фтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]фенил}пропан-2-ола, (15.043) 2-{3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил]-3-хлорфенил метансульфоната, (15.044) 2-{3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1H-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}фенил метансульфоната, (15.045) 2-фенилфенола и солей, (15.046) 3-(4,4,5-трифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолина, (15.047) хинофумелина, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1H)-он), (15.049) 4-оксо-4-[(2-фенилэтил)амино]бутановой кислоты, (15.050) 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола, (15.051) 5-хлор-N'-фенил-N'-(проп-2-ин-1-ил)тиофен-2-сульфогидазида, (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.053) 5-фтор-2-[4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.054) 9-фтор-2,2-диметил-5-(хинолин-3-ил)-2,3-дигидро-1,4-бензоксазепина, (15.055) бут-3-ин-1-ил {6-[(Z)-(1-метил-1H-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси]метил]пиридин-2-ил}карбамата, (15.056) этил (2Z)-3-амино-2-циано-3-фенилакрилата, (15.057) феназин-1-карбоновой кислоты, (15.058) пропил 3,4,5-тригидроксибензоата, (15.059) хинолин-8-ола, (15.060) хинолин-8-ол сульфата (2:1), (15.061) трет-бутил {6-[(Z)-(1-метил-1H-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси]метил]пиридин-2-ил}карбамата (общепринятое наименование: пикабутразокс), (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-она, (15.063) аминопирифена, (15.064) (N'-[2-хлор-4-(2-фторфенокси)-5-метилфенил]-N-этил-N-метилимидоформамида), (15.065) (N'-(2-хлор-5-метил-4-феноксифенил)-N-этил-N-метилимидоформамида), (15.066) (2-{2-[(7,8-дифтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]-6-фторфенил}пропан-2-ола), (15.067) (5-бром-1-(5,6-диметилпиперидин-3-ил)-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолина), (15.068) (3-(4,4-дифтор-5,5-диметил-4,5-дигидротieno[2,3-с]пиридин-7-ил)хинолина), (15.069) (1-(4,5-диметил-1H-бензимидазол-1-ил)-4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолина), (15.070) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолона, (15.071) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолона, (15.072) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)-8-фторхинолина, (15.073) (N-метил-N-фенил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид), (15.074) (метил {4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил}карбамата), (15.075) (N-{4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензил}циклопропанкарбоксамид), (15.076) N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид), (15.077) N-[(E)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид, (15.078) N-[(Z)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид, (15.079) N-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]циклопропанкарбоксамид, (15.080) N-(2-фторфенил)-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид, (15.081) 2,2-дифтор-N-метил-2-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]ацетамида, (15.082) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]ацетамида, (15.083) N-[(E)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид, (15.084) N-[(Z)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамид, (15.085) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.086) 4,4-диметил-1-[[4-[5-

(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.087) N-метил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензолкарботиоамида, (15.088) 5-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.089) N-((2,3-дифтор-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил)-3,3-трифтор-пропанамида, (15.090) 1-метокси-1-метил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.091) 1,1-диэтил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.092) N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.093) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксоамида, (15.094) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.095) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксоамида, (15.096) N,2-диметокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.097) N-этил-2-метил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.098) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.099) 1,3-диметокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.100) 3-этил-1-метокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.101) 1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-он, (15.102) 4,4-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она, (15.103) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она, (15.104) 3,3-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-она, (15.105) 1-[[3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]азепан-2-она, (15.106) 4,4-диметил-2-[[4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она и (15.107) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]-изооксазолидин-3-она, причем, по меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (C) является отличным от соединения (A) и соединения (B).


Комбинации активных соединений согласно изобретению содержат в качестве соединения (A) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановую кислоту и их смеси, причем соединения могут присутствовать в виде их соли или N-оксида. Соли или N-оксиды указанных соединений также обладают фунгицидными свойствами.

Метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат изображен формулой (I-1)



и обозначается в дальнейшем также как соединение (I-1) или просто (I-1).

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановая кислота изображен формулой (I-2)



и обозначается в дальнейшем также как соединение (I-2) или просто (I-2).

Соединение (I-1), соединение (I-2) и их смеси в дальнейшем совместно именуется как соединение (I) или просто (I).

Как видно из формул (I-1) и (I-2), соединения (I-1) и (I-2) содержат стереогенный центр у атома углерода, несущий гидроксильную группу. Следовательно, соединения могут присутствовать в форме оптических изомеров, их рацемических или скалемических смесей (термин "скалемический" обозначает смесь энантиомеров в различных пропорциях), во всех пропорциях. Соединения (I-1) и (I-2) могут быть использованы в комбинациях активных соединений согласно настоящему изобретению в любой из указанных форм, т.е. (I-1) могут присутствовать в виде метил (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата, метил (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата, рацемат метил (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-

(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата и метил (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата, и любой скалемической смеси метил (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата и метил (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноата, и (I-2) могут присутствовать в виде (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты, (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты, рацемата (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты и (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты, и любой скалемической смеси (2R)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты и (2S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропановой кислоты.

Предпочтительно, комбинации активных соединений согласно изобретению содержат в качестве соединения (A) соединение (I-1).

Комбинации активных соединений согласно изобретению дополнительно содержат одно активное соединение (B), выбранное из групп (4) и (6) - (15), приведенных выше. Обратите внимание, что группы просто обозначены соответствующим номером в скобках, например, группа (4) обозначается как (4) ингибиторы митоза и клеточного деления.

Соединение (B) предпочтительно выбрано из следующих:

ингибиторы митоза и клеточного деления, выбранные из группы, состоящей из (4.001) карбендазима, (4.002) дизтофенкарба, (4.003) этабоксама, (4.004) флуопиколида, (4.005) пенцикурона, (4.006) табендазола, (4.007) тиофанат-метила, (4.008) зоксамида, (4.009) 3-хлор-4-(2,6-дифторфенил)-6-метил-5-фенилпиридазина, (4.010) 3-хлор-5-(4-хлорфенил)-4-(2,6-дифторфенил)-6-метилпиридазина, (4.011) 3-хлор-5-(6-хлорпиридин-3-ил)-6-метил-4-(2,4,6-трифторфенил)пиридазина, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.013) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-бром-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.014) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-бромфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.016) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлорфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.017) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.018) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.019) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.020) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-хлорфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.021) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.022) 4-(4-хлорфенил)-5-(2,6-дифторфенил)-3,6-диметилпиридазина, (4.023) N-(2-бром-6-фторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.024) N-(2-бромфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, и (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, соединения, способные индуцировать иммунную защиту, выбранные из группы, состоящей из (6.001) ацибензолар-S-метила, (6.002) изотианила, (6.003) пробеназола, и (6.004) тиадинила, ингибиторы биосинтеза аминокислоты и/или белка, выбранные из группы, состоящей из (7.001) ципродинила, (7.002) касугамицина, (7.003) гидрохлорид гидрата касугамицина, (7.004) окситетрациклина, (7.005) пириметанила, и (7.006) 3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)хинолона, ингибиторы производства АТФ, выбранные из группы, состоящей из (8.001) силтиофама, ингибиторы синтеза клеточной стенки, выбранные из группы, состоящей из (9.001) бенгтиваликарба, (9.002) диметоморфа, (9.003) флуморфа, (9.004) ипроваликарба, (9.005) мандипропамида, (9.006) приморфа, (9.007) валифеналата, (9.008) (2E)-3-(4-трет-бутилфенил)-3-(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-ил)проп-2-ен-1-она, и (9.009) (2Z)-3-(4-трет-бутилфенил)-3-(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-ил)проп-2-ен-1-она, ингибиторы синтеза липидов и мембраны, выбранные из группы, состоящей из (10.001) пропамокарба, (10.002) пропамокарб гидрохлорида, (10.003) толклофос-метила, и (10.004) флуоксапипролина, ингибиторы биосинтеза меланина, выбранные из группы, состоящей из (11.001) трициклазола, и (11.002) 2,2,2-трифторэтил {3-метил-1-[(4-метилбензоил)амино]бутан-2-ил}карбамата, ингибиторы синтеза нуклеиновой кислоты, выбранные из группы, состоящей из (12.001) беналаксил, (12.002) беналаксил-М (киралаксил), (12.003) металаксил, и (12.004) металаксил-М (мефеноксама), ингибиторы сигнальной трансдукции, выбранные из группы, состоящей из (13.001) флудиоксонил, (13.002) ипродион, (13.003) процимидон, (13.004) проквиназид, (13.005) хиноксифен, и (13.006) винклозолин, соединения, способные действовать как разобщитель, выбранные из группы, состоящей из (14.001) флуазинама, и (14.002) мептилдинокапа, дополнительные фунгициды, выбранные из группы, состоящей из (15.001) абсцизовой кислоты, (15.002) бенгтиазола, (15.003) бетоксазина, (15.004) капсимидин, (15.005) карвон, (15.006) хинометионат, (15.007) куфранба, (15.008) цифлуфенамид, (15.009) цимоксанил, (15.010) ципросульфамид, (15.011) флутианил, (15.012) фосетил-алюминия, (15.013) фосетил-кальция, (15.014) фосетил-натрия, (15.015) метил изотиоцианата, (15.016) метрафенон, (15.017) милдиомицин, (15.018) натамицин, (15.019) диметилдителиокарбамат никеля, (15.020) нитротал-изопропил, (15.021) оксамокарба, (15.022) оксатиапипролин, (15.023) оксифентин, (15.024) пентахлорфенол и солей, (15.025) фосфорной кислоты и ее солей, (15.026) пропамокарб-фосетилата, (15.027) пириофенон (хлазафенон), (15.028) тебуфловин, (15.029) теклофталама, (15.030) толнифанид, (15.031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-

тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанона, (15.032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанона, (15.033) 2-(6-бензилпиперидин-2-ил)хиназолина, (15.034) диметитрона, (15.035) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.036) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-хлор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.037) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-фтор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.038) 2-[6-(3-фтор-4-метоксифенил)-5-метилпиперидин-2-ил]хиназолина, (15.039) 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил] ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}-3-хлорфенил метансульфоната, (15.040) 2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}-3-хлорфенил метансульфоната, (15.041) ипфлуфеноквина, (15.042) 2-{2-фтор-6-[(8-фтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]фенил}пропан-2-ола, (15.043) 2-{3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}-3-хлорфенил метансульфоната, (15.044) 2-{3-[2-(1-{[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}фенил метансульфоната, (15.045) 2-фенилфенола и солей, (15.046) 3-(4,4,5-трифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолина, (15.047) хинофумелина, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1Н)-он), (15.049) 4-оксо-4-[(2-фенилэтил)амино]бутановой кислоты, (15.050) 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола, (15.051) 5-хлор-N'-фенил-N'-(проп-2-ин-1-ил)тиофен-2-сульфогидразида, (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.054) 9-фтор-2,2-диметил-5-(хинолин-3-ил)-2,3-дигидро-1,4-бензоксазепина, (15.055) бут-3-ин-1-ил {6-[(Z)-(1-метил-1Н-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси]метил]пиридин-2-ил}карбамата, (15.056) этил (2Z)-3-амино-2-циано-3-фенилакрилат, (15.057) феназин-1-карбоновой кислоты, (15.058) пропил 3,4,5-тригидроксибензоата, (15.059) хинолин-8-ола, (15.060) хинолин-8-ол сульфата (2:1), (15.061) трет-бутил {6-[(Z)-(1-метил-1Н-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси]метил]пиридин-2-ил}карбамата (общепринятое наименование: пикабутразокс), (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-она, (15.063) аминопирифена, (15.064) (N'-[2-хлор-4-(2-фторфенокси)-5-метилфенил]-N-этил-N-метилимидоформамида), (15.065) (N'-[2-хлор-5-метил-4-феноксифенил]-N-этил-N-метилимидоформамида), (15.066) (2-{2-[(7,8-дифтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]-6-фторфенил}пропан-2-ола), (15.067) (5-бром-1-(5,6-диметилпиперидин-3-ил)-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиназолина), (15.068) (3-(4,4-дифтор-5,5-диметил-4,5-дигидроотиено[2,3-с]пиридин-7-ил)хинолина), (15.069) (1-(4,5-диметил-1Н-бензимидазол-1-ил)-4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиназолина), (15.070) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиназолин-1-ил)хинолона, (15.071) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизоксиназолин-1-ил)хинолона, (15.072) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиназолин-1-ил)-8-фторхинолина, (15.073) (N-метил-N-фенил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида), (15.074) (метил{4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил}карбамата), (15.075) (N-(4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензил}циклопропанкарбоксамид), (15.076) N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.077) N-[(E)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.078) N-[(Z)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.079) N-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]циклопропанкарбоксамид, (15.080) N-(2-фторфенил)-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.081) 2,2-дифтор-N-метил-2-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]ацетамида, (15.082) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]ацетамида, (15.083) N-[(E)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.084) N-[(Z)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.085) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.086) 4,4-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.087) N-метил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензолкарботиоамид, (15.088) 5-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.089) N-((2,3-дифтор-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил)-3,3,3-трифторпропанамида, (15.090) 1-метокси-1-метил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.091) 1,1-диэтил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.092) N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.093) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксамид, (15.094) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.095) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксамид, (15.096) N,2-диметокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.097) N-этил-2-метил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.098) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.099) 1,3-диметокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.100) 3-этил-1-метокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-

оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.101) 1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-она, (15.102) 4,4-диметил-2-[[4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она, (15.103) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изоксазолидин-3-она, (15.104) 3,3-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-она, (15.105) 1-[[3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]азепан-2-она, (15.106) 4,4-диметил-2-[[4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изоксазолидин-3-она и (15.107) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изоксазолидин-3-она.

Соединение (В) более предпочтительно выбрано из:

(4.005) пенцикурона, (4.007) тиофанат-метила, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (6.002) изотианила, (7.001) ципродинила, (7.005) пириметанила, (12.003) металаксил, (12.004) металаксил-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксонил, (13.002) ипродиона, (13.004) проквиназида, (13.005) хиноксифена, (14.001) флуазинама, (14.002) мептилдинокапа, (15.008) цифлуфенамида, (15.010) ципросульфамида, (15.011) флутанила, (15.012) фосетил-алюминия, (15.016) метрафенона, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолона, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1Н)-она), (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амин и (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-она.

Соединение (В) более предпочтительно выбрано из:

(4.005) пенцикурона, (4.007) тиофанат-метила, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амин, (6.002) изотианила, (7.005) пириметанила, (12.003) металаксил, (12.004) металаксил-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксонил, (13.004) проквиназида, (14.001) флуазинама, (14.002) мептилдинокапа, (15.008) цифлуфенамида, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолона, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1Н)-он), (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амин и (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-она.

Соединение (В) наиболее предпочтительно выбрано из: (4.005) пенцикурона, (12.003) металаксил, (12.004) металаксил-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксонил, (13.004) проквиназида, (15.008) цифлуфенамида и (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксинолин-1-ил)хинолина.

Комбинации активных соединений согласно изобретению дополнительно содержат, по меньшей мере, одно соединение (С), выбранное из групп (1) - (15), приведенных выше. По меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (С) является отличным от соединений (А) и (В).

Соединение (С) предпочтительно выбрано из следующих:

ингибиторы биосинтеза эргостерола, выбранные из группы, состоящей из (1.001) ципроконазола, (1.002) дифеноконазола, (1.003) эпоксиконазола, (1.004) фенгексамида, (1.005) фенпропидина, (1.006) фенпропиморфа, (1.007) фенпиразамина, (1.008) флуквинконазола, (1.009) флутриафола, (1.010) имазалила, (1.011) имазалил сульфата, (1.012) ипконазола, (1.013) метконазола, (1.014) миклобутанила, (1.015) паклобутразола, (1.016) прохлораза, (1.017) пропиконазола, (1.018) протиоконазола, (1.019) пиризоксазола, (1.020) спироксамина, (1.021) тебуконазола, (1.022) тетраконазола, (1.023) триадименола, (1.024) тридеморфа, (1.025) тритиконазола, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.028) (2R)-2-(1-хлорциклопропил)-4-[(1R)-2,2-дихлорциклопропил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.029) (2R)-2-(1-хлорциклопропил)-4-[(1S)-2,2-дихлорциклопропил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.030) (2R)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ола, (1.031) (2S)-2-(1-хлорциклопропил)-4-[(1R)-2,2-дихлорциклопропил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.032) (2S)-2-(1-хлорциклопропил)-4-[(1S)-2,2-дихлорциклопропил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.033) (2S)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ола, (1.034) (R)-[3-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил](пиридин-3-ил)метанола, (1.035) (S)-[3-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил](пиридин-3-ил)метанола, (1.036) [3-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(2,4-дифторфенил)-1,2-оксазол-4-ил](пиридин-3-ил)метанола, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-4-метил-1,3-диоксолан-2-ил}метил)-1Н-1,2,4-триазола, (1.038) 1-({(2S,4S)-2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-4-метил-1,3-диоксолан-2-ил}метил)-1Н-1,2,4-триазола, (1.039) 1-{{[3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол-5-ил тиоцианата, (1.040) 1-{{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол-5-ил тиоцианата, (1.041) 1-{{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол-5-

ил тиоцианата, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.050) 2-[1-(2,4-дихлорфенил)-5-гидрокси-2,6,6-триметилгептан-4-ил]-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.051) 2-[2-хлор-4-(2,4-дихлорфенокси)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ола, (1.052) 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.053) 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ола, (1.054) 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-2-ола, (1.055) мефентрифлуконазола, (1.056) 2-{{[3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.057) 2-{{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.058) 2-{{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тиона, (1.059) 5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метилциклопентанола, (1.060) 5-(аллилсульфанил)-1-{{[3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1H-1,2,4-триазола, (1.061) 5-(аллилсульфанил)-1-{{[rel(2R,3R)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1H-1,2,4-триазола, (1.062) 5-(аллилсульфанил)-1-{{[rel(2R,3S)-3-(2-хлорфенил)-2-(2,4-дифторфенил)оксиран-2-ил]метил}-1H-1,2,4-триазола, (1.063) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-(1,1,2,2-тетрафторэтоксифенил)сульфанил]фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.064) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-(2,2,2-трифторэтоксифенил)сульфанил]фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.065) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-(2,2,3,3-тетрафторпропокси)фенил]сульфанил]фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.066) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-(пентафторэтоксифенил)сульфанил]фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.067) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-{{[1,1,2,2-тетрафторэтил]сульфанил]фенокси}фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.068) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-{{[2,2,2-трифторэтил]сульфанил]фенокси}фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.069) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-{{[2,2,3,3-тетрафторпропил]сульфанил]фенокси}фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.070) N'-(2,5-диметил-4-{{[3-{{[пентафторэтил]сульфанил]фенокси}фенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.071) N'-(2,5-диметил-4-феноксифенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.072) N'-(4-{{[3-(дифторметокси)фенил]сульфанил}-2,5-диметилфенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.073) N'-(4-{{[3-(дифторметил)сульфанил]фенокси}-2,5-диметилфенил)-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.074) N'-[5-бром-6-(2,3-дигидро-1H-инден-2-илокси)-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.075) N'-[4-{{[4,5-дихлор-1,3-тиазол-2-ил]окси}-2,5-диметилфенил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.076) N'-[5-бром-6-{{[1R]-1-(3,5-дифторфенил)этоксифенил]-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.077) N'-[5-бром-6-{{[1S]-1-(3,5-дифторфенил)этоксифенил]-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.078) N'-[5-бром-6-{{[цис-4-изопропилциклогексил]окси]-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.079) N'-[5-бром-6-{{[транс-4-изопропилциклогексил]окси]-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, (1.080) N'-[5-бром-6-{{[1-(3,5-дифторфенил)этоксифенил]-2-метилпиридин-3-ил]-N-этил-N-метилимидоформамида, и (1.081) ипфентрифлуконазола, ингибиторы дыхательной цепи в комплексе I или II, выбранные из группы, состоящей из (2.001) бензовиндифлупира, (2.002) биксафена, (2.003) боскалида, (2.004) карбоксина, (2.005) флуопирама, (2.006) флутоланила, (2.007) флуксапироксада, (2.008) фураметпира, (2.009) изофетамида, (2.010) изопиразама (анти-эпимерный энантиомер 1R,4S,9S), (2.011) изопиразама (анти-эпимерный энантиомер 1S,4R,9R), (2.012) изопиразама (анти-эпимерный рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.013) изопиразама (смесь син-эпимерного рацемата 1RS,4SR,9RS и анти-эпимерного рацемата 1RS,4SR,9SR), (2.014) изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1R,4S,9R), (2.015) изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1S,4R,9S), (2.016) изопиразама (син-эпимерный рацемат 1RS,4SR,9RS), (2.017) пенфлуфена, (2.018) пентиопирада, (2.019) пидифлуметофена, (2.020) Пиразифлумида, (2.021) седаксана, (2.022) 1,3-диметил-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил)-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.023) 1,3-диметил-N-{{[3R]-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил]-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.024) 1,3-диметил-N-{{[3S]-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил]-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.025) 1-метил-3-(трифторметил)-N-{{[2'-(трифторметил)бифенил-2-ил]-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.026) 2-фтор-6-(трифторметил)-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил)бензамида, (2.027) инпирфлуксама, (2.028) 3-(дифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил)-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.029) 3-(дифторметил)-1-метил-N-{{[3S]-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил]-1H-пирозол-4-карбоксамида, (2.030) 3-(дифторметил)-N-(7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил)-1-метил-N-пирозол-4-карбоксамида, (2.031) 3-(дифторметил)-N-{{[3R]-7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил]-1-метил-N-пирозол-4-карбоксамида, (2.032) 3-(дифторметил)-N-{{[3S]-7-фтор-1,1,3-триметил-2,3-дигидро-1H-инден-4-ил]-1-метил-N-пирозол-4-карбоксамида, (2.033) 5,8-дифтор-N-

[2-(2-фтор-4-{[4-(трифторметил)пиридин-2-ил]окси}фенил)этил]хиназолин-4-амин, (2.034) N-(2-циклопентил-5-фторбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.035) N-(2-трет-бутил-5-метилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.036) N-(2-трет-бутилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.037) N-(5-хлор-2-этилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.038) N-(5-хлор-2-изопропилбензил)-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид (общепринятое наименование: изофлуциграм), (2.039) N-[(1R,4S)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтаден-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.040) N-[(1S,4R)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтаден-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.041) N-[1-(2,4-дихлорфенил)-1-метоксипропан-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.042) N-[2-хлор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.043) N-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.044) N-[5-хлор-2-(трифторметил)бензил]-N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.045) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-N-[5-метил-2-(трифторметил)бензил]-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.046) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-фтор-6-изопропилбензил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.047) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропил-5-метилбензил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.048) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропилбензил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.049) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(2-изопропилбензил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.050) N-циклопропил-3-(дифторметил)-5-фтор-N-(5-фтор-2-изопропилбензил)-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.051) N-циклопропил-3-(дифторметил)-N-(2-этил-4,5-диметилбензил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.052) N-циклопропил-3-(дифторметил)-N-(2-этил-5-фторбензил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.053) N-циклопропил-3-(дифторметил)-N-(2-этил-5-метилбензил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.054) N-циклопропил-N-(2-циклопропил-5-фторбензил)-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.055) N-циклопропил-N-(2-циклопропил-5-метилбензил)-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид, (2.056) N-циклопропил-N-(2-циклопропилбензил)-3-(дифторметил)-5-фтор-1-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид и (2.057) пирпропоина, ингибиторы дыхательной цепи в комплексе III, выбранные из группы, состоящей из (3.001) аметоктрадина, (3.002) амисульброма, (3.003) азоксистеробина, (3.004) коуметоксистеробина, (3.005) коумоксистеробина, (3.006) циазофамида, (3.007) димоксистеробина, (3.008) эноксастеробина, (3.009) фамоксадона, (3.010) фенамидона, (3.011) флуфеноксистеробина, (3.012) флуоксастеробина, (3.013) крезоксим-метила, (3.014) метоминостеробина, (3.015) оризастеробина, (3.016) пикоксистеробина, (3.017) пиракlostеробина, (3.018) пираметостеробина, (3.019) пираоксистеробина, (3.020) трифлуксистеробина, (3.021) (2E)-2-{2-[[{(1E)-1-(3-{(E)-1-фтор-2-фенилвинил]окси}фенил)этилен]амино]окси]метил}фенил}-2-(метоксиимино)-N-метилацетамида, (3.022) (2E,3Z)-5-[[1-(4-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]окси]-2-(метоксиимино)-N,3-диметилпент-3-енамида, (3.023) (2R)-2-{2-[[{(2,5-диметилфенокси)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.024) (2S)-2-{2-[[{(2,5-диметилфенокси)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.025) фенпикоксамида, (3.026) мандестеробина, (3.027) N-(3-этил-3,5,5-триметилциклогексил)-3-формамид-2-гидроксибензамида, (3.028) (2E,3Z)-5-[[1-(4-хлор-2-фторфенил)-1H-пиразол-3-ил]окси]-2-(метоксиимино)-N,3-диметилпент-3-енамида, (3.029) метил {5-[3-(2,4-диметилфенил)-1H-пиразол-1-ил]-2-метилбензил}карбамата, (3.030) метилтетрапрола и (3.031) флорипикоксамида, ингибиторы митоза и клеточного деления, выбранные из группы, состоящей из (4.001) карбендазима, (4.002) диэтофенкарба, (4.003) этабоксама, (4.004) флуопиколида, (4.005) пенцикурона, (4.006) табендазола, (4.007) тиофанат-метила, (4.008) зоксамида, (4.009) 3-хлор-4-(2,6-дифторфенил)-6-метил-5-фенилпиридазина, (4.010) 3-хлор-5-(4-хлорфенил)-4-(2,6-дифторфенил)-6-метилпиридазина, (4.011) 3-хлор-5-(6-хлорпиридин-3-ил)-6-метил-4-(2,4,6-трифторфенил)пиридазина, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.013) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-бром-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.014) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-бромфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.016) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлорфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.017) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.018) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.019) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.020) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-хлорфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.021) 4-(2-хлор-4-фторфенил)-N-(2-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.022) 4-(4-хлорфенил)-5-(2,6-дифторфенил)-3,6-диметилпиридазина, (4.023) N-(2-бром-6-фторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, (4.024) N-(2-бромфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, и (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амин, соединения, способные оказывать мульгисайтовое действие, выбранные из группы, состоящей из (5.001) бордоской жидкости, (5.002) каптафола, (5.003) каптана, (5.004) хлорталонила, (5.005) гидроксида меди, (5.006) нафтена меди, (5.007) оксида меди, (5.008) оксихлорида меди, (5.009) медь(2+) сульфата, (5.010) дитианола,

(5.011) додина, (5.012) фолпета, (5.013) манкозеба, (5.014) манеба, (5.015) метирама, (5.016) метирам цинка, (5.017) оксината меди, (5.018) пропинеба, (5.019) серы и препаратов серы, включая полисульфид кальция, (5.020) тирама, (5.021) зинеба, (5.022) зирама, и (5.023) 6-этил-5,7-диоксо-6,7-дигидро-5Н-пирроло[3',4':5,6][1,4]дитиино[2,3-с][1,2]тиазол-3-карбонитрила, соединения, способные индуцировать иммунную защиту, выбранные из группы, состоящей из (6.001) ацибензолар-S-метила, (6.002) изотианила, (6.003) пробеназола, и (6.004) тиадинила, ингибиторы биосинтеза аминокислоты и/или белка, выбранные из группы, состоящей из (7.001) ципродинила, (7.002) касугамицина, (7.003) гидрохлорид гидрата касугамицина, (7.004) окситетрациклина, (7.005) пириметанила, и (7.006) 3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизооксинолин-1-ил)хинолона, ингибиторы производства АТФ, выбранные из группы, состоящей из (8.001) силтиофама, ингибиторы синтеза клеточной стенки, выбранные из группы, состоящей из (9.001) бентаваликарба, (9.002) диметоморфа, (9.003) флуморфа, (9.004) ипроваликарба, (9.005) мандипропамида, (9.006) пириморфа, (9.007) валифеналата, (9.008) (2E)-3-(4-трет-бутилфенил)-3-(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-ил)проп-2-ен-1-она, и (9.009) (2Z)-3-(4-трет-бутилфенил)-3-(2-хлорпиридин-4-ил)-1-(морфолин-4-ил)проп-2-ен-1-она, ингибиторы синтеза липидов и мембраны, выбранные из группы, состоящей из (10.001) пропамокарба, (10.002) пропамокарб гидрохлорида, (10.003) толклофос-метила, и (10.004) флуоксапипролина, ингибиторы биосинтеза меланина, выбранные из группы, состоящей из (11.001) трициклазола, и (11.002) 2,2,2-трифторэтил {3-метил-1-[(4-метилбензоил)амино]бутан-2-ил}карбамата, ингибиторы синтеза нуклеиновой кислоты, выбранные из группы, состоящей из (12.001) беналаксил, (12.002) беналаксил-М (киралаксил), (12.003) металаксил, и (12.004) металаксил-М (мефеноксам), ингибиторы сигнальной трансдукции, выбранные из группы, состоящей из (13.001) флудиоксона, (13.002) ипродиона, (13.003) процимидона, (13.004) проквиназида, (13.005) хиноксифена, и (13.006) винклозолина, соединения, способные действовать как разобщитель, выбранные из группы, состоящей из (14.001) флуазинама, и (14.002) мептилдинокапа, дополнительные фунгициды, выбранные из группы, состоящей из (15.001) абсцизовой кислоты, (15.002) бентазола, (15.003) бетоксазина, (15.004) капсимицина, (15.005) карвона, (15.006) хинометионата, (15.007) куфранеба, (15.008) цифлуфенамид, (15.009) цимоксанила, (15.010) ципросульфамида, (15.011) флутианила, (15.012) фосетил-алюминия, (15.013) фосетил-кальция, (15.014) фосетил-натрия, (15.015) метил изотиоцианата, (15.016) метрафенона, (15.017) милдиомицина, (15.018) натамицина, (15.019) диметилдитиокарбамата никеля, (15.020) нитротал-изопропила, (15.021) оксамокарба, (15.022) оксатиапипролина, (15.023) оксифентина, (15.024) пентахлорфенола и солей, (15.025) фосфорной кислоты и ее солей, (15.026) пропамокарб-фосетилата, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.028) тебуфлорквины, (15.029) теклофталама, (15.030) толнифанида, (15.031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанона, (15.032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанона, (15.033) 2-(6-бензилпиридин-2-ил)хиназолина, (15.034) дипиметитрона, (15.035) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.036) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-хлор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.037) 2-[3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]-1-[4-(4-{5-[2-фтор-6-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)этанона, (15.038) 2-[6-(3-фтор-4-метоксифенил)-5-метилпиридин-2-ил]хиназолина, (15.039) 2-[(5R)-3-[2-(1-{3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил]-3-хлорфенил метансульфоната, (15.040) 2-[(5S)-3-[2-(1-{3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил]-3-хлорфенил метансульфоната, (15.041) Ипфлуфеноквина, (15.042) 2-{2-фтор-6-[(8-фтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]фенил}пропан-2-ола, (15.043) 2-{3-[2-(1-{3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}-3-хлорфенил метансульфоната, (15.044) 2-{3-[2-(1-{3,5-бис(дифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]ацетил}пиперидин-4-ил)-1,3-тиазол-4-ил]-4,5-дигидро-1,2-оксазол-5-ил}фенил метансульфоната, (15.045) 2-фенилфенола и солей, (15.046) 3-(4,4,5-трифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизооксинолин-1-ил)хинолина, (15.047) хинофумелина, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1H)-он), (15.049) 4-оксо-4-[(2-фенилэтил)амино]бутановой кислоты, (15.050) 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол, (15.051) 5-хлор-N'-фенил-N'-(проп-2-ин-1-ил)тиофен-2-сульфогидразида, (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амин, (15.054) 9-фтор-2,2-диметил-5-(хинолин-3-ил)-2,3-дигидро-1,4-бензоксазепина, (15.055) бут-3-ин-1-ил {6-[(Z)-(1-метил-1Н-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси метилпиридин-2-ил}карбамата, (15.056) этил (2Z)-3-амино-2-циано-3-фенилакрилата, (15.057) феназин-1-карбоновой кислоты, (15.058) пропил 3,4,5-тригидроксибензоата, (15.059) хинолин-8-ола, (15.060) хинолин-8-ол сульфата (2:1), (15.061) трет-бутил {6-[(Z)-(1-метил-1Н-тетразол-5-ил)(фенил)метил]амино}окси метилпиридин-2-ил}карбамата (общепринятое наименование: пикабутразокс), (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-он, (15.063) аминопирифена, (15.064) (N'-[2-хлор-4-(2-фторфенокси)-5-метилфенил]-N-этил-N-метилимидоформамида), (15.065) (N'-(2-хлор-5-метил-4-феноксифенил)-N-

этил-N-метилимидоформамида), (15.066) (2-{2-[(7,8-дифтор-2-метилхинолин-3-ил)окси]-6-фторфенил} пропан-2-ола), (15.067) (5-бром-1-(5,6-диметилпиридин-3-ил)-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксина), (15.068) (3-(4,4-дифтор-5,5-диметил-4,5-дигидропиридино[2,3-с]пиридин-7-ил)хинолина), (15.069) (1-(4,5-диметил-1Н-бензимидазол-1-ил)-4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксина), (15.070) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиналин-1-ил)хинолона, (15.071) 8-фтор-3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигидроизоксиналин-1-ил)хинолона, (15.072) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизоксиналин-1-ил)-8-фторхинолина, (15.073) (N-метил-N-фенил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида), (15.074) (метил{4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил}карбамата), (15.075) (N-(4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензил}циклопропанкарбоксамид), (15.076) N-метил-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида), (15.077) N-[(E)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.078) N-[(Z)-метоксииминометил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.079) N-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]циклопропанкарбоксамид, (15.080) N-(2-фторфенил)-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.081) 2,2-дифтор-N-метил-2-[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]ацетамида, (15.082) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]ацетамида, (15.083) N-[(E)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.084) N-[(Z)-N-метокси-С-метил-карбонимидоил]-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензамида, (15.085) N-аллил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.086) 4,4-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.087) N-метил-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензолкарботиоамида, (15.088) 5-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пирролидин-2-она, (15.089) N-((2,3-дифтор-4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил)-3,3,3-трифтор-пропанамида, (15.090) 1-метокси-1-метил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.091) 1,1-диэтил-3-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.092) N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.093) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксамид, (15.094) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.095) N-метокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]циклопропанкарбоксамид, (15.096) N,2-диметокси-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.097) N-этил-2-метил-N-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пропанамида, (15.098) 1-метокси-3-метил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.099) 1,3-диметокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.100) 3-этил-1-метокси-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]мочевины, (15.101) 1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-она, (15.102) 4,4-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она, (15.103) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она, (15.104) 3,3-диметил-1-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]пиперидин-2-она, (15.105) 1-[[3-фтор-4-(5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]азепан-2-она, (15.106) 4,4-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она и (15.107) 5,5-диметил-2-[[4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]фенил]метил]изооксазолидин-3-она.

Соединение (С) более предпочтительно выбрано из:

(1.001) ципроконазола, (1.002) дифеноконазола, (1.003) эпоксиконазола, (1.004) фенгексамида, (1.010) имазадила, (1.012) ипконазола, (1.013) метконазола, (1.017) пропиконазола, (1.018) протиоконазола, (1.020) спироксамина, (1.021) тебуконазола, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.059) 5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (2.001) бензовиндифлутира, (2.002) биксафена, (2.003) боскалида, (2.005) флуопирама, (2.007) флуксапироксада, (2.009) Изофетамида, (2.010) изопиразама (анти-эпимерный энантиомер 1R,4S,9S), (2.011) изопиразама (анти-эпимерный энантиомер 1S,4R,9R), (2.012) изопиразама (анти-эпимерный рацемат 1RS,4SR,9SR), (2.013) изопиразама (смесь син-эпимерного рацемата 1RS,4SR,9RS и анти-эпимерного рацемата 1RS,4SR,9SR), (2.014) изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1R,4S,9R), (2.015) изопиразама (син-эпимерный энантиомер 1S,4R,9S), (2.016) изопиразама (син-эпимерный рацемат 1RS,4SR,9RS), (2.017) пенфлуфена, (2.018) пентиопирада, (2.019) пидифлуметофена, (2.021) седаксана, (2.027) инпирфлуксама, (2.030) флуиндапира, (2.038) изофлуципрама, (3.003) азоксистробина, (3.007) димоксистробина, (3.012) флуоксастробина, (3.013) крезоксимметила, (3.016) пикоксистробина, (3.017) пиракlostробина, (3.020) трифлуксистробина, (3.025) фенпикоксамида, (3.026) 2-{2-[(2,5-диметилфенокси)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.030) метилтетрапрола, (3.031) флорипикоксамида, (4.005) пенцикурона, (4.007) тиофанат-метила, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амина, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амина, (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1Н-пиразол-5-амина, (5.003) каптана, (5.004) хлорталонила, (5.011) додина, (5.012) фолпета, (5.013) манкозеба, (5.015) метирама, (5.018) пропиенеба, (6.002)

изотианила, (7.001) ципродинила, (7.005) пириметанила, (10.004) флуоксапипролина, (12.003) металаксила, (12.004) металаксила-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксопила, (13.002) ипродиона, (13.004) проквиназид, (13.005) хиноксифена, (14.001) флуазинома, (14.002) мептилдинокапа, (15.008) цифлуфенамида, (15.010) ципросульфамида, (15.011) флутианила, (15.012) фосетил-алюминия, (15.016) метрафенона, (15.018) натамицина, (15.022) оксатиапипролина, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизооксинолин-1-ил)хинолона, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1H)-он), (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.061) пикабутразокса и (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-она.

Соединение (С) более предпочтительно выбрано из:

(1.002) дифеноксоназола, (1.010) имазалила, (1.012) ипконазола, (1.018) протиоконазола, (1.020) спирокамина, (1.021) тебуконазола, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (1.059) 5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанола, (2.001) бензовиндифлупира, (2.002) бикасфена, (2.005) флуопирама, (2.007) флуксапироксада, (2.017) пенфлуфена, (2.018) пентиопирада, (2.019) пидифлуметофена, (2.021) седаксана, (2.027) инпирфлуксама, (2.030) флуиндапира, (2.038) изофлуципрама, (3.003) азоксистробина, (3.012) флуоксастробина, (3.016) пикоксистробина, (3.017) пиракlostробина, (3.020) трифлуксистробина, (3.025) фенпикоксамида, (3.026) 2-{2-[(2,5-диметилфенокси)метил]фенил}-2-метокси-N-метилацетамида, (3.030) метилтетрапрола, (3.031) флорипикоксамида, (4.005) пенцикурона, (4.007) тиофанат-метила, (4.012) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2,6-дифторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амина, (4.015) 4-(2-бром-4-фторфенил)-N-(2-хлор-6-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амина, (4.025) N-(4-хлор-2,6-дифторфенил)-4-(2-хлор-4-фторфенил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-амина, (5.004) хлорталонила, (5.011) додина, (5.012) фолпета, (5.013) манкозеба, (5.018) пропинеба, (6.002) изотианила, (7.005) пириметанила, (10.004) флуоксапипролина, (12.003) металаксила, (12.004) металаксила-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксопила, (13.004) проквиназида, (14.001) флуазинома, (14.002) мептилдинокапа, (15.008) цифлуфенамида, (15.018) натамицина, (15.022) оксатиапипролина, (15.027) пириофенона (хлазафенона), (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизооксинолин-1-ил)хинолона, (15.048) 4-амино-5-фторпиримидин-2-ола (таутомерная форма: 4-амино-5-фторпиримидин-2(1H)-он), (15.052) 5-фтор-2-[(4-фторбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.053) 5-фтор-2-[(4-метилбензил)окси]пиримидин-4-амина, (15.061) пикабутразокса и (15.062) 5-фтор-4-имино-3-метил-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-она.

Соединение (С) наиболее предпочтительно выбрано из:

(1.012) ипконазола, (1.018) протиоконазола, (1.020) спирокамина, (1.021) тебуконазола, (2.002) бикасфена, (2.005) флуопирама, (2.007) флуксапироксада, (2.017) пенфлуфена, (2.021) седаксана, (2.027) инпирфлуксама, (2.038) изофлуципрама, (3.012) флуоксастробина, (3.020) трифлуксистробина, (3.025) фенпикоксамида, (3.030) метилтетрапрола, (3.031) флорипикоксамида, (4.005) пенцикурона, (5.004) хлорталонила, (5.013) манкозеба, (5.018) пропинеба, (10.004) флуоксапипролина, (12.003) металаксила, (12.004) металаксила-М (мефеноксама), (13.001) флудиоксопила, (13.004) проквиназида, (15.008) цифлуфенамида, (15.018) натамицина, (15.022) оксатиапипролина, (15.047) 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигидроизооксинолин-1-ил)хинолина, и (15.061) пикабутразокса.

Комбинации соединений согласно изобретению могут содержать 1, 2 или еще более соединений (С). Предпочтительно, комбинации соединений согласно изобретению содержат 1 или 2 соединения (С), более предпочтительно только 1 соединение (С).

Предпочтительно, соединение(ния) (С) выбрано/выбраны из группы (1) - (15), отличной от соединения (В). Например, если соединение (В) выбрано из группы (4), соединение(ния) (С) предпочтительно выбрано/выбраны из групп (1) - (3) и (5) - (15).

Предпочтительные комбинации соединений выбраны из следующих смесей:

(I) + (4.005) + (1.012), (I) + (4.005) + (1.018), (I) + (4.005) + (1.020), (I) + (4.005) + (1.021), (I) + (4.005) + (2.002), (I) + (4.005) + (2.005), (I) + (4.005) + (2.007), (I) + (4.005) + (2.017), (I) + (4.005) + (2.021), (I) + (4.005) + (2.027), (I) + (4.005) + (2.038), (I) + (4.005) + (3.012), (I) + (4.005) + (3.020), (I) + (4.005) + (3.025), (I) + (4.005) + (3.030), (I) + (4.005) + (3.031), (I) + (4.005) + (5.004), (I) + (4.005) + (5.013), (I) + (4.005) + (5.018), (I) + (4.005) + (10.004), (I) + (4.005) + (12.003), (I) + (4.005) + (12.004), (I) + (4.005) + (13.001), (I) + (4.005) + (13.004), (I) + (4.005) + (15.008), (I) + (4.005) + (15.018), (I) + (4.005) + (15.022), (I) + (4.005) + (15.047), (I) + (4.005) + (15.061),

(I) + (12.003) + (1.012), (I) + (12.003) + (1.018), (I) + (12.003) + (1.020), (I) + (12.003) + (1.021), (I) + (12.003) + (2.002), (I) + (12.003) + (2.005), (I) + (12.003) + (2.007), (I) + (12.003) + (2.017), (I) + (12.003) + (2.021), (I) + (12.003) + (2.027), (I) + (12.003) + (2.038), (I) + (12.003) + (3.012), (I) + (12.003) + (3.020), (I) + (12.003) + (3.025), (I) + (12.003) + (3.030), (I) + (12.003) + (3.031), (I) + (12.003) + (5.004), (I) + (12.003) + (5.013), (I) + (12.003) + (5.018), (I) + (12.003) + (10.004), (I) + (12.003) + (13.001), (I) + (12.003) + (13.004), (I) + (12.003) + (15.008), (I) + (12.003) + (15.018), (I) + (12.003) + (15.022), (I) + (12.003) + (15.047), (I) + (12.003) + (15.061),

(I) + (12.004) + (1.012), (I) + (12.004) + (1.018), (I) + (12.004) + (1.020), (I) + (12.004) + (1.021), (I) + (12.004) + (2.002), (I) + (12.004) + (2.005), (I) + (12.004) + (2.007), (I) + (12.004) + (2.017), (I) + (12.004) + (2.021), (I) + (12.004) + (2.027), (I) + (12.004) + (2.038), (I) + (12.004) + (3.012), (I) + (12.004) + (3.020), (I) + (12.004) + (3.025), (I) + (12.004) + (3.030), (I) + (12.004) + (3.031), (I) + (12.004) + (5.004), (I) + (12.004) + (5.013), (I) + (12.004) + (5.018), (I) + (12.004) + (10.004), (I) + (12.004) + (13.001), (I) + (12.004) + (13.004), (I) + (12.004) + (15.008), (I) + (12.004) + (15.018), (I) + (12.004) + (15.022), (I) + (12.004) + (15.047), (I) + (12.004) + (15.061),

(I) + (13.001) + (1.012), (I) + (13.001) + (1.018), (I) + (13.001) + (1.020), (I) + (13.001) + (1.021), (I) + (13.001) + (2.002), (I) + (13.001) + (2.005), (I) + (13.001) + (2.007), (I) +

(13.001) + (2.017), (I) + (13.001) + (2.021), (I) + (13.001) + (2.027), (I) + (13.001) + (2.038), (I) + (13.001) + (3.012), (I) + (13.001) + (3.020), (I) + (13.001) + (3.025), (I) + (13.001) + (3.030), (I) + (13.001) + (3.031), (I) + (13.001) + (5.004), (I) + (13.001) + (5.013), (I) + (13.001) + (5.018), (I) + (13.001) + (10.004), (I) + (13.001) + (15.008), (I) + (13.001) + (15.018), (I) + (13.001) + (15.022), (I) + (13.001) + (15.047), (I) + (13.001) + (15.061),

(I) + (13.004) + (1.012), (I) + (13.004) + (1.018), (I) + (13.004) + (1.020), (I) + (13.004) + (1.021), (I) + (13.004) + (2.002), (I) + (13.004) + (2.005), (I) + (13.004) + (2.007), (I) + (13.004) + (2.017), (I) + (13.004) + (2.021), (I) + (13.004) + (2.027), (I) + (13.004) + (2.038), (I) + (13.004) + (3.012), (I) + (13.004) + (3.020), (I) + (13.004) + (3.025), (I) + (13.004) + (3.030), (I) + (13.004) + (3.031), (I) + (13.004) + (5.004), (I) + (13.004) + (5.013), (I) + (13.004) + (5.018), (I) + (13.004) + (10.004), (I) + (13.004) + (15.008), (I) + (13.004) + (15.018), (I) + (13.004) + (15.022), (I) + (13.004) + (15.047), (I) + (13.004) + (15.061),

(I) + (15.008) + (1.012), (I) + (15.008) + (1.018), (I) + (15.008) + (1.020), (I) + (15.008) + (1.021), (I) + (15.008) + (2.002), (I) + (15.008) + (2.005), (I) + (15.008) + (2.007), (I) + (15.008) + (2.017), (I) + (15.008) + (2.021), (I) + (15.008) + (2.027), (I) + (15.008) + (2.038), (I) + (15.008) + (3.012), (I) + (15.008) + (3.020), (I) + (15.008) + (3.025), (I) + (15.008) + (3.030), (I) + (15.008) + (3.031), (I) + (15.008) + (5.004), (I) + (15.008) + (5.013), (I) + (15.008) + (5.018), (I) + (15.008) + (10.004),

(I) + (15.047) + (1.012), (I) + (15.047) + (1.018), (I) + (15.047) + (1.020), (I) + (15.047) + (1.021), (I) + (15.047) + (2.002), (I) + (15.047) + (2.005), (I) + (15.047) + (2.007), (I) + (15.047) + (2.017), (I) + (15.047) + (2.021), (I) + (15.047) + (2.027), (I) + (15.047) + (2.038), (I) + (15.047) + (3.012), (I) + (15.047) + (3.020), (I) + (15.047) + (3.025), (I) + (15.047) + (3.030), (I) + (15.047) + (3.031), (I) + (15.047) + (5.004), (I) + (15.047) + (5.013), (I) + (15.047) + (5.018), (I) + (15.047) + (10.004).

Как отмечалось выше, в любой из указанных смесей (I) относится к соединению (I-1), соединению (I-2) или их смесям, предпочтительно к соединению (I-1).

В указанных комбинациях согласно изобретению, содержащих смесь (I-1) и (I-2), соединения (I-1) и (I-2) могут присутствовать в широком диапазоне эффективного массового соотношения (I-1) : (I-2), например, в диапазоне 100,000:1 - 1:100, предпочтительно в массовом соотношении 100:1 - 1:100, более предпочтительно в массовом соотношении 50:1 - 1:50, наиболее предпочтительно в массовом соотношении 20:1 - 1:20. Дополнительными соотношениями (I-1) : (I-2), которые могут использоваться согласно настоящему изобретению с возрастающим предпочтением в приведенном порядке, являются: 95:1 - 1:95, 90:1 - 1:90, 85:1 - 1:85, 80:1 - 1:80, 75:1 - 1:75, 70:1 - 1:70, 65:1 - 1:65, 60:1 - 1:60, 55:1 - 1:55, 45:1 - 1:45, 40:1 - 1:40, 35:1 - 1:35, 30:1 - 1:30, 25:1 - 1:25, 15:1 - 1:15, 10:1 - 1:10, 5:1 - 1:5, 4:1 - 1:4, 3:1 - 1:3, 2:1 - 1:2.

Дополнительными соотношениями (I-1) : (I-2), которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 95:1 - 1:1, 90:1 - 1:1, 85:1 - 1:1, 80:1 - 1:1, 75:1 - 1:1, 70:1 - 1:1, 65:1 - 1:1, 60:1 - 1:1, 55:1 - 1:1, 45:1 - 1:1, 40:1 - 1:1, 35:1 - 1:1, 30:1 - 1:1, 25:1 - 1:1, 15:1 - 1:1, 10:1 - 1:1, 5:1 - 1:1, 4:1 - 1:1, 3:1 - 1:1, 2:1 - 1:1.

Дополнительными соотношениями (I-1) : (I-2), которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 1:1 - 1:95, 1:1 - 1:90, 1:1 - 1:85, 1:1 - 1:80, 1:1 - 1:75, 1:1 - 1:70, 1:1 - 1:65, 1:1 - 1:60,

1:1 - 1:55, 1:1 - 1:45, 1:1 - 1:40, 1:1 - 1:35, 1:1 - 1:30, 1:1 - 1:25, 1:1 - 1:15, 1:1 - 1:10, 1:1 - 1:5, 1:1 - 1:4, 1:1 - 1:3, 1:1 - 1:2.

В комбинациях согласно изобретению соединения (A) и (B) могут присутствовать в широком диапазоне эффективного массового соотношения A:B, например, в диапазоне 500:1 - 1:500, 400:1 - 1:400, 300:1 - 1:300, 250:1 - 1:250, 200:1 - 1:200, 150:1 - 1:150, 100:1 - 1:100, предпочтительно в массовом соотношении 50:1 - 1:50, наиболее предпочтительно в массовом соотношении 20:1 - 1:20. Дополнительными соотношениями A:B, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению с возрастающим предпочтением в приведенном порядке, являются: 95:1 - 1:95, 90:1 - 1:90, 85:1 - 1:85, 80:1 - 1:80, 75:1 - 1:75, 70:1 - 1:70, 65:1 - 1:65, 60:1 - 1:60, 55:1 - 1:55, 45:1 - 1:45, 40:1 - 1:40, 35:1 - 1:35, 30:1 - 1:30, 25:1 - 1:25, 15:1 - 1:15, 10:1 - 1:10, 5:1 - 1:5, 4:1 - 1:4, 3:1 - 1:3, 2:1 - 1:2.

Дополнительными соотношениями A:B, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 500:1 - 1:1, 250:1 - 1:1, 95:1 - 1:1, 90:1 - 1:1, 85:1 - 1:1, 80:1 - 1:1, 75:1 - 1:1, 70:1 - 1:1, 65:1 - 1:1, 60:1 - 1:1, 55:1 - 1:1, 45:1 - 1:1, 40:1 - 1:1, 35:1 - 1:1, 30:1 - 1:1, 25:1 - 1:1, 15:1 - 1:1, 10:1 - 1:1, 5:1 - 1:1, 4:1 - 1:1, 3:1 - 1:1, 2:1 - 1:1.

Дополнительными соотношениями A:B, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 1:1 - 1:500, 1:1 - 1:250, 1:1 - 1:95, 1:1 - 1:90, 1:1 - 1:85, 1:1 - 1:80, 1:1 - 1:75, 1:1 - 1:70, 1:1 - 1:65, 1:1 - 1:60, 1:1 - 1:55, 1:1 - 1:45, 1:1 - 1:40, 1:1 - 1:35, 1:1 - 1:30, 1:1 - 1:25, 1:1 - 1:15, 1:1 - 1:10, 1:1 - 1:5, 1:1 - 1:4, 1:1 - 1:3, 1:1 - 1:2.

В комбинациях согласно изобретению соединения (A) и (C) могут присутствовать в широком диапазоне эффективного массового соотношения A:C, например, в диапазоне 100:1 - 1:100, предпочтительно в массовом соотношении 50:1 - 1:50, наиболее предпочтительно в массовом соотношении 20:1 - 1:20. Дополнительными соотношениями A:C, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению с возрастающим предпочтением в приведенном порядке, являются: 500:1 - 1:500, 400:1 - 1:400, 300:1 - 1:300, 250:1 - 1:250, 200:1 - 1:200, 150:1 - 1:150, 95:1 - 1:95, 90:1 - 1:90, 85:1 - 1:85, 80:1 - 1:80, 75:1 - 1:75, 70:1 - 1:70, 65:1 - 1:65, 60:1 - 1:60, 55:1 - 1:55, 45:1 - 1:45, 40:1 - 1:40, 35:1 - 1:35, 30:1 - 1:30, 25:1 - 1:25, 15:1 - 1:15, 10:1 - 1:10, 5:1 - 1:5, 4:1 - 1:4, 3:1 - 1:3, 2:1 - 1:2.

Дополнительными соотношениями A:C, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 500:1 - 1:1, 250:1 - 1:1, 95:1 - 1:1, 90:1 - 1:1, 85:1 - 1:1, 80:1 - 1:1, 75:1 - 1:1, 70:1 - 1:1, 65:1 - 1:1, 60:1 - 1:1, 55:1 - 1:1, 45:1 - 1:1, 40:1 - 1:1, 35:1 - 1:1, 30:1 - 1:1, 25:1 - 1:1, 15:1 - 1:1, 10:1 - 1:1, 5:1 - 1:1, 4:1 - 1:1, 3:1 - 1:1, 2:1 - 1:1.

Дополнительными соотношениями A:C, которые могут использоваться согласно настоящему изобретению, являются: 1:1 - 1:500, 1:1 - 1:250, 1:1 - 1:95, 1:1 - 1:90, 1:1 - 1:85, 1:1 - 1:80, 1:1 - 1:75, 1:1 - 1:70, 1:1 - 1:65, 1:1 - 1:60, 1:1 - 1:55, 1:1 - 1:45, 1:1 - 1:40, 1:1 - 1:35, 1:1 - 1:30, 1:1 - 1:25, 1:1 - 1:15, 1:1 - 1:10, 1:1 - 1:5, 1:1 - 1:4, 1:1 - 1:3, 1:1 - 1:2.

В комбинациях согласно изобретению также соединения (B) и (C) могут присутствовать в широком диапазоне эффективного массового соотношения B:C. Соответствующее массовое соотношение автоматически определяется из выбранных массовых соотношений A:B и A:C.

Если присутствуют более одного, например, 2 или 3, соединения (C), массовое соотношение относится к общему количеству соединения (C), т.е. к сумме количества каждого соединения (C), присутствующего в комбинации. Это применимо с соответствующими изменениями, если присутствуют 2 соединения (A), т.е. смесь (I-1) и (I-2), т.е. в таком случае массовое соотношение относится к общему количеству соединения (A), т.е. к сумме количества каждого соединения (A), присутствующего в комбинации.

#### Изомеры

Как уже указывалось выше, соединения (I-1) и (I-2) могут присутствовать в виде разных стереоизомеров. В зависимости от свойств заместителей соединения (B) и (C), а также соединения (B) и (C) могут присутствовать в комбинациях соединений по изобретению в виде различных стереоизомеров. Такими стереоизомерами могут быть, например, энантиомеры, диастереомеры, атропоизомеры или геометрические изомеры. Соответственно изобретение относится как к чистым изомерам, так и к любым смесям данных изомеров. В тех случаях, когда соединение может присутствовать в двух или более таутомерных формах в равновесии, в случае, если по тексту упоминается одна таутомерная форма соединения, то такое упоминание включает все таутомерные формы. В тех случаях, когда соединение может присутствовать в изомерных и/или таутомерных формах, такое соединение при упоминании по тексту настоящего документа также включает, в соответствующих случаях, соответствующие изомерные и/или таутомерные формы или их смеси, даже если они не упомянуты отдельно.

#### Соли /N-Оксиды

В зависимости от свойств заместителей соединения, присутствующие в комбинациях соединений по изобретению, могут присутствовать в форме свободного соединения и/или их сольвата, и/или агрохимически активной соли, и/или N-оксида.

Агрохимически активные соли включают кислотно-аддитивные соли неорганических и органических кислот, а также соли обычных оснований. Примерами неорганических кислот являются галогенводородные кислоты, такие как фторводород, хлороводород, бромоводород и иодоводород, серная кислота, ортофосфорная кислота и азотная кислота, а также соли кислот, такие как бисульфат натрия и бисульфат

калия. Применимые органические кислоты включают, например, муравьиную кислоту, карбоновую кислоту и алкановые кислоты, такие как уксусная кислота, трифторуксусная кислота, трихлоруксусная кислота и пропионовая кислота, а также гликолевая кислота, тиоциановая кислота, молочная кислота, янтарная кислота, лимонная кислота, бензойная кислота, коричная кислота, щавелевая кислота, насыщенные или моно- или диненасыщенные жирные кислоты с 6 - 20 атомами углерода, моноэфиры алкилсерной кислоты, алкилсульфоновые кислоты (сульфоновые кислоты с неразветвленными или разветвленными алкильными радикалами с 1 - 20 атомами углерода), арилсульфоновые кислоты или арилдисульфоновые кислоты (ароматические радикалы, такие как фенил и нафтил, которые несут одну или две группы сульфоновой кислоты), алкилфосфоновые кислоты (фосфоновые кислоты с неразветвленными или разветвленными алкильными радикалами с 1 - 20 атомами углерода), арилфосфоновые кислоты или арилдифосфоновые кислоты (ароматические радикалы, такие как фенил и нафтил, которые несут один или два радикала фосфоновой кислоты), где алкил- и арил- радикалы могут нести дополнительные заместители, например, *p*-толуолсульфоновая кислота, салициловая кислота, *p*-аминосалициловая кислота, 2-феноксibenзойная кислота, 2-ацетоксибензойная кислота.

Сольваты соединений, присутствующих в комбинациях соединений по изобретению, или их соли являются стехиометрическими композициями соединений с растворителями.

N-оксиды соединений, присутствующих в комбинациях соединений по изобретению, или их промежуточных соединений могут быть получены простыми способами с применением обычных процессов, например, путем N-окисления с перекисью водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), надкислотами, например, надсерной кислотой или надкарбонными кислотами, такими как мета-хлорпероксибензойная кислота или пероксомоносерная кислота (кислота Каро).

Например, соответствующие N-оксиды могут быть получены с использованием в качестве исходных соответствующих соединений с применением традиционных методов окисления, например, за счет обработки этих соединений органической перкислотой, такой как метахлорпербензойная кислота (например, WO-A 2003/64572 или J. Med. Chem. 38 (11), 1892-1903, 1995); или с неорганическими окислителями, такими как перекись водорода (e.g. J. Heterocyc. Chem. 18 (7), 1305-1308, 1981) или оксон (e.g. J. Am. Chem. Soc. 123 (25), 5962-5973, 2001). В результате окисления могут получиться чистые моно-N-оксиды или смесь разных N-оксидов, которые можно разделить традиционными методами, такими как хроматография.

#### Кристаллическая форма

Соединения, присутствующие в комбинациях соединений по изобретению по настоящему изобретению, могут существовать в различных кристаллических и/или аморфных формах. Кристаллические формы включают несольватированные кристаллические формы, сольваты и гидраты.

#### Препаративные формы

Настоящее изобретение также относится к композициям для борьбы с нежелательными микроорганизмами, включающей комбинацию соединений по настоящему изобретению. С использованием композиций может осуществляться обработка самих микроорганизмов и/или места их обитания.

Композиция содержит одну комбинацию соединений по изобретению и, по меньшей мере, одно агрономически приемлемое вспомогательное вещество, например, носитель(и) и/или поверхностно-активное вещество(а).

Носитель представляет собой твердое или жидкое, природное или синтетическое, органическое или неорганическое вещество, которое обычно является инертным. Как правило, носитель повышает эффективность нанесения активных соединений, например, на растения, части растений или на семена. Примеры соответствующих твердых носителей включают, помимо прочего, соли аммония, порошок естественной горной породы, например, каолины, глины, тальк, мел, кварц, аттапульгит, монтмориллонит и диатомовую землю, и порошок синтетической горной породы, например, тонкоизмельченный диоксид кремния, глинозем и силикаты. Примеры обычно используемых твердых носителей для получения гранул включают, помимо прочего: измельченные и фракционированные естественные породы, такие как кальцит, мрамор, пемза, сепиолит и доломит, а также синтетические грануляты из неорганических и органических мук и грануляты из органического материала, такого как бумага, опилки, скорлупа кокосового ореха, початки кукурузы и стебли табака. Примеры соответствующих жидких носителей включают, помимо прочего, воду, органические растворители и их комбинации. Примеры соответствующих растворителей включают полярные и неполярные органические химические жидкости, например, из классов ароматических и неароматических углеводородов (таких как циклогексан, парафины, алкилбензолы, ксилол, толуол, алкилнафталины, хлорированные ароматические соединения или хлорированные алифатические углеводороды, такие как хлорбензолы, хлорэтилены или метиленхлорид), спирты и полиолы (которые, при необходимости, могут также быть замещены, образовывать простой и/или сложный эфир), кетоны (такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон или циклогексанон), сложные эфиры (включая жиры и масла) и (поли)эфиры, незамещенные и замещенные амины, амиды (такие как диметилформамид), лактамы (такие как N-алкилпирролидоны) и лактоны, сульфоны и сульфоксиды (такие как диметилсульфоксид). Носителем также может являться сжиженный газовый разбавитель, т.е. жидкость, которая при обычной температуре и обычном давлении находится в газообразном состоянии, на-

пример, аэрозольные пропелленты, такие как галогенуглеводороды, бутан, пропан, азот и диоксид углерода. Количество носителя, как правило, находится в диапазоне 1 - 99,99%, предпочтительно 5- 99,9%, более предпочтительно 10 - 99,5%, наиболее предпочтительно 20 - 99 мас.% композиции.

Поверхностно-активное вещество может представлять собой ионное (катионное или анионное) или неионное поверхностно-активное вещество, такое как ионный или неионный эмульгатор(ы), пенообразователь(и), диспергатор(ы), смачивающий агент(ы) и любые их смеси. Примеры таких соответствующих поверхностно-активных веществ включают, помимо прочего, соли полиакриловой кислоты, соли лигносульфоновой кислоты, соли фенолсульфоновой или нафталенсульфоновой кислоты, поликонденсаты этилен- и/или пропиленоксида с жирными спиртами или с жирными кислотами, или с аминами жирного ряда (сложные эфиры полиоксиэтилена и жирной кислоты, простые эфиры полиоксиэтилена и жирного спирта, например, простые эфиры алкиларилполигликоля), замещенные фенолы (предпочтительно алкилфенолы или арилфенолы), соли эфиров сульфоянтарной кислоты, производные таурина (предпочтительно алкилтаураты), эфиры фосфорной кислоты полиэтоксилированных спиртов или фенолов, эфиры жирной кислоты полиолов, производные соединений, содержащие сульфаты, сульфонаты и фосфаты, (например, алкилсульфонаты, алкилсульфаты, арилсульфонаты) и белковые гидролизаты, лигносульфитный щелок и метилцеллюлоза. Поверхностно-активное вещество обычно используется, когда соединение из комбинации соединений по изобретению и/или носитель нерастворимы в воде, но применяются с использованием воды. Если они присутствуют, то количество поверхностно-активных веществ обычно составляет 5-40 мас.% от общей массы композиции.

Другие примеры соответствующих вспомогательных веществ включают водоотталкивающие агенты, сиккативы, связующие вещества (адгезивы, вещества для повышения клейкости, закрепители, такие как карбоксиметилцеллюлоза, натуральные и синтетические полимеры в форме порошков, гранул или латексных дисперсий, такие как гуммиарабик, поливиниловый спирт и поливинилацетат, натуральные фосфолипиды, такие как цефалины и лецитины, и синтетические фосфолипиды, поливинилпирролидон и тилоза), загустители, стабилизаторы (например, стабилизаторы холода, консерванты, антиоксиданты, светостабилизаторы или другие агенты, улучшающие химическую и/или физическую стабильность), красители или пигменты (такие как неорганические пигменты, например, оксид железа, оксид титана и берлинская синь; органические красители, например, ализарин, азо- и фталоцианиновые металлические красители), пеногасители (например, силиконовые пеногасители и стеарат магния), консерванты (например, дихлорфен и полуформаль бензилового спирта), вторичные загустители (производные целлюлозы, производные акриловой кислоты, ксантан, модифицированные глины и тонкоизмельченный диоксид кремния), клейкие вещества, гиббереллины и технологические вспомогательные средства, минеральные и растительные масла, ароматизирующие вещества, воски, питательные вещества (включая микроэлементы, такие как соли железа, марганца, бора, меди, кобальта, молибдена и цинк), защитные коллоиды, тиксотропные вещества, пенетранты, секвестранты и комплексообразователи.

Выбор вспомогательных веществ зависит от предполагаемого способа применения комбинации соединений по изобретению и/или от физических свойств. Кроме того, вспомогательные вещества могут быть выбраны таким образом, чтобы придать определенные свойства (технические, физические и/или биологические свойства) препаративным формам/композициям или формам для использования, полученным из таких соединений. Путем выбора соответствующих вспомогательных веществ можно изготавливать композиции в зависимости от конкретных потребностей.

Композиция может быть в любой обычной форме, такой как раствор (например, водный раствор), эмульсия, смачиваемый порошок, суспензия на водной или масляной основе, порошок, пылевидный препарат, паста, растворимый порошок, растворимые гранулы, гранулы для разбросного внесения, концентраты суспензии, натуральные или синтетические продукты, пропитанные комбинацией соединений по изобретению, удобрения, а также микрокапсуляции в полимерном веществе. Комбинация соединений по изобретению может присутствовать в форме суспензии, эмульсии или раствора.

Препаративные формы могут быть получены известными способами, например, путем смешивания активных ингредиентов, по меньшей мере, с одним вспомогательным веществом.

Композиция может предоставляться конечному пользователю в виде препарата, готового к применению, т.е. композиции могут наноситься непосредственно на растения или семена с помощью подходящего устройства, такого как опрыскиватель или распылитель. В качестве альтернативы, композиции могут предоставляться конечному пользователю в виде концентратов, которые перед использованием необходимо разбавлять, предпочтительно водой.

Препаративные формы обычно содержат от 0,01 до 99 мас.%, от 0,05 до 98 мас.%, предпочтительно от 0,1 до 95 мас.%, более предпочтительно от 0,5 до 90%, наиболее предпочтительно от 1 до 80 мас.% комбинации соединений настоящего изобретения. Если композиция содержит два или более активных ингредиента, указанные диапазоны относятся к общему количеству комбинации соединений по настоящему изобретению.

Охарактеризованные выше препаративные формы могут использоваться для борьбы с нежелательными микроорганизмами за счет их нанесения на микроорганизмы и/или их район распространения.

В одном конкретном варианте осуществления изобретения комбинация соединений предоставляет-

ся в распыляемой форме, позволяющей наносить ее распылением. В данном варианте осуществления комбинация соединений согласно изобретению предоставляется в виде композиции/препаративной формы, включающей активные ингредиенты и, по меньшей мере, один подходящий жидкий носитель.

Подходящие жидкие носители предпочтительно выбирают из воды, органических растворителей и их комбинаций. Более предпочтительно жидкий носитель представляет собой воду или смесь воды и органического растворителя.

Предпочтительными подходящими органическими растворителями являются растворители, которые уже были описаны выше.

Количество жидкого носителя, как правило, находится в диапазоне 1 - 99,99%, предпочтительно 5 - 99,9%, более предпочтительно 10 - 99,5%, наиболее предпочтительно 20 - 99 мас.% композиции.

Предпочтительно, чтобы распыляемая композиция дополнительно содержала, по меньшей мере, одно поверхностно-активное вещество. Подходящие поверхностно-активные вещества описаны выше. Сюда также может входить по крайней мере один дополнительный вспомогательный элемент, как отмечалось выше.

Предпочтительно, распыляемая композиция представлена в виде эмульгируемого концентрата или суспензионного концентрата, более предпочтительно эмульгируемого концентрата, содержащего активные ингредиенты в общем количестве от 20 до 400 г/л, предпочтительно от 40 до 200 г/л, или суспензионного концентрата, содержащего активные ингредиенты в общем количестве от 50 до 500 г/л, предпочтительно от 100 до 400 г/л.

Получение указанных концентратов хорошо известно специалистам в данной области. Например, эмульгируемые концентраты (ЭК) можно получить путем растворения желаемого количества активных ингредиентов, например, от 20 до 400 г на литр концентрата и от 50 до 100 г на литр концентрата по крайней мере одного поверхностно-активного вещества в нерастворимом в воде органическом растворителе, например, в ароматическом углеводороде или водорастворимом органическом растворителе, например, N-метил-2-пирролидон (NMP), диметилсульфоксид (ДМСО),  $\gamma$ -бутиролактон. Суспензионные концентраты (СК) можно получить путем смешивания желаемого количества активных ингредиентов, например, от 50 до 500 г на литр концентрата, от 20 до 100 г на литр концентрата по крайней мере одного поверхностно-активного вещества и от 1 до 20 г на литр концентрата по крайней мере одного связывающего вещества и/или вторичного загустителя и суспендирования этой смеси в воде.

Предпочтительно, перед нанесением указанных концентратов на растение или его часть концентрат разбавляют водой. Более предпочтительно, эмульгируемый концентрат или суспензионный концентрат смешивают с водой в таком количестве, чтобы получить общую концентрацию активных ингредиентов в полученной смеси от 0,1 до 5, предпочтительно от 0,2 до 2, более предпочтительно от 0,25 до 1 г/л.

Дополнительные активные ингредиенты

Комбинации соединений по настоящему изобретению могут использоваться в отдельности или в виде композиций / препаративных форм и могут смешиваться с дополнительными известными активными ингредиентами, например, бактерицидами, акарицидами, нематоцидами или инсектицидами с целью таким образом расширить, например, спектр активности или предотвратить развитие стойкости.

Применимые вещества для использования в смеси включают, например, инсектициды, акарициды, нематоциды, а также бактерициды (также см. Справочник пестицидов, 14-е издание).

Также возможны смеси с иными известными активными ингредиентами, такими как гербициды, или с удобрениями или регуляторами роста, антидотами и/или сигнальными химическими веществами.

В качестве примеров агентов биологической борьбы, которые можно использовать в сочетании с комбинациями соединений по изобретению, можно привести следующие:

(А) Антибактериальные средства, выбранные из следующей группы

(А1) бактерии, например, (А1.1) *Bacillus subtilis*, в частности, штамм QST713/AQ713 (поставляемый как SERENADE OPTI или SERENADE ASO компании Bayer CropScience LP, США, с № доступа NRRL B21661 и описанный в патенте США № 6,060,051); (А1.2) *Bacillus amyloliquefaciens*, в частности, штамм D747 (поставляемый как Double Nickel™ компании Certis, США, с номером доступа FERM BP-8234 и раскрытый в патенте США № 7,094,592); (А1.3) *Bacillus pumilus*, в частности, штамм BU F-33 (с № доступа NRRL 50185); (А1.4) *Bacillus subtilis* var. *amyloliquefaciens* штамм FZB24 (поставляемый как Taegro® компании Novozymes, США); (А1.5) штамм *Paenibacillus* sp. с № доступа NRRL B-50972 или № доступа NRRL B-67129 и описанный в Международной патентной публикации №WO 2016/154297; и

(А2) грибы, например, (А2.1) *Aureobasidium pullulans*, в частности, бластоспоры штамма DSM14940; (А2.2) *Aureobasidium pullulans* бластоспоры штамма DSM 14941; (А2.3) *Aureobasidium pullulans*, в частности, смеси бластоспор штаммов DSM14940 и DSM14941;

(В) Биологические фунгициды, выбранные из следующей группы:

(В1) бактерии, например, (В 1.1) *Bacillus subtilis*, в частности, штамм QST713/AQ713 (поставляемый как SERENADE OPTI или SERENADE ASO компании Bayer CropScience LP, США, с № доступа NRRL B21661 и описанный в патенте США № 6,060,051); (В1.2) *Bacillus pumilus*, в частности, штамм QST2808 (поставляемый как SONATA® компании Bayer CropScience LP, США, с № доступа NRRL B-30087 и

описанный в патенте США № 6,245,551); (B1.3) *Bacillus pumilus*, в частности, штамм GB34 (поставляемый как Yield Shield® компании Bayer AG, DE); (B1.4) *Bacillus pumilus*, в частности, штамм BU F-33 (с № доступа NRRL 50185); (B1.5) *Bacillus amyloliquefaciens*, в частности, штамм D747 (поставляемый как Double Nickel™ компании Certis, США, с номером доступа FERM BP-8234 и раскрытый в патенте США № 7,094,592); (B1.6) *Bacillus subtilis* Y1336 (поставляемый как BIOBAC® WP компании Bion-Tech, Тайвань, зарегистрированный как биологический фунгицид на Тайване под регистрационными номерами 4764, 5454, 5096 и 5277); (B1.7) штамм *Bacillus amyloliquefaciens* MBI 600 (поставляемый как SUBTILEX компании BASF SE); (B1.8) *Bacillus subtilis* штамм GB03 (поставляемый как Kodiak® компании Bayer AG, DE); (B1.9) штамм *Bacillus subtilis* var. *amyloliquefaciens* FZB24 (поставляемый компанией Novozymes Biologicals Inc., Salem, Virginia или Syngenta Crop Protection, LLC, Greensboro, Северная Каролина как фунгицид TAEGRO® или TAEGRO® ECO (Регистрационный № EPA 70127-5); (B1.10) *Bacillus mucoides*, изолят J (поставляемый как BmJ TGAI или WG компании Certis USA); (B1.11) *Bacillus licheniformis*, в частности, штамм SB3086 (поставляемый как EcoGuard™ Biofungicide and Green Releaf компании Novozymes); (B 1.12) штамм *Paenibacillus* sp. с № доступа NRRL B-50972 или № доступа NRRL B-67129 и описанный в Международной патентной публикации № WO 2016/154297.

В некоторых вариантах осуществления, средство биологической борьбы представляет собой штамм *Bacillus subtilis* или *Bacillus amyloliquefaciens*, который производит соединение типа фенгицина или пипастатина, соединение типа итурина, и/или соединение типа сурфактина. Для получения дополнительной информации смотрите следующую обзорную статью: Ongena, M., et al., "Bacillus Lipopeptides: Versatile Weapons for Plant Disease Biocontrol," Trends in Microbiology, том 16, № 3, март 2008, стр. 115-125. Штаммы *Bacillus*, способные продуцировать липопептиды, включают *Bacillus subtilis* QST713 (поставляемый как SERENADE ОПТИ или SERENADE ASO компании Bayer CropScience LP, США, с № доступа NRRL B21661 и описанный в патенте США № 6,060,051), *Bacillus amyloliquefaciens* штамм D747 (поставляемый как Double Nickel™ компании Certis, США, с номером доступа FERM BP-8234 и раскрытый в патенте США № 7,094,592); *Bacillus subtilis* MBI600 (поставляемый как SUBTILEX® компании Becker Underwood, Управление охраны окружающей среды США Per. № 71840-8); *Bacillus subtilis* Y1336 (поставляемый как BIOBAC® WP компании Bion-Tech, Тайвань, зарегистрированный как биологический фунгицид на Тайване под регистрационными номерами 4764, 5454, 5096 и 5277); *Bacillus amyloliquefaciens*, в частности, штамм FZB42 (поставляемый как RHIZOVITAL® компании ABitEP, DE); и *Bacillus subtilis* var. *amyloliquefaciens* FZB24 (поставляемый компанией Novozymes Biologicals Inc., Salem, Virginia или Syngenta Crop Protection, LLC, Greensboro, Северная Каролина, как фунгицид TAEGRO® или TAEGRO® ECO (Регистрационный № EPA 70127-5); и

(B2) грибы, например: (B2.1) *Coniothyrium minitans*, в частности, штамм CON/M/91-8 (№ доступа DSM-9660; например, Contans® фирмы Bayer); (B2.2) *Metschnikowia fructicola*, в частности, штамм NRRL Y-30752 (например, Shemer®); (B2.3) *Microsphaeropsis ochracea* (например, Microx® фирмы Prophyta); (B2.5) *Trichoderma* spp., включая *Trichoderma atroviride*, штамм SC1, описанный в Международной Заявке № PCT/IT2008/000196); (B2.6) *Trichoderma harzianum* rifai штамм KRL-AG2 (также известный как штамм T-22, /ATCC 208479, например, PLANTSHIELD T-22G, Rootshield®, и TurfShield фирмы BioWorks, США); (B2.14) *Gliocladium roseum*, штамм 321U фирмы W.F. Stoneman Company LLC; (B2.35) *Talaromyces flavus*, штамм V117b; (B2.36) *Trichoderma asperellum*, штамм ICC 012 фирмы Isagro; (B2.37) *Trichoderma asperellum*, штамм SKT-1 (например, ECO-HOPE® фирмы Kumiai Chemical Industry); (B2.38) *Trichoderma atroviride*, штамм CNCM I-1237 (например, Esquive® WP фирмы Agrauxine, FR); (B2.39) *Trichoderma atroviride*, штамм № V08/002387; (B2.40) *Trichoderma atroviride*, штамм NMI № V08/002388; (B2.41) *Trichoderma atroviride*, штамм NMI № V08/002389; (B2.42) *Trichoderma atroviride*, штамм NMI № V08/002390; (B2.43) *Trichoderma atroviride*, штамм LC52 (например, Tenet компании Agrimm Technologies Limited); (B2.44) *Trichoderma atroviride*, штамм ATCC 20476 (IMI 206040); (B2.45) *Trichoderma atroviride*, штамм T11 (IMI352941/ CECT20498); (B2.46) *Trichoderma harmatum*; (B2.47) *Trichoderma harzianum*; (B2.48) *Trichoderma harzianum* rifai T39 (например, Trichodex® фирмы Makhteshim, США); (B2.49) *Trichoderma harzianum*, в частности, штамм KD (например, Trichoplus фирмы Biological Control Products, SA (приобретенный компанией Becker Underwood)); (B2.50) *Trichoderma harzianum*, штамм ITEM 908 (например, Triatum-P фирмы Koppert); (B2.51) *Trichoderma harzianum*, штамм TH35 (например, Root-Pro компании Mycontrol); (B2.52) *Trichoderma virens* (также известный как *Gliocladium virens*), в частности, штамм GL-21 (например, SoilGard 12G компании Certis, США); (B2.53) *Trichoderma viride*, штамм TV1 (например, Triatum-P компании Koppert); (B2.54) *Ampelomyces quisqualis*, в частности, штамм AQ 10 (например, AQ 10® компании IntrachemBio Italia); (B2.56) *Aureobasidium pullulans*, в частности, бластоспоры штамма DSM14940; (B2.57) *Aureobasidium pullulans*, в частности, бластоспоры штамма DSM 14941; (B2.58) *Aureobasidium pullulans*, в частности, смеси бластоспор штаммов DSM14940 и DSM 14941 (например, Botector® компании bio-ferm, CH); (B2.64) *Cladosporium cladosporioides*, штамм H39 (компания Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek); (B2.69) *Gliocladium catenulatum* (Synonym: *Clonostachys rosea* catenulate) штамм J1446 (например, Prestop® компании AgBio Inc., а также, например, Primastop®

компании Kemira Agro Oy); (B2.70) *Lecanicillium lecanii* (ранее известный как *Verticillium lecanii*) conidia штамма KV01 (например, Vertalec® компании Koppert/Arysta); (B2.71) *Penicillium vermiculatum*; (B2.72) *Pichia anomala*, штамм WRL-076 (NRRL Y-30842); (B2.75) *Trichoderma atroviride*, штамм SKT-1 (FERM P-16510); (B2.76) *Trichoderma atroviride*, штамм SKT-2 (FERM P-16511); (B2.77) *Trichoderma atroviride*, штамм SKT-3 (FERM P-17021); (B2.78) *Trichoderma gamsii* (ранее *T. viride*), штамм ICC080 (IMI CC 392151 CABI, например, BioDerma компании AGROBIOSOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.); (B2.79) *Trichoderma harzianum*, штамм DB 103 (например, T-Gro 7456 компании Dagutat Biolab); (B2.80) *Trichoderma polysporum*, штамм IMI 206039 (например, Binab TF WP компании BINAB Bio-Innovation AB, Sweden); (B2.81) *Trichoderma stromaticum* (например, Tricovab компании Ceplac, Brazil); (B2.83) *Ulocladium oudemansii*, в частности, штамм HRU3 (например, Botry-Zen® компании Botry-Zen Ltd, NZ); (B2.84) *Verticillium albo-atrum* (ранее *V. dahliae*), штамм WCS850 (CBS 276.92; например, Dutch Trig компании Tree Care Innovations); (B2.86) *Verticillium chlamydosporium*; (B2.87) смеси *Trichoderma asperellum* штамма ICC 012 и *Trichoderma gamsii* штамма ICC 080 (продукт, известный как например, BIO-TAM™ фирмы Bayer CropScience LP, США).

Дополнительными примерами средств биологической борьбы, которые могут быть объединены с комбинацией соединений по изобретению, являются:

бактерии, выбранные из группы, состоящей из *Bacillus cereus*, в частности, *B. cereus* штамм CNCM I-1562 и *Bacillus firmus*, штамм I-1582 (Номер доступа CNCM I-1582), *Bacillus subtilis* штамм OST 30002 (№ доступа NRRL B-50421), *Bacillus thuringiensis*, в частности, *B. thuringiensis* подвиды *israelensis* (серотип H-14), штамм AM65-52 (№ доступа ATCC 1276), *B. thuringiensis* subsp. *aizawai*, в частности, штамм ABTS-1857 (SD-1372), *B. thuringiensis* subsp. *kurstaki* штамм HD-1, *B. thuringiensis* subsp. *tenebrionis* штамм NB 176 (SD-5428), *Pasteuria penetrans*, *Pasteuria* spp. (*Rotylenchulus reniformis* nematode)-PR3 (Номер доступа ATCC SD-5834), *Streptomyces microflavus* штамм AQ6121 (= QRD 31.013, NRRL B-50550), и *Streptomyces galbus* штамм AQ 6047 (Номер доступа NRRL 30232);

грибы и дрожжи, выбранные из группы, состоящей из *Beauveria bassiana*, в частности, штамм ATCC 74040, *Lecanicillium* spp., в частности, штамм HRO LEC 12, *Metarhizium anisopliae*, в частности, штамм F52 (DSM3884 bkb ATCC 90448), *Paecilomyces fumosoroseus* (сейчас: *Isaria fumosorosea*), в частности, штамм IFPC 200613, или штамм Аропка 97 (№ доступа ATCC 20874), и *Paecilomyces lilacinus*, в частности, *P. lilacinus* штамм 251 (AGAL 89/030550);

вирусы, выбранные из группы, состоящей из *Adoxophyes orana* (сетчатая листокрутка) вирус гранулёза (ВГ), *Cydia pomonella* (плодожорка яблоневая) вирус гранулёза (ВГ), *Helicoverpa armigera* (совка хлопковая) вирус ядерного полиэдроза (ВЯП), *Spodoptera exigua* (совка малая) mNPV, *Spodoptera frugiperda* (совка травяная) mNPV, и *Spodoptera littoralis* (гусеница, питающаяся листьями африканского хлопка) NPV.

бактерии и грибы, которые могут быть добавлены в качестве инокулянта к растениям, частям растений или органам растений и которые в силу своих особых свойств способствуют росту растений и их здоровью. Примерами являются: *Agrobacterium* spp., *Azorhizobium caulinodans*, *Azospirillum* spp., *Azotobacter* spp., *Bradyrhizobium* spp., *Burkholderia* spp., в частности, *Burkholderia cepacia* (ранее известный как *Pseudomonas cepacia*), *Gigaspora* spp., или *Gigaspora monosporum*, *Glomus* spp., *Laccaria* spp., *Lactobacillus buchleri*, *Paraglomus* spp., *Pisolithus tinctorius*, *Pseudomonas* spp., *Rhizobium* spp., в частности, *Rhizobium trifolii*, *Rhizopogon* spp., *Scleroderma* spp., *Suillus* spp. и *Streptomyces* spp.

экстракты и продукты из растений, образованные микроорганизмами, включая белки и вторичные метаболиты, которые могут использоваться в качестве агентов биологической борьбы, такие как *Allium sativum*, *Artemisia absinthium*, *azadirachtin*, Biokeeper WP, *Cassia nigricans*, *Celastrus angulatus*, *Chenopodium anthelminticum*, хитин, Armour-Zen, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum arvense*, Fortune Aza, Fungastop, Heads Up (экстракт сапонина *Chenopodium quinoa*), Pyrethrum/Pyrethrins, Quassia amara, *Quercus*, Quillaja, Regalia, "Requiem™ инсектицид", ротенон, гуания/рианодин, *Symphytum officinale*, *Tanacetum vulgare*, тимол, Triact 70, TriCon, *Tropaeolum majus*, *Urtica dioica*, Veratrin, *Viscum album*, экстракт Brassicaceae, в частности, порошок масличного рапса или горчичный порошок.

В качестве примеров инсектицидов, акарицидов и нематоцидов, которые могут смешиваться с комбинацией соединений по изобретению, можно привести следующие:

(1) Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE), такие как, например, карбаматы, например, аланикарб, алдикарб, бендиокарб, бенфуракарб, бутоксарбоксим, бутоксикарбоксим, карбарил, карбофуран, карбосульфат, этиофенкарб, фенобукарб, форметанат, фуриатиокарб, изопрокарб, метиокарб, метомил, метолкарб, оксамил, пиримикарб, пропоксур, тиодикарб, тиофанокс, триазамат, триметакарб, ХМС, ксилкарб; или органофосфаты, например, ацефат, азаметинос, азинфос-этил, азинфос-метил, кадусафос, хлоретоксифос, хлорфенвинфос, хлормефос, хлорпирифос-метил, кумафос, цианофенфос, деметон-S-метил, диазинон, дихлорфос/DDVP, дикротофос, диметоат, диметилвинфос, дисульфотон, EPN, этион, этопрофос, фамфур, фенаминос, фенитроцион, фентион, фосфиазат, гептенофос, имициафос, изофенфос, изопропил O-(метоксиаминотиофосфорил) салицилат, изоксатион, малатион, мекарбам, метамидофос, метидатион, мевинфос, монокротофос, налед, ометоат, оксидеметон-метил, паратион-метил, фентоат,

форат, фозалон, фосмет, фосфамидон, фоксим, пиримифос-метил, профенофос, пропафос, пропетамфос, протиофос, пираклофос, пиридафентион, хиналфос, сульфотеп, тебупиримфос, темефос, тербуфос, тетракторвинфос, тиометон, триазофос, триклорфон, ванидотион.

(2) Блокаторы ГАМК-управляемых хлоридных каналов, такие как, например, циклодиен-органохлороорганические соединения, например, хлордан и эндосульфат или фенилпиразолы (фипролы), например, этипрол и фипронил.

(3) Модуляторы натриевых каналов, такие, например, как пиретроиды, например, акринатрин, аллетрин, d-цис-транс-аллетрин, d-транс-аллетрин, бифентрин, биоаллетрин, биоаллетрин-S-циклопентенил изомер, биорезметрин, циклопротрин, цифлутрин, бета-цифлутрин, цигалотрин, лямбда-цигалотрин, гамма-цигалотрин, циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин, тета-циперметрин, зета-циперметрин, цифенотрин [(1R)-транс-изомер], дельтаметрин, эмпентрин [(E)-Z)-(1R)-изомер], эс-фенвалерат, этофенпрокс, фенпропатрин, фенвалерат, флуцитринат, флуметрин, тау-флувалинат, гал-фенпрокс, имипротрин, кадетрин, момфторин, перметрин, фенотрин [(1R)-транс-изомер], праллетрин, пиретрины (пиретрум), резметрин, силафлуофен, тефлутрин, тетраметрин, тетраметрин [(1R)-изомер], тралометрин и трансфлутрин или ДЦТ или метоксифлор.

(4) Конкурентные модуляторы никотинового холинорецептора (nAChR), такие как, например, неоникотиноиды, например, ацетамиприд, клотианидин, динотефуран, имидаклоприд, нитенпирам, тиаклоприд и тиаметоксам или никотин, или сульфоксафлор, или флупирадифурон.

(5) Аллостерические модуляторы никотинового холинорецептора (nAChR), такие как, например, спинозины, например, спинеторам и спиносад.

(6) Аллостерические модуляторы глутамат-зависимых хлоридных каналов (GluCl), такие как, например, авермектины/милбемицины, например, абамектин, эмаектинбензоат, лепимектин и милбементин.

(7) Миметики ювенильного гормона, такие как, например, аналоги ювенильного гормона, например, гидропрен, кинопрен и метопрен или феноксикарб, или пирипроксифен.

(8) Различные неспецифические (мультисайтовые) ингибиторы, такие как, например, алкилгалогениды, например, метилбромид и прочие алкилгалогениды; или хлорпикрин или сульфурил фторид или боракс или антгмонилтартрат калия или генераторы метилизоцианата, например, диазомер и метам.

(9) Модуляторы хордотональных органов, такие как, например, пиметрозин или флониамид.

(10) Ингибиторы роста клещей, такие как, например, клофентезин, гекситиазокс и дифловидазин или этоксазол.

(11) Микробные разрушители кишечной мембраны насекомых, такие как, например, *Bacillus thuringiensis* подвиды *israelensis*, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus thuringiensis* подвиды *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* подвиды *kurstaki*, *Bacillus thuringiensis* подвиды *tenebrionis*, и растительные белки *Bacillus thuringiensis*: Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry1A.105, Cry2Ab, Vip3A, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb, Cry34Ab1/35Ab1.

(12) Ингибиторы митохондриальной АТФ-синтазы, такие как разрушители АТФ, такие как, например, диафентиурон или оловоорганические соединения, например, оксид азоциклотина, цигексатина и фенбутатина или пропаргит, или тетрадифон.

(13) Разобщающие агенты окислительного фосфорилирования посредством нарушения протонного градиента, такие как, например, хлорфенапир, динитроортокрезол и сульфурамид.

(14) Блокаторы каналов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, такие как, например, бенсултап, гидрохлорид картапа, тиоцилам и тиосултап-натрий.

(15) Ингибиторы биосинтеза хитина, тип 0, такие как, например, бистрифлурон, хлорфлуазурон, дифлубензурон, флуциклоксурон, флуфеноксурон, гексафлумурон, лufenурон, новалурон, новифлумурон, тефлубензурон и трифлумурон.

(16) Ингибиторы биосинтеза хитина типа 1, например, бупрофезин.

(17) Нарушитель линьки (в частности, для *Diptera*, т.е. двукрылых), такие как, например, циромазин.

(18) Агонисты рецепторов экдизона, такие как, например, хромафенозид, галофенозид, метоксифенозид и тебуфенозид.

(19) Агонисты рецепторов октопамина, такие как, например, амитраз.

(20) Ингибиторы транспорта электронов митохондриального комплекса III, такие как, например, гидраметилнон или ацехиноцил, или флуаكريпирим.

(21) Ингибиторы переноса электронов митохондриального комплекса I из группы METI акарицидов, например, феназахин, фенпироксимат, пиримидифен, пиридабен, тебуфенпирад и толфенпирад или ротенон (Derris).

(22) Регулируемые напряжением блокаторы натриевых каналов, такие как, например, индоксакарб или метафлумизон.

(23) Ингибиторы ацетил-КоА-карбоксилазы, такие как, например, производные тетровой и тетрамовой кислот, например, спиридиклофен, спирумезифен и спиротетрамат.

(24) Ингибиторы переноса электронов митохондриального комплекса IV, такие как, например,

фосфины, например, фосфид алюминия, фосфид кальция, фосфин и фосфид цинка или цианиды, например, цианид кальция, цианид калия и цианид натрия.

(25) Ингибиторы переноса электронов митохондриального комплекса II, такие как, например, производные бета-кетонитрила, например, циенопирафен и цифлуметофен и карбоксанилиды, такие как, например, пифлубумид.

(28) Модуляторы риаинодиновых рецепторов, такие как, например, диамиды, например, хлорантранилипрол, циантранилипрол и флубендиамид, дополнительные активные соединения, такие как, например, афидопиропен, афоксоланер, азадирахтин, бенклотиаз, бензоксимат, бифеназат, брофланилид, бромпропилат, хинометионат, хлорпраллетрин, криолит, цикланилипрол, циклоксаприд, цигалодиамида, дикломезотиаз, дикофол, эпсилон-метофлутрин, эпсилон-момфлутрин, флометоквин, флузаиндолизин, флуенсульфон, флуфенерим, флуфеноксистробин, флуфипрол, флугексафон, флуопирам, флурананер, флуксаметамида, фуфенозид, гуадипир, гептафлутрин, имидаклотиз, ипродион, каппа-бифентрин, каппа-тефлутрин, лотиланер, меперфлутрин, пайхонгдинг, пиридалил, пирифлухиназон, пириминостробин, спиробудиклофен, тетраметилфлутрин, тетранилипрол, тетрахлорантранилипрол, тиголанер, тиоксазафен, тиофлуоксимат, трифлумезопирим и йодметан; кроме того, препараты на основе *Vacillus firmus* (I-1582, BioNeem, Votivo), а также следующие соединения: 1-{2-фтор-4-метил-5-[(2,2,2-трифторэтил)сульфинил]фенил}-3-(трифторметил)-1H-1,2,4-триазол-5-амин (известный из WO2006/043635) (CAS 885026-50-6), {1'-[(2E)-3-(4-хлорфенил)проп-2-ен-1-ил]-5-фторспиро[индол-3,4'-пиперидин]-1(2H)-ил]-2-хлорпиридин-4-ил}метанон (известный из WO2003/106457) (CAS 637360-23-7), 2-хлор-N-[2-{1-[(2E)-3-(4-хлорфенил)проп-2-ен-1-ил]пиперидин-4-ил}-4-(трифторметил)фенил]изоникотинамид (известный из WO2006/003494) (CAS 872999-66-1), 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-4-гидрокси-8-метокси-1,8-диазаспиро[4.5]дек-3-ен-2-он (известный из WO 2010052161) (CAS 1225292-17-0), 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1,8-диазаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил этил карбонат (известный из EP2647626) (CAS 1440516-42-6), 4-(бут-2-ин-1-илокси)-6-(3,5-диметилпиперидин-1-ил)-5-фторпиримидин (известный из WO2004/099160) (CAS 792914-58-0), PF1364 (известный из JP2010/018586) (CAS 1204776-60-2), N-[(2E)-1-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил]пиридин-2(1H)-илиден]-2,2,2-трифторацетамид (известный из WO2012/029672) (CAS 1363400-41-2), (3E)-3-[1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-2-пиридилиден]-1,1,1-трифтор-пропан-2-он (известный из WO2013/144213) (CAS 1461743-15-6), N-[3-(бензилкабамоил)-4-хлорфенил]-1-метил-3-(пентафторэтил)-4-(трифторметил)-1H-пиразол-5-карбоксамид (известный из WO2010/051926) (CAS 1226889-14-0), 5-бром-4-хлор-N-[4-хлор-2-метил-6-(метилкабамоил)фенил]-2-(3-хлор-2-пиридил)пиразол-3-карбоксамид (известный из CN103232431) (CAS 1449220-44-3), 4-[5-(3,5-дихлорфенил)-4,5-дигидро-5-(трифторметил)-3-изоксазолил]-2-метил-N-(цис-1-оксидо-3-тиетанил)-бензамид, 4-[5-(3,5-дихлорфенил)-4,5-дигидро-5-(трифторметил)-3-изоксазолил]-2-метил-N-(транс-1-оксидо-3-тиетанил)-бензамид и 4-[(5S)-5-(3,5-дихлорфенил)-4,5-дигидро-5-(трифторметил)-3-изоксазолил]-2-метил-N-(цис-1-оксидо-3-тиетанил)бензамид (известный из WO 2013/050317 A1)(CAS 1332628-83-7), N-[3-хлор-1-(3-пиридинил)-1H-пиразол-4-ил]-N-этил-3-[(3,3,3-трифторпропил)сульфинил]-пропанамид, (+)-N-[3-хлор-1-(3-пиридинил)-1H-пиразол-4-ил]-N-этил-3-[(3,3,3-трифторпропил)сульфинил]-пропанамид и (-)-N-[3-хлор-1-(3-пиридинил)-1H-пиразол-4-ил]-N-этил-3-[(3,3,3-трифторпропил)сульфинил]-пропанамид (известный из WO 2013/162715 A2, WO 2013/162716 A2, US 2014/0213448 A1) (CAS 1477923-37-7), 5-[[2E)-3-хлор-2-пропен-1-ил]амино]-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)фенил]-4-[(трифторметил)сульфинил]-1H-пиразол-3-карбонитрил (известный из CN 101337937 A) (CAS 1105672-77-2), 3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламино)тиохометил]фенил]-1-(3-хлор-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-карбоксамид, (Liudaibenjiaxuanan, известный из CN 103109816 A) (CAS 1232543-85-9); N-[4-хлор-2-[(1,1-диметилэтил)амино]карбонил]-6-метилфенил]-1-(3-хлор-2-пиридинил)-3-(фторметокси)-1H-Пиразол-5-карбоксамид (известный из WO 2012/034403 A1) (CAS 1268277-22-0), N-[2-(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-4-хлор-6-метилфенил]-3-бром-1-(3-хлор-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-карбоксамид (известный из WO 2011/085575 A1) (CAS 1233882-22-8), 4-[3-[2,6-дихлор-4-[(3,3-дихлор-2-пропен-1-ил)окси]феноксипропокси]-2-метокси-6-(трифторметил)-пиримидин (известный из CN 101337940 A) (CAS 1108184-52-6); (2E)- и 2(Z)-2-[2-(4-цианофенил)-1-[3-(трифторметил)фенил]этилиден]-N-[4-(дифторметокси)фенил]-гидразинкарбоксамид (известный из CN 101715774 A) (CAS 1232543-85-9); сложный эфир карбоновой кислоты 3-(2,2-дихлорэтилен)-2,2-диметил-4-(1H-бензимидазол-2-ил)фенил-циклопропана (известный из CN 103524422 A) (CAS 1542271-46-4); метиловый эфир (4aS)-7-хлор-2,5-дигидро-2-[[метоксикарбонил]4-[(трифторметил)тио]фенил]аминокарбонил]-индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4a(3H) -карбоновой кислоты (известный из CN 102391261 A) (CAS 1370358-69-2); 6-деокси-3-O-этил-2,4-ди-O-метил-, 1-[N-[4-[1-[4-(1,1,2,2,2-пентафторэтоксифенил)-1H-1,2, 4-триазол-3-ил]фенил]карбамат]- $\alpha$ -L-маннопираноза (известный из US 2014/0275503 A1) (CAS 1181213-14-8); 8-(2-циклопропилметокси-4-трифторметил-феноксид)-3-(6-трифторметил-пиридазин-3-ил)-3-аза-бицикло[3.2.1]октан (CAS 1253850-56-4), (8-анти)-8-(2-циклопропилметокси-4-трифторметил-феноксид)-3-(6-трифторметил-пиридазин-3-ил)-3-аза-бицикло[3.2.1]октан (CAS 933798-27-7), (8-syn)-8-(2-циклопропилметокси-4-трифторметил-феноксид)-3-(6-трифторметил-пиридазин-3-ил)-3-аза-бицикло[3.2.1]октан (известный из WO 2007040280 A1, WO 2007040282 A1) (CAS 934001-66-8), N-[3-хлор-1-(3-пиридинил)-1H-пиразол-4-ил]-N-этил-3-[(3,3,3-


трифторпропил)тио]-пропанамид (известный из WO 2015/058021 A1, WO 2015/058028 A1) (CAS 1477919-27-9) и N-[4-(аминотиохометил)-2-метил-6-[(метиламино)карбонил]фенил]-3-бром-1-(3-хлор-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-карбоксамид (известный из CN 103265527 A) (CAS 1452877-50-7), 5-(1,3-диоксан-2-ил)-4-[[4-(трифторметил)фенил]метокси]-пиримидин (известный из WO 2013/115391 A1) (CAS 1449021-97-9), 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-4-гидрокси-8-метокси-1-метил-1,8-дiazаспиро[4.5]дек-3-ен-2-он (известный из WO 2010/066780 A1, WO 2011/151146 A1) (CAS 1229023-34-0), 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-8-метокси-1-метил-1,8-дiazаспиро[4.5]декан-2,4-дион (известный из WO 2014/187846 A1) (CAS 1638765-58-8), 3-(4-хлор-2,6-диметилфенил)-8-метокси-1-метил-2-оксо-1, 8-дiazаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил-сложный эфир углекислоты (известный из WO 2010/066780 A1, WO 2011/151146 A1) (CAS 1229023-00-0), N-[1-[(6-хлор-3-пиридинил)метил]-2(1H)-пиридинилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид (известный из DE 3639877 A1, WO 2012029672 A1) (CAS 1363400-41-2), [N(E)]-N-[1-[(6-хлор-3-пиридинил)метил]-2(1H)-пиридинилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, (известный из WO 2016005276 A1) (CAS 1689566-03-7), [N(Z)]-N-[1-[(6-хлор-3-пиридинил)метил]-2(1H)-пиридинилиден]-2,2,2-трифтор-ацетамид, (CAS 1702305-40-5), 3-эндо-3-[2-пропокси-4-(трифторметил)фенокси]-9-[[5-(трифторметил)-2-пиридинил]окси]-9-азабицикло[3.3.1]нонан (известный из WO 2011/105506 A1, WO 2016/133011 A1) (CAS 1332838-17-1).

Примерами защитных средств, которые могут быть смешаны с комбинацией соединений по изобретению, являются, например, беноксакор, клоквинтоцет (мексил), циометринил, ципросульфамид, дихлормид, фенхлоразол (этил), фенклорим, флуразол, флуксофеним, фурилазол, изоксадифен (этил), мифенпир (диэтил), нафталиновый ангидрид, оксабетринил, 2-метокси-N-(4-[(метилкабамоил)амино]фенил)сульфонил)бензамид (CAS 129531-12-0), 4-(дихлорацетил)-1-окса-4-азаспиро[4.5]декан (CAS 71526-07-3), 2,2,5-триметил-3-(дихлорацетил)-1,3-оксазолидин (CAS 52836-31-4).

Примерами гербицидов, которые могут быть смешаны с комбинацией соединений по изобретению, являются:

Ацетохлор, ацифлуорфен, ацифлуорфен-натрий, аклонифен, алахлор, аллидохлор, аллоксидим, аллоксидим-натрий, аметрин, амикарбазон, амидохлор, амидосульфурон, 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-фторпиридин-2-карбоновая кислота, аминоклопирахлор, аминоклопирахлор-калий, аминоклопирахлор-метил, аминопиралид, амитрол, сульфамат аммония, анилофос, асулам, атразин, азафенидин, азимсульфурон, бифлутамид, беназолин, беназолин-этил, бенфлуралин, бенфуресат, бенсульфурон, бенсульфурон-метил, бенсулид, бентазон, бензобициклон, бензофенап, бициклопирон, бифенокс, биланафос, биланафос-натрий, биспирибак, биспирибак-натрий, бромацил, бромбутид, бромфеноксим, бромксинил, бромксинил-бутират, -калий, -гепатаноат, и -октаноат, бузоксинон, бутахлор, бутафенацил, бутамифос, бутенахлор, бутралин, бутроксидим, бутилат, кафенстрол, карбетамид, карфентразон, карфентразон-этил, хлорамбен, хлорбромурон, хлорфенак, хлорфенак-натрий, хлорфенпроп, хлорфуренол, хлорфуренол-метил, хлоридазон, хлоримурон, хлоримурон-этил, хлорфталим, хлортолурун, хлортал-диметил, хлорсульфурон, цинидон, цинидон-этил, цинметилин, циносульфурон, клацифос, клетодим, клодинафоп, клодинафоп-пропаргил, кломазон, кломепроп, клопиралид, клорансулам, клорансулам-метил, кумилурон, цианамид, цианазин, циклоат, циклопириморат, циклосульфамурон, циклоксидим, цигалофоп, цигалофоп-бутил, ципразин, 2,4-D, 2,4-D-бутотил, -бутил, -диметиламмоний, -диоламин, -этил, -2-этилгексил, -изобутил, -изооктил, -изопропиламмоний, -калий, -триизопропаноламмоний, и -троламин, 2,4-DB, 2,4-DB-бутил, -диметиламмоний, -изооктил, -калий, и -натрий, даймурон (димрон), далапон, дазомет, н-деканол, десмедифам, детосил-пиразолат (ДТР), дикамба, диклобенил, 2-(2,4-дихлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он, 2-(2,5-дихлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он, дихлорпроп, дихлорпроп-Р, диклофоп, диклофоп-метил, диклофоп-Р-метил, диклосулам, дифензокват, дифлюфеникан, дифлюфензопир, дифлюфензопир-натрий, димефурон, димепиперат, диметахлор, диметаметрин, диметенамид, диметенамид-Р, диметрасульфурон, динитрамин, динозоб, дифенамид, дикват, дикват-дибромид, дитиопир, диурон, DNOC, эндотал, ЕРТС, эспрокарб, эталфлуралин, этаметсульфурон, этаметсульфурон-метил, етиозин, этофумезат, этоксифен, этоксифен-этил, этоксисульфурон, этобензанид, F-9600, F-5231, т.е. N-{2-хлор-4-фтор-5-[4-(3-фторпропил)-5-оксо-4,5-дигидро-1H-тетразол-1-ил]фенил}этансульфонамид, F-7967, т.е. 3-[7-хлор-5-фтор-2-(трифторметил)-1H-бензимидазол-4-ил]-1-метил-6-(трифторметил)пиримидин-2,4(1H,3H)-дион, феноксапроп, феноксапроп-Р, феноксапроп-этил, феноксапроп-Р-этил, феноксасульфен, фенхинотрион, фентразамид, флампроп, флампроп-N-изопропил, флампроп-N-метил, флазасульфурон, флорасулам, флуазифоп, флуазифоп-Р, флуазифоп-бутил, флуазифоп-Р-бутил, флукарбазон, флукарбазон-натрий, флуцетосульфурон, флухлоралин, флуфенацет, флуфенпир, флуфенпир-этил, флуметсулам, флумиклорак, флумиклорак-пинтил, флумиоксазин, флуометурон, флуренол, флуренол-бутил, -диметиламмоний и -метил, фторгликофен, фторгликофен-этил, флупропанат, флуписульфурон, флуписульфурон-метил-натрий, флуридон, флуорохлоридон, флуорокиспир, флуорокиспир-метил, флуортамон, флутиацет, флутиацет-метил, фомесафен, фомесафен-натрий, форамсульфурон, фосамин, глюофосинат, глюофосинат-аммоний, глюофосинат-Р-натрий, глюофосинат-Р-аммоний, глюофосинат-Р-натрий, глифосат, глифосат-аммоний, -изопропиламмоний, -диаммоний, -диметиламмоний, -калий, -натрий, и -тримезий, H-9201, т.е. O-(2,4-диметил-6-нитрофенил) O-этил изопропилфосфорамидотиоат, галаукифен, галаукифен-метил, галоса-

фен, галосульфурон, галосульфурон-метил, галоксифоп, галоксифоп-Р, галоксифоп-этоксиэтил, галоксифоп-Р-этоксиэтил, галоксифоп-метил, галоксифоп-Р-метил, гексазион, НW-02, т.е. 1-(диметокси фосфорил) этил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат, имазаметабенз, имазаметабенз-метил, имазамокс, имазамокс-аммоний, имазапик, имазапик-аммоний, имазапир, имазапир-изопропиламмоний, имазакин, имазакин-аммоний, имазетапир, имазетапир-аммоний, имазосульфурон, инданофан, индазифлам, йодосульфурон, йодосульфурон-метил-натрий, иоксинил, иоксинил-октаноат, -калий и -натрий, ипфенкарбазон, изопротурон, изоурон, изоксабен, изоксафлутол, карбутилат, КУН-043, т.е. 3-({5-(дифторметил)-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-ил}метил)сульфони)-5,5-диметил-4,5-дигидро-1,2-оксазол, кетоспирадокс, лактофен, ленацил, линурон, МСРА, МСРА-бутотил, -диметиламмоний, -2-этилгексил, -изопропиламмоний, -калий, и -натрий, МСРВ, МСРВ-метил, -этил и -натрий, мекопроп, мекопроп-натрий, и -бутотил, мекопроп-Р, мекопроп-Р-бутотил, -диметиламмоний, -2-этилгексил, и -калий, мефен-ацет, мефлуидид, мезосульфурон, мезосульфурон-метил, мезотрион, метабензтиазурон, метам, метамифоп, метамитрон, метазахлор, метазосульфурон, метабензтиазурон, метиопирсульфурон, метиозолин, метил изотиоцианат, метобромурон, метолахлор, S-метолахлор, метосулам, метоксурон, метрибузин, метсульфурон, метсульфурон-метил, молинат, монолинурон, моносульфурон, моносульфурон-эфир, МТ-5950, т.е. N-(3-хлор-4-изопропилфенил)-2-метилпентан amide, NGGC-011, напропамид, NC-310, т.е. [5-(бензилокси)-1-метил-1Н-пиразол-4-ил](2,4-дихлорфенил)метанон, небурон, никосульфурон, нанановая кислота (пеларгоновая кислота), норфлуразон, масляная кислота (жирные кислоты), орбенкарб, ортосульфамурон, оризалин, оксадиаргил, оксадиазон, оксасульфурон, оксазикломефон, оксифлуорфен, паракват, паракват дихлорид, пебулат, пендиметалин, пеноксулам, пентахлорфенол, пентоксазон, пентоксамид, нефтяные масла, фенмедифам, пиклорам, пиколинафен, пиноксаден, пиперофос, претилахлор, примисульфурон, примисульфурон-метил, продиамин, профоксидим, прометон, прометрин, пропахлор, пропанил, пропаквизафоп, пропазин, профам, пропизохлор, пропоксикарбазон, пропоксикарбазон-натрий, пропируссульфурон, пропизамид, просульфокарб, просульфурон, пираклонил, пирафлуфен, пирафлуфен-этил, пирасульфотол, пиразолинат (пиразолат), пиразосульфурон, пиразосульфурон-этил, пиразоксифен, пирибамбенз, пирибамбенз-изопропил, пирибамбенз-пропил, пирибензоксим, пирибутикарб, пиридафол, пиридат, пирифталид, пириминобак, пириминобак-метил, пиримисульфам, пиритиобак, пиритиобак-натрий, пироксасульфон, пироксулам, хинклорак, хинмерак, хинокламин, хизалофоп, хизалофоп-этил, хизалофоп-Р, хизалофоп-Р-этил, хизалофоп-Р-тефурил, римсульфурон, сафлуфенацил, сетоксидим, сидурон, симазин, симетрин, SL-261, сулкотрион, сульфентразон, сульфометурон, сульфометурон-метил, сульфосульфурон, SYN-523, SYP-249, т.е. 1-этокси-3-метил-1-оксобут-3-ен-2-ил 5-[2-хлор-4-(трифторметил)фенокси]-2-нитробензоат, SYP-300, т.е. 1-[7-фтор-3-оксо-4-(проп-2-ин-1-ил)-3,4-дигидро-2Н-1,4-бензоксазин-6-ил]-3-пропил-2-тиохоимидазолидин-4,5-дион, 2,3,6-ТВА, ТСА (трихлоруксусная кислота), ТСА-натрий, тебутиурон, тефурилтрион, темботрион, тепралоксидим, тербацил, тербукарб, тербуметон, тербутилазин, тербутрин, тенилхлор, тиазопир, тиенкарбазон, тиенкарбазон-метил, тифенсульфурон, тифенсульфурон-метил, тиобенкарб, тиафенацил, толпиралат, топрамезон, тралкоксидим, триафамон, три-аллат, триасульфурон, триазифлам, трибенурон, трибенурон-метил, триклопир, триэтазин, трифлорисульфурон, трифлорисульфурон-натрий, трифлудимоксазин, трифлуралин, трифлусульфурон, трифлусульфурон-метил, тритосульфурон, мочевины сульфат, вернолат, XDE-848, ZJ-0862, т.е. 3,4-дихлор-N-{2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)окси]бензил}анилин, и следующие соединения:



Примерами регуляторов роста растений являются:

Ацибензолар, ацибензолар-S-метил, 5-аминолевулиновая кислота, анцимидол, 6-бензил аминопурин, брассинолид, катехин, хлормекват-хлорид, клопроп, цикланилид, 3-(циклопроп-1-енил)пропионовая кислота, даминозид, дазомет, n-деканол, дикегулак, дикегулак-натрий, эндотал, эндо-

тал-дикалий, -динатрий и -моно(N,N-диметилалкиламмоний), этефон, флуметралин, флуренол, флуренол-бутил, флурпримидол, форхлорфенурон, гибберелловая кислота, инабенфид, индол-3-уксусная кислота (ИУК), 4-индол-3-илмасляная кислота, изопроттиолан, пробеназол, жасмоновая кислота, гидразид малеиновой кислоты, мепикватхлорид, 1-метилциклопропен, метилжасмонат, 2-(1-нафтил)ацетамид, 1-нафтилюксусная кислота, 2- нафтилоксиуксусная кислота, смесь нитрофенолатов, паклобутразол, N-(2-фенилэтил)-бета-аланин, N-фенилфталаминовая кислота, прогексадион, прогексадион-кальций, прогидрожасмон, салициловая кислота, стриголактон, текназен, тидиазурон, триаконтанол, тринексапак, тринексапак-этил, цитодеф, униканазол, униканазол-Р.

#### Способы и области применения

Изобретение также касается способа борьбы с нежелательными микроорганизмами, в частности, фитопатогенные грибы, отличающиеся тем, что комбинация соединений по изобретению или композиция, содержащая такую комбинацию, наносится на микроорганизмы и/или их район обитания.

Изобретение дополнительно касается семян, которые подвергаются обработке комбинацией соединений по настоящему изобретению или композицией, содержащей такую комбинацию.

Наконец, настоящим изобретением предоставляется способ защиты семян от нежелательных микроорганизмов за счет обработки семян комбинацией соединений по настоящему изобретению или композицией, содержащей такую комбинацию.

Комбинации соединений по настоящему изобретению или композиции, содержащие такую комбинацию, обладают сильным бактерицидным действием и могут использоваться для борьбы с нежелательными микроорганизмами, такими как грибы и бактерии, в области защиты растений и защиты материалов.

Комбинации соединений по настоящему изобретению или композиции, содержащие такую комбинацию, обладают высокими фунгицидными свойствами и могут использоваться для защиты посевов, например, для борьбы с плазмодиофоромицетами, оомицетами, хитридиомицетами, зигомицетами, аскомицетами, базидиомицетами и дейтеромицетами.

Бактерициды могут использоваться для защиты посевов для борьбы с микроорганизмами семейств *Pseudomonadaceae*, *Rhizobiaceae*, *Enterobacteriaceae*, *Corynebacteriaceae* и *Streptomycetaceae*.

Комбинации соединений по настоящему изобретению или композиции, содержащие такие комбинации, могут использоваться для лечения или профилактической защиты от фитопатогенных грибов. Таким образом, изобретение также относится к способам лечения и защиты для борьбы с фитопатогенными грибами путем применения комбинаций или композиций по изобретению, которыми обрабатываются семена, растение или части растения, плоды или почва, в которой произрастают растения.

#### Растения

Согласно данному изобретению, все растения и их части могут подвергаться обработке. В данном случае под растениями здесь понимаются все растения и популяции растений, такие как желательные и нежелательные дикорастущие растения или сельскохозяйственные культуры (включая свободнорастущие сельскохозяйственные культуры). К сельскохозяйственным культурам, соответственно, могут относиться растения, которые можно получить путем обычного разведения растений и способов оптимизации, или способами биотехнологии и геной инженерии, или путем сочетания данных методов, включая трансгенные растения и их сорта которые могут быть защищены и не могут быть незащищены правами растениеводов-селекционеров. Под частями растения понимаются части и органы растения, которые располагаются над и под землей, такие как побеги, листья, цветки и корни, а также листья, иглы, цветочные, стебли, цветки, плодовые тела, плоды, семена, корни, клубни и корневища. К частям растений также относится собранный материал и материал для вегетативного и генеративного размножения, например, черенки, клубни, корневища, побеги и семена.

Растения, которые могут быть обработаны в соответствии с настоящим изобретением включают следующие: хлопок, лен, виноград, фрукты, овощи, такие как *Rosaceae* sp. (например, семечковые плоды, такие как яблоки и груши, но также и косточковые плоды, такие как абрикосы, вишни, миндальные орехи и персики, а также бескосточковые ягоды, такие как клубника), *Ribesioideae* sp., *Juglandaceae* sp., *Betulaceae* sp., *Anacardiaceae* sp., *Fagaceae* sp., *Moraceae* sp., *Oleaceae* sp., *Actinidaceae* sp., *Lauraceae* sp., *Musaceae* sp. (например, банановые деревья и плантации), ), *Rubiaceae* sp. (например, кофе), *Theaceae* sp., *Sterculiaceae* sp., *Rutaceae* sp. (например, лимоны, апельсины и грейпфруты); *Solanaceae* sp. (например, помидоры), *Liliaceae* sp., *Asteraceae* sp. (например, салат-латук), *Umbelliferae* sp., *Cruciferae* sp., *Chenopodiaceae* sp., *Cucurbitaceae* sp. (например, огурец), *Alliaceae* sp. (например, лук-порей, лук), *Papilionaceae* sp. (например, горох); основные сельскохозяйственные культуры, такие как *Gramineae* sp. (например, маис, дерновые культуры, злаки, такие как пшеница, рожь, рис, ячмень, овес, просо и тритикале), *Assteraceae* sp. (например, подсолнух), *Brassicaceae* sp. (например, белокочанная капуста, краснокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, китайская капуста, кольраби, редис и масличный рапс, горчица, хрен и кресс-салат), *Fabaceae* sp. (например, бобы, арахис), *Papilionaceae* sp. (например, соя), *Solanaceae* sp. (например, картофель), *Chenopodiaceae* sp. (например, сахарная свекла, кормовая свекла, листовая свекла, свекла); полезные и декоративные растения для садов и лесопосадок; а также генетически модифицированные разновидности данных растений.

## Патогены

Примеры патогенов грибковых заболеваний, которые могут подвергаться обработке согласно изобретению, помимо прочего, включают:

заболевания, вызванные возбудителями мучнистой росы, например, видами *Blumeria*, например, *Blumeria graminis*; *Podosphaera* видами, например, *Podosphaera leucotricha*; видами *Sphaerotheca*, например, *Sphaerotheca fuliginea*; видами *Uncinula*, например, *Uncinula necator*;

заболевания, вызванные возбудителями ржавчинных заболеваний, например, видами *Gymnosporangium*, например, *Gymnosporangium sabinae*; видами *Hemileia*, например, *Hemileia vastatrix*; видами *Phakopsora*, например, *Phakopsora pachyrhizi* или *Phakopsora meibomia*; видами *Puccinia*, например, *Puccinia recondita*, *Puccinia graminis* или *Puccinia striiformis*; видами *Uromyces*, например, *Uromyces appendiculatus*;

заболевания, вызванные патогенами из группы *Oomycetes*, например, видами *Albugo*, например, *Albugo Candida*; видами *Bremia*, например, *Bremia lactucae*; видами *Peronospora*, например, *Peronospora pisi* или *P. brassicae*; видами *Phytophthora*, например, *Phytophthora infestans*; видами *Plasmopara*, например, *Plasmopara viticola*; видами *Pseudoperonospora*, например, *Pseudoperonospora humuli* или *Pseudoperonospora cubensis*; видами *Pythium*, например, *Pythium ultimum*;

заболевания пятнистости и увядания листьев, вызванные например, видами *Alternaria*, например, *Alternaria solani*; видами *Cercospora*, например, *Cercospora beticola*; видами *Cladosporium*, например, *Cladosporium cucumerinum*; видами *Cochliobolus*, например, *Cochliobolus sativus* (конидиальная форма: *Drechslera*, син.: *Helminthosporium*) или *Cochliobolus miyabeanus*; видами *Colletotrichum*, например, *Colletotrichum lindemuthianum*; видами *Cyloconium*, например, *Cyloconium oleaginum*; видами *Diaporthe*, например, *Diaporthe citri*; видами *Elsinoe*, например, *Elsinoe fawcettii*; видами *Gloeosporium*, например, *Gloeosporium laeticolor*; видами *Glomerella*, например, *Glomerella cingulata*; видами *Guignardia*, например, *Guignardia bidwelli*; видами *Leptosphaeria*, например, *Leptosphaeria maculans*; видами *Magnaporthe*, например, *Magnaporthe grisea*; видами *Microdochium*, например, *Microdochium nivale*; видами *Mycosphaerella*, например, *Mycosphaerella graminicola*, *Mycosphaerella arachidicola* или *Mycosphaerella fijiensis*; видами *Phaeosphaeria*, например, *Phaeosphaeria nodorum*; видами *Pyrenophora*, например, *Pyrenophora teres* или *Pyrenophora tritici repentis*; видами *Ramularia*, например, *Ramularia collo-cygni* или *Ramularia areola*; видами *Rhynchosporium*, например, *Rhynchosporium secalis*; видами *Septoria*, например, *Septoria arifii* или *Septoria lycopersici*; видами *Stagonospora*, например, *Stagonospora nodorum*; видами *Typhula*, например, *Typhula incarnata*; видами *Venturia*, например, *Venturia inaequalis*;

заболевания корня и стебля, вызванные, например, видами *Corticium*, например, *Corticium graminum*; видами *Fusarium*, например, *Fusarium oxysporum*; видами *Gaeumannomyces*, например, *Gaeumannomyces graminis*; видами *Plasmodiophora*, например, *Plasmodiophora brassicae*; видами *Rhizoctonia*, например, *Rhizoctonia solani*; видами *Sarocladium*, например, *Sarocladium oryzae*; видами *Sclerotium*, например, *Sclerotium oryzae*; видами *Tapesia*, например, *Tapesia acuformis*; видами *Thielaviopsis*, например, *Thielaviopsis basicola*;

заболевания колоса и метелки (включая початки кукурузы), вызванные, например, видами *Alternaria*, например, *Alternaria spp.*; видами *Aspergillus*, например, *Aspergillus flavus*; видами *Cladosporium*, например, *Cladosporium cladosporioides*; видами *Claviceps*, например, *Claviceps purpurea*; видами *Fusarium*, например, *Fusarium culmorum*; видами *Gibberella*, например, *Gibberella zeae*; видами *Monographella*, например, *Monographella nivalis*; видами *Stagnospora*, например, *Stagnospora nodorum*;

заболевания, вызванные головневыми грибами, например, видами *Sphacelotheca*, например, *Sphacelotheca reiliana*; видами *Tilletia*, например, *Tilletia caries* или *Tilletia controversa*; видами *Urocystis*, например, *Urocystis occulta*; видами *Ustilago*, например, *Ustilago nuda*;

плодовая гниль, вызванная, например, видами *Aspergillus*, например, *Aspergillus flavus*; видами *Botrytis*, например, *Botrytis cinerea*; видами *Penicillium*, например, *Penicillium expansum* или *Penicillium purpogenum*; видами *Rhizopus*, например, *Rhizopus stolonifer*; видами *Sclerotinia*, например, *Sclerotinia sclerotiorum*; видами *Verticillium*, например, *Verticillium albo-atrum*;

заболевания гнили и увядания, передающиеся с семенами и через почву, а также заболевания сеянцев, вызванные, например, видами *Alternaria*, например, *Alternaria brassicicola*; видами *Aphanomyces*, например, *Aphanomyces euteiches*; видами *Ascochyta*, например, *Ascochyta lentis*; видами *Aspergillus*, например, *Aspergillus flavus*; *Cladosporium* видами, например, *Cladosporium herbarum*; видами *Cochliobolus*, например, *Cochliobolus sativus* (конидиальная форма: *Drechslera*, *Bipolaris* Син.: *Helminthosporium*); видами *Colletotrichum*, например, *Colletotrichum coccodes*; видами *Fusarium*, например, *Fusarium culmorum*; видами *Gibberella*, например, *Gibberella zeae*; видами *Macrophomina*, например, *Macrophomina phaseolina*; видами *Microdochium*, например, *Microdochium nivale*; видами *Monographella*, например, *Monographella nivalis*; видами *Penicillium*, например, *Penicillium expansum*; видами *Phoma*, например, *Phoma lingam*; видами *Phomopsis*, например, *Phomopsis sojae*; видами *Phytophthora*, например, *Phytophthora castorum*; видами *Pyrenophora*, например, *Pyrenophora graminum*; видами *Pyricularia*, например, *Pyricularia oryzae*; видами *Pythium*, например, *Pythium ultimum*; видами *Rhizoctonia*, например, *Rhizoctonia solani*; видами *Rhizopus*, например, *Rhizopus oryzae*; видами *Sclerotium*, например, *Sclerotium rolfsii*; видами *Septoria*, например, *Septoria nodorum*; видами *Typhula*, например, *Typhula incarnata*; видами *Verticillium*, например,

*Verticillium dahliae*;

раки, галлы и ведьмина метла, вызванные, например, видами *Nectria*, например, *Nectria galligena*;  
болезни увядания, вызванные, например, видами *Monilinia*, например, *Monilinia laxa*;

деформации листьев, цветов и плодов, вызванные, например, видами *Exobasidium*, например, *Exobasidium vexans*; видами *Taphrina*, например, *Taphrina deformans*;

дегенеративные заболевания древесных растений, вызванные, например, видами *Esca*, например, *Phaeomoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium aleophilum* или *Fomitiporia mediterranean* видами *Ganoderma*, например, *Ganoderma boninense*;

болезни цветков и семян, вызванные, например, видами *Botrytis*, например, *Botrytis cinerea*;

болезни клубней растения, вызываемые, например, видами рода *Rhizoctonia*, например, *Rhizoctonia solani*; видами рода *Helminthosporium*, например, *Helminthosporium solani*;

болезни, вызываемые бактериальными патогенами, например, видами *Xanthomonas*, например, *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*; видами *Pseudomonas*, например, *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*; видами *Erwinia*, например, *Erwinia amylovora*.

Предпочтительно соединения по изобретению могут использоваться для борьбы со следующими заболеваниями сои:

Грибковые заболевания листьев, стеблей, стручков и семян, например, альтернариоз (*Alternaria spec.*, *atrans tenuissima*), антракноз (*Colletotrichum gloeosporoides dematium* var. *truncatum*), бурая пятнистость листьев или плодов (*Septoria glycines*), церкоспороз листьев (*Cercospora kikuchii*), серая пятнистость листьев (*Choanephora infundibulifera trispora* (Syn.)), пятнистость листьев, вызванная *dactuliophora* (*Dactuliophora glycines*), ложномучнистая роса (*Peronospora manshurica*), гниль, вызванная *drechslera* (*Drechslera glycini*), селенофомозная пятнистость злаковых трав (*Cercospora sojae*), пятнистость листьев, вызванная *leptosphaerulina* (*Leptosphaerulina trifolii*), пятнистость листьев, вызванная *phyllosticta* (*Phyllosticta sojaecola*), гниль бобов и стеблей сои (*Phomopsis sojae*), настоящая мучнистая роса (*Microsphaera diffusa*), пятнистость листьев, вызванная *pyrenochaeta* (*Pyrenochaeta glycines*), ризоктония воздушная болезнь, листва, и паутинистая болезнь (*Rhizoctonia solani*), ржавчина (*Phakopsora pachyrhizi*, *Phakopsora meibomia*), парша (*Sphaceloma glycines*), стемфилиоз (*Stemphylium botryosum*), мишеневидная пятнистость листьев (*Corynespora cassiicola*).

Грибковые заболевания корней и оснований стебля, например, черная корневая гниль (*Calonectria rotalariae*), угольная гниль (*Macrophomina phaseolina*), фузариоз или фузариозный вилт, корневая гниль и гниль стручка и корневой шейки (*Fusarium oxysporum*, *Fusarium orthoceras*, *Fusarium semitectum*, *Fusarium equiseti*), гниение корней, вызываемое видами миколептодискус (*Mycolopodiscus terrestris*), *neocosmospora* (*Neocosmospora vasinfecta*), гниль бобов и стеблей (*Diaporthe phaseolorum*), стеблевый рак (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*), фитофтороз (*Phytophthora megasperma*), бурая гниль стеблей сои (*Phialophora gregata*), грибная гниль (*Pythium aphanidermatum*, *Pythium irregulare*, *Pythium debaryanum*, *Pythium myriotylum*, *Pythium ultimum*), ризоктониоз, войлочная болезнь и выпревание (*Rhizoctonia solani*), склеротиниоз (*Sclerotinia sclerotiorum*), склероциальная южная гниль (*Sclerotinia rolfsii*), гниение корней, вызываемое видами тиелавиопсис (*Thielaviopsis basicola*).

Предпочтительно соединения по изобретению также могут использоваться для борьбы с заболеваниями пятнистости и увядания листьев, а также с заболеваниями корня и стебля фруктов и овощей.

Регуляция роста растений

В некоторых случаях, комбинации соединений по изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, при определенной концентрации или дозировке, могут применяться в качестве регуляторов роста или агентов, улучшающих характеристики растений.

Использование регуляторов роста может иметь различное воздействие на растения. Воздействие таких веществ в значительной степени зависит от времени применения относительно стадии развития растения, а также от количеств активного ингредиента, которым обрабатываются растения, или который вносится в среду произрастания растений, а также от вида обработки или внесения. В каждом случае, регуляторы роста должны обладать определенным целевым воздействием на сельскохозяйственные культуры.

Регулирующие воздействия на рост включают более раннее прорастание, улучшенную всхожесть, более развитую корневую систему и/или улучшенный рост корней, улучшенную способность побегообразования, более продуктивные побеги, более раннее цветение, увеличенную высоту и/или биомассу растения, укороченные стебли, улучшенный рост побегов, количество зерен на колос, количество колосьев на м<sup>2</sup>, количество столонов и/или количество цветков, улучшенный индекс урожайности, больший размер листьев, меньшее количество мертвых базальных листьев, улучшенное листорасположение, более раннее вызревание/более раннее плодоношение, однородное вызревание, повышенная продолжительность периода налива зерна, улучшенное вызревание плодов, увеличенный размер плодов/овощей, устойчивость при прорастании и сниженное полегание.

Термин "повышенная урожайность" или "улучшенная урожайность" относится к общей биомассе на гектар, выходу продукта в расчете на гектар, отношению веса косточки/фрукта, размеру семени и/или весу гектолитра, а также к улучшенному качеству продукции, включая следующие характеристики:

улучшенная пригодность для переработки в отношении распределения по размерам (например, зерен или плодов), однородное вызревание, влагосодержание зерна, улучшенные характеристики при помоле, улучшенные характеристики при винификации, улучшенные характеристики при варении пива, повышенный выход сока, улучшенные характеристики при сборе урожая, перевариваемость, число седиментации, число падения, стабильность стручков, стабильность при хранении, улучшенная длина/прочность/однородность волокон, повышенное качество молока и/или мяса у животных, кормление которых происходит с использованием силоса, адаптация при кулинарном приготовлении и жарке;

также включая улучшенные товарные качества в отношении улучшенного качества плодов/зерна, распределение по размерам (например, зерен или плодов), большая продолжительность срока хранения/срока сохраняемости, твердость/мягкость, вкус (запах, консистенция), сортность (размер, форма, количество ягод), количество ягод/плодов на грозди, хрусткость, свежесть, покрытие воском, частота физиологических нарушений, цвет;

также включая повышенное содержание целевых ингредиентов, например, содержание белков, жирных кислот, содержание масел, качество масел, аминокислотный состав, содержание сахаров, содержание кислот (рН), отношение сахара/кислоты (Brix), полифенолы, содержание крахмала, пищевая ценность, содержание глютена/клейковинность, энергосодержание, вкусовые качества;

также включая пониженное содержание нежелательных ингредиентов, например, меньшее содержание микотоксинов, меньшее содержание афлатоксинов, уровень геосмина, содержание ароматических и фенольных компонентов, лакказы, полифенол оксидазы и пероксидазы, содержание нитратов.

Соединения-регуляторы роста растений могут использоваться, например, для замедления вегетативного развития растений. Такое подавление развития представляет экономический интерес, например, для дерновых культур, так как таким образом возможно уменьшить частоту кошения травы в декоративных садах, парках и спортивных площадках, на обочине дорог, в аэропортах или на площадях с фруктовыми культурами. Также подавление развития важно для травянистых и древесных растений, выращиваемых на обочинах дорог, вблизи трубопроводов или воздушных линий или, в целом, в таких местах, где нежелателен бурный рост растений.

Также, большое значение имеет применение регуляторов роста для подавления продольного роста злаковых культур. Это снижает или полностью устраняет опасность полегания растений до урожая. В дополнение, при использовании регуляторов роста может происходить укрепление стеблей злаков, что также снижает риск полегания. При использовании регуляторов роста для укрепления и укорочения стеблей злаков обеспечивается возможность внесения больших объемов удобрений для увеличения урожая без опасности полегания.

Для многих сельскохозяйственных культур подавление вегетативного развития растений обеспечивает возможность посадки растений с большей плотностью, таким образом, на одинаковой площади можно получить больший урожай. Еще одним преимуществом меньших растений, полученных таким образом, является то, что таким образом проще культивировать растения и собирать урожай.

При снижении вегетативного развития растений можно также добиться увеличения или улучшения урожая, так как в этом случае обеспечивается более эффективное потребление питательных веществ и ассимилятов для образования цветков и плодов, а не для роста вегетативных частей растений.

В качестве альтернативы, регуляторы роста также могут использоваться для стимулирования вегетативного развития. Это весьма целесообразно, когда при сборе урожая собираются вегетативные части растения. Однако при стимулировании вегетативного развития может также стимулироваться генеративное развитие, поскольку в этом случае происходит образование большего количества ассимилятов, что приводит к образованию большего количества плодов или к образованию плодов большего размера.

Кроме того, положительные эффекты на рост растений или урожайность могут быть достигнуты за счет улучшения эффективности использования питательных веществ, в частности, эффективности использования азота (N), эффективности использования фосфора (P), эффективности использования воды, улучшения транспирации, интенсивности дыхания и/или ассимиляции CO<sub>2</sub>, улучшения образования клубеньков, улучшения Са-метаболизма.

Аналогичным образом, регуляторы роста могут использоваться для изменения состава растений, что в свою очередь может привести к улучшению качества урожая. Регуляторы роста могут оказывать влияние на образование партенокарпических плодов. В дополнение, можно влиять на пол цветка. Также возможно получение стерильной пыльцы, что важно при селекции и получении гибридных семян.

Использованием регуляторов роста можно контролировать ветвеобразование у растений. С другой стороны, при нарушении апикального доминирования можно стимулировать развитие боковых побегов, что может быть желательным в особенности при культивировании декоративных растений, также в комбинации с подавлением роста. С другой стороны, также возможно подавлять рост боковых побегов. Такой эффект представляет особый интерес, например, при выращивании табака или томатов.

Под воздействием регуляторов роста можно регулировать количество листьев на растениях, так, чтобы в необходимом время происходила дефолиация. Такая дефолиация играет важную роль при механическом сборе урожая хлопка, но также и при сборе урожая других культур, например, при возделывании винограда. Дефолиация растений также может осуществляться для снижения транспирации у расте-

ний перед пересадкой.

Кроме того, регуляторы роста могут модулировать старение растений, что может привести к увеличению продолжительности периода с зелеными листьями, увеличению фазы заполнения зерна, повышению качества урожая.

Также регуляторы роста могут использоваться для регулирования вскрытия плода. С другой стороны, таким образом можно предотвращать преждевременное вскрытие плода. С другой стороны, также можно стимулировать вскрытие плода или даже недоразвитие цветка для достижения необходимой массы ("прореживание завязей"). В дополнение, регуляторы роста могут использоваться для того, чтобы во время сбора урожая плоды отделялись от растения с применением меньшей физической силы для обеспечения возможности механической уборки урожая или для облегчения ручной уборки.

Регуляторы роста могут также использоваться для получения более раннего или наоборот, более позднего созревания собираемого материала до или после урожая. Это является особенно важным, так как это позволяет наилучшим образом подстраиваться под требования рынка. Кроме того, в некоторых случаях регуляторы роста могут улучшать цвет плодов. В дополнение, регуляторы роста могут также использоваться для того, чтобы созревание происходило в течение определенного периода времени. Таким образом, создаются необходимые условия для того, чтобы обеспечить возможность механической или ручной уборки урожая в один этап, например, в случае табака, томатов или кофе.

В дополнение, с использованием регуляторов роста растений можно влиять на период покоя семян или почек растений так, чтобы, например, прорастание, побегообразование, цветение растений, таких как ананас или декоративные растения в питомниках, происходило в такие периоды, когда это не является обычным. В районах, где высока вероятность заморозков, с помощью регуляторов роста желательно обеспечить задержку в распускании почек или прорастании семян для того, чтобы избежать ущерба вследствие поздних заморозков.

Наконец, регуляторы роста могут придать растениям устойчивость к низким температурам, засухе или засоленности почвы. Этим обеспечивается возможность культивирования растений в районах непригодных, как правило, для таких целей.

**Придание устойчивости/Жизнестойкость растений и другие эффекты**

Комбинации соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такие комбинации, также проявляют сильное укрепляющее воздействие на растения. Соответственно, они могут использоваться для мобилизации защитной системы растения против атаки вредных микроорганизмов.

Под веществами, повышающими жизнестойкость растений (придающими растениям устойчивость), в контексте настоящего изобретения подразумеваются вещества, способные стимулировать защитную систему растения таким образом, чтобы обработанные растения впоследствии, при инокуляции их вредоносными микроорганизмами развивали бы высокую степень устойчивости к этим микроорганизмам.

Также, в контексте настоящего изобретения физиологические характеристики растения включают следующее:

Устойчивость к абиотическому стрессу, что включает устойчивость к воздействию высоких или низких температур, устойчивость к засухе и способность восстанавливаться после стрессовых засушливых условий, эффективность использования воды (что взаимосвязано со сниженным водопотреблением), устойчивость к затоплению, озоновый стресс и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к химическим веществам, таким как тяжелые металлы, соли, пестициды.

Устойчивость к абиотическому стрессу, что включает повышенную устойчивость к грибам и повышенную устойчивость к нематодам, вирусам и бактериям. В контексте настоящего изобретения устойчивость к абиотическому стрессу предпочтительно включает повышенную устойчивость к грибам и повышенную устойчивость к нематодам.

Повышенная мощность растений, включая повышенную жизнестойкость растений/повышенное качество растений и повышенную энергию прорастания семян, сниженную склонность к полеганию, улучшенный внешний вид, повышенную способность к восстановлению после стрессовых условий, улучшенную пигментацию (например, содержание хлорофилла, улучшенную способность к сохранению зеленой окраски) и улучшенный коэффициент полезного действия фотосинтеза.

**Микотоксины**

В дополнение, комбинации соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такие комбинации, могут снижать содержание микотоксинов в собранном материале и в полученных из него пищевых продуктах и кормах. В частности, микотоксины включают, помимо прочего, следующие вещества: дезоксиниваленол (DON), ниваленол, 15-Ас-DON, 3-Ас-DON, Т2- и НТ2-токсин, фумонизины, зеараленон, монилиформин, фузарин, диацетоксисцирпенол (DAS), боверин, энниатин, фузаропролиферин, фузаренол, охратоксин, патулин, алкалоиды спорыньи и афлатоксины, которые могут производиться, например, следующими грибами: видами *Fusarium*, такими как *F. acuminatum*, *F. asiaticum*, *F. avenaceum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. graminearum* (*Gibberella zeae*), *F. equiseti*, *F. fujikoroii*, *F. musarum*, *F. oxysporum*, *F. proliferatum*, *F. poae*, *F. pseudogrammarum*, *F. sambucinum*, *F. scirpi*, *F. semitectum*, *F. solani*, *F. sporotrichoides*, *F. langsethiae*, *F. subglutinans*, *F. tricinctum*, *F. verticillioides*, а также видами *Aspergillus*, такими как *A. flavus*, *A. parasiticus*, *A. nomius*, *A. ochraceus*, *A. clavatus*, *A. terreus*, *A. versicolor*.

color, видами *Penicillium*, такими как *P. verrucosum*, *P. viridicatum*, *P. citrinum*, *P. expansum*, *P. claviforme*, *P. roqueforti*, видами *Claviceps*, такими как *C. purpurea*, *C. fusiformis*, *C. paspali*, *C. africana*, видами *Stachybotrys* и другими.

#### Защита материалов

Комбинации соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такие комбинации, могут также использоваться для защиты промышленных материалов, для защиты промышленных материалов от воздействия фитопатогенных грибов и разрушения фитопатогенными грибами.

В дополнение, комбинации соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такие комбинации, могут использоваться в качестве композиций, предохраняющих от биологического обрастания, в отдельности или комбинации с другими активными ингредиентами.

В контексте настоящего изобретения под термином "промышленные материалы" подразумеваются неживые материалы, которые предназначены для применения в промышленности. Например, промышленными материалами, защита которых может осуществляться с использованием композиций по изобретению от изменений или разрушения вследствие воздействия микроорганизмов, могут являться клеящие вещества, клеи, бумага, обои и доски/картон, текстильные материалы, ковры, кожа, древесина, волокнистая масса и ткани, краска и изделия из пластика, смазывающе-охлаждающие жидкости, и другие материалы, которые могут поражаться или разрушаться микроорганизмами. Также в составе материалов, защита которых может осуществляться по изобретению, можно упомянуть части производственных установок и зданий, например, контуры циркуляции охлаждающей воды, системы охлаждения и нагрева, а также блоки вентиляции и кондиционирования воздуха, которые могут разрушаться вследствие развития микроорганизмов. Промышленные материалы по настоящему изобретению предпочтительно включают клеящие вещества, клеи, бумагу и картон, кожу, древесину, краску, смазывающе-охлаждающие жидкости и теплообменные жидкости, более предпочтительно, древесину.

Комбинации соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такие комбинации, могут предотвращать негативные воздействия, такие как гниение, порча, изменение цвета, обесцвечивание или образование плесени.

В случае обработки древесины комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, могут также быть использованы против грибковых заболеваний, которые могут развиваться на поверхности или внутри лесоматериалов. Термин "лесоматериалы" означает все виды пород дерева и все виды обработанной древесины, предназначенные для строительства, например, цельная древесина, древесина высокой плотности, ламинированная древесина и фанера. Способ обработки лесоматериалов по изобретению, в основном, состоит в контакте с композицией по изобретению; это включает, например, непосредственное нанесение, распыление, протравливание методом погружения, инъекции или любые другие соответствующие способы.

В дополнение, комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, могут использоваться для защиты от биологического обрастания объектов, которые контактируют с минерализованной или соленой водой, в частности, корпуса судов, экраны, сети, строения, места стоянки и сигнальные системы.

Комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, могут также использоваться для защиты складированной продукции. Термин "товары для хранения" означает природные вещества растительного или животного происхождения и полученные путем их переработки продукты природного происхождения, для которых необходима долгосрочная защита. Товары для хранения растительного происхождения включают, например, растения или их части, такие как стебли, листья, клубни, семена, плоды или зерно, могут быть защищены в свежесобранном состоянии или в переработанном виде, например, путем предварительного высушивания, увлажнения, измельчения, перемалывания, спрессовывания или высокотемпературной обработки. Товары для хранения также включают лесоматериалы, как сырые лесоматериалы, такие как строительные лесоматериалы, опоры линии электропередачи и ограждения, так и лесоматериалы в виде готовых изделий, такие как мебель. Товарами для хранения животного происхождения являются, например, шкуры, кожа, меховые изделия и изделия из волосяной ткани меха. Композиции по изобретению могут предотвращать негативные воздействия, такие как гниение, порча, изменение цвета, обесцвечивание или образование плесени.

Микроорганизмы, которые способны портить промышленные материалы или изменять их свойства, включают, например, бактерии, грибы, дрожжи, водоросли и организмы, живущие в иле. Соединения формулы (I) предпочтительно обладают воздействием на грибы, в особенности, на плесень, на грибы, в результате воздействия которых происходит обесцвечивание или разрушение древесины (*Ascomycetes*, *Basidiomycetes*, *Deuteromycetes* and *Zygomycetes*), и воздействием на организмы, живущие в иле, и водоросли. Примеры таких организмов включают микроорганизмы следующих родов: *Alternaria*, такие как *Alternaria tenuis*; *Aspergillus*, такие как *Aspergillus niger*; *Chaetomium*, такие как *Chaetomium globosum*; *Coniophora*, такие как *Coniophora puetana*; *Lentinus*, такие как *Lentinus tigrinus*; *Penicillium*, такие как *Penicillium glaucum*; *Polyporus*, такие как *Polyporus versicolor*; *Aureobasidium*, такие как *Aureobasidium pullulans*; *Sclerophoma*, такие как *Sclerophoma ptyophila*; *Trichoderma*, такие как *Trichoderma viride*; *Ophiostoma* spp., *Ceratocystis* spp., *Hemicola* spp., *Petriella* spp., *Trichurus* spp., *Coriolus* spp., *Gloeophyllum* spp.,

*Pleurotus* spp., *Poria* spp., *Serpula* spp. и *Tyromyces* spp., *Cladosporium* spp., *Paecilomyces* spp. *Mucor* spp., *Escherichia*, такие как *Escherichia coli*; *Pseudomonas*, такие как *Pseudomonas aeruginosa*; *Staphylococcus*, такие как *Staphylococcus aureus*, *Candida* spp. и *Saccharomyces* spp., такие как *Saccharomyces cerevisiae*.

#### Обработка семян

Настоящее изобретение также включает способ обработки семян.

Еще один аспект настоящего изобретения относится, в частности, к семенам (в состоянии покоя, примированным, пророщенным или даже с взошедшими корнями и листьями), обработанным комбинацией соединений по настоящему изобретению или композицией, содержащей такую комбинацию. Семена по изобретению используются в способах защиты семян и всходов растений из семян от фитопатогенных вредоносных грибов. В соответствии с этими способами используются семена, обработанные комбинацией соединений по изобретению или композицией с ее участием.

Комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, также могут использоваться для обработки семян и сеянцев. Большая часть поврежденных сельскохозяйственных культур вредоносными организмами вызвана заражением семян до засева в почву или после прорастания растений. Данная фаза особенно критична, так как в этот период корни и побеги растущего растения наиболее подвержены повреждениям, и даже небольшое повреждение может вызвать гибель растения. Поэтому особенно важна защита семян и прорастающих растений подходящими композициями.

Также, желательно оптимизировать количество используемого активного ингредиента таким образом, чтобы обеспечить по возможности наиболее эффективную защиту семян и прорастающих растений и всходов от атаки фитопатогенных грибов, но без повреждения самого растения используемым активным ингредиентом. В частности, способы обработки достигли оптимальной защиты семян и прорастающих растений с минимальным расходом защитных композиций, в частности, необходимо принимать во внимание естественные фенотипы трансгенных растений.

Таким образом, настоящее изобретение также относится к способу защиты семян и прорастающих растений и всходов от атаки вредителей животных и/или фитопатогенных вредоносных микроорганизмов путем обработки семян комбинацией или композицией по изобретению. Изобретение также относится к использованию комбинаций или композиций по изобретению для обработки семян с целью защиты семян, прорастающих растений или взошедших сеянцев от вредителей животных и/или фитопатогенных микроорганизмов. Изобретение дополнительно касается семян, которые обрабатывались комбинацией или композицией по изобретению для защиты от вредителей животных и/или фитопатогенных микроорганизмов.

Одним из преимуществ настоящего изобретения является то, что обработка семян такими композициями обеспечивает защиту от вредителей животных и/или фитопатогенных вредоносных микроорганизмов не только самих семян, но и выросших из них растений после появления всходов. В данном случае прямая обработка культуры во время засева и сразу после него может защитить растения. Также семена могут быть обработаны и до засева. Также, предпочтительным считается то, что комбинация активных ингредиентов или композиция по изобретению, в частности, могут использоваться для обработки трансгенных семян, в этом случае растение, выросшее из такого семени, способно экспрессировать белок, противодействующий вредителям животных, гербицидному вреду и абиотическому стрессу. Обработка таких семян активными ингредиентами или композициями по изобретению, например, инсектицидным белком, может обеспечить противодействие определенным вредителям.

Комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, могут использоваться для защиты семян любого сорта растения, используемого в сельском хозяйстве, при выращивании в теплице, в лесу или используемого в области растениеводства или садоводства. В частности, это могут быть семена злаковых культур (таких как пшеница, ячмень, рожь, просо и овес), масляного рапса, кукуруза, хлопка, сои, риса, картофеля, подсолнечника, бобов, кофе, свеклы (например, сахарная свекла и кормовая свекла), арахиса, овощей (такие как помидор, огурец, лук и салат-латук), дерновых и декоративных культур. Особенное значение имеет обработка семян пшеницы, сои, масличного рапса, кукурузы и риса.

Как уже было отмечено, обработка трансгенных семян комбинациями соединений или композициями по изобретению представляет особую важность. Это относится к семенам растений, которые содержат, по меньшей мере, один гетерологический ген, который обеспечивает экспрессию полипептида или белка, например, с особыми инсектицидными качествами. В трансгенных семенах такие гетерологические гены могут происходить, например, из микроорганизмов, таких родов как *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Trichoderma*, *Clavibacter*, *Glomus* или *Gliocladium*. Такие гетерологические гены предпочтительно происходят из рода *Bacillus*, в этом случае генный продукт обладает эффективностью в отношении огневки кукурузной и/или западный кукурузный жук. Особенно предпочтительны гетерологические гены, происходящие из *Bacillus thuringiensis*.

В контексте данного изобретения композиция или комбинация по изобретению применяется только к семенам или в составе подходящей препаративной формы. Предпочтительно, чтобы семена были достаточно твердыми, чтобы не допустить повреждений во время обработки. Обычно обработка семян про-

изводится в любое время между сбором урожая и посевом и через некоторое время после посева. Обычно используются семена, которые были отделены от растения и у которых были удалены стержни початка, шелуха, плодоножки, оболочки, волоски или мякоть плода. Например, можно использовать семена, которые были собраны, очищены и высушены так, чтобы содержание влаги составляло менее 15 мас.%. В качестве альтернативы, также можно использовать семя, которое после высушивания, например, было обработано водой, а затем снова высушено, или же семена сразу после их примирования, семена, которые хранятся в примированном состоянии, или предварительно проросшие семена, или же семена, высеванные на брудерных лотках, пленке или бумаге.

Во время обработки семян следует обращать особое внимание на то, чтобы количество комбинации или композиции по изобретению, наносимое на семена, и/или количество дополнительных добавок подбиралось таким образом, чтобы не навредить процессу прорастания семян и самому растению. Это следует обеспечить, особенно в случае использования активных ингредиентов, которые могут иметь фитотоксичное воздействие при определенных дозировках.

Комбинация соединений по настоящему изобретению и композиции, содержащие такую комбинацию, могут применяться непосредственно, т.е. когда они не содержат каких-либо других компонентов, без разбавления. В целом, предпочтительно наносить композиции на семена в виде необходимого состава. Специалистам известны подходящие составы и способы обработки семян. Из комбинаций соединений по настоящему изобретению могут быть получены обычные препаративные формы, подходящие для нанесения на семена, такие как растворы, эмульсии, суспензии, порошки, пенные препараты, жидкие растворы или в сочетании с другими композициями для нанесения покрытия на семена, такими как пленкообразующие материалы, дражирующие материалы, мелкозернистое железо или прочие металлические порошки, гранулы, материалы для нанесения на инактивированные семена, а также препараты для УМО.

Эти препараты получают обычными способами, путем смешивания активных ингредиентов или их комбинаций с обычными добавками, например, обычными наполнителями, а также растворителями или разбавителями, красителями, смачивающими агентами, дисперсантами, эмульгаторами, антивспенивающими веществами, консервантами, вспомогательными загустителями, связывающими веществами, гелеобразователями, а также водой.

Применимыми красителями, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые красители, которые обычно могут использоваться для таких целей. Также можно использовать другие пигменты, которые являются умеренно растворимыми в воде, или красители, которые являются растворимыми в воде. Примеры красителей включают красители, известные под наименованиями Родамин В, С.1. пигмент красный 112 и С.1. растворитель красный 1.

Применимыми смачивающими агентами, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые вещества, способствующие смачиванию, и которые обычно могут использоваться при изготовлении препаратов, содержащих активные агрохимические ингредиенты. Предпочтительно применимыми являются такие алкилнафталенсульфонаты, как диизопропил- или диизобутилнафталенсульфонаты.

Применимыми дисперсантами или эмульгаторами, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые неионные, анионные и катионные дисперсанты, которые обычно могут использоваться при изготовлении препаратов, содержащих активные агрохимические ингредиенты. Предпочтительным является использование неионных или анионных дисперсантов или смесей неионных или анионных дисперсантов. Применимые неионные дисперсанты включают, в частности, блок-сополимеры этиленоксида/ пропиленоксида, алкилфенол-полигликолевый эфир и тристририлилфенол-полигликолевый эфир, а также их фосфатированные и сульфатированные производные. Применимыми анионными дисперсантами являются, в частности, лигносульфаты, соли полиакриловой кислоты и конденсаты формальдегида с арилсульфонатом.

Противовспенивающими веществами, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые пеноингибиторы, которые обычно могут использоваться при изготовлении препаратов, содержащих активные агрохимические ингредиенты.

Предпочтительными являются силиконовые противовспенивающие вещества и стеарат магния.

Консервантами, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые вещества, которые обычно могут использоваться для таких целей при изготовлении агрохимических композиций. Примеры таких веществ включают дихлорфен и полуформаль бензилового спирта.

Вспомогательными загустителями, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые вещества, которые обычно могут использоваться для таких целей при изготовлении агрохимических композиций. Предпочтительные примеры включают производные целлюлозы, производные акриловой кислоты, ксантан, модифицированные глины и мелкодисперсный оксид кремния.

Связывающими веществами, которые могут присутствовать в препаратах для нанесения на семена, применимых согласно данному изобретению, являются любые вещества, которые обычно могут использоваться для таких целей при изготовлении продуктов для нанесения на семена. К предпочтительным примерам таких веществ относятся поливинилпирролидон, поливинилацетат, поливиниловый спирт и тилоза.

Препаративные формы для нанесения на семена, которые применимы согласно данному изобретению, могут использоваться для обработки широкого спектра различных видов семян, как непосредственно, так и после предварительного разбавления водой. Например, концентраты и получаемые из них посредством разбавления водой препаративные формы могут использоваться для нанесения на семена зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, рожь, овес и тритикале, а также на семена кукурузы, сои, риса, масличного рапса, гороха, бобов, хлопка, подсолнечника и свеклы, а также на разнообразные виды семян различных овощей. Препаративные формы, которые применимы согласно данному изобретению, или препараты, полученные путем их разбавления, также могут использоваться с семенами трансгенных растений. В этом случае, могут также возникать дополнительные синергические эффекты при взаимодействии с веществами, которые образуются в результате экспрессии.

Для лечения семян составами для протравливания семян, которые могут использоваться в соответствии с настоящим изобретением, или полученными из них препаратами путем добавления воды, могут применяться все смесительные устройства, обычно применяющиеся для нанесения на семена. В частности, при процедуре нанесения на семена данные семена помещаются в смесительное устройство, к ним добавляют определенное, необходимое количество препаратов, в отдельности или после разбавления водой, и производится перемешивание всего объема до однородного распределения всех препаратов на семенах. При необходимости, за этим следует операция высушивания.

Доза внесения применимых согласно данному изобретению препаратов может варьироваться в пределах относительно широкого диапазона. Она зависит от конкретного содержания активных ингредиентов в препаративной форме, а также от семян. Доза внесения каждого отдельного активного ингредиента обычно составляет от 0,001 до 15 г на килограмм семян, предпочтительно от 0,01 до 5 г на килограмм семян.

#### ГМО

Как уже было сказано выше, согласно данному изобретению могут подвергаться обработке все растения и их части. В предпочтительном варианте реализации изобретения обрабатывают растения, а также их части, сортов и видов, встречающихся в диком виде, или выведенных обычными биологическими методами, например, скрещиванием или синтезом протопластов. В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом реализации обработке подвергаются трансгенные растения, полученные методами генной инженерии, при необходимости, в комбинации с обычными методами ("генетически модифицированные организмы"), и части таких растений. Объяснение терминов "части" или "части растения" или "растительные части" было приведено выше. Более предпочтительно, в соответствии с настоящим изобретением обрабатываются растения сортов, которые являются коммерчески доступными или используемыми. Под термином "сорта растений" подразумеваются растения, обладающие новыми свойствами ("характеристиками"), которые были получены методами обычного разведения, мутагенезом или с применением технологии рекомбинантных ДНК. Это могут быть сорта, разновидности, био- или генотипы.

Способ обработки по изобретению можно использовать для обработки генетически модифицированных организмов (ГМО), например, растений или семян. Генетическими модифицированными растениями (или трансгенными растениями) являются растения, у которых в геноме устойчиво встроен гетерологичный ген. Выражение "гетерологичный ген" по существу, означает ген, который создан или собран вне растения, и который, при введении в ядерный, хлоропластный или митохондриальный геном, дает трансформированное растение с новыми или улучшенными агротехническими или другими свойствами, за счет экспрессии целевого белка или полипептида, или за счет отрицательной регуляции или сайленсинга другого (других) гена (генов), которые присутствуют в растении (с использованием, например, антисмысловой технологии, косупрессорной технологии или технологии РНК-интерференции (RNAi) или технологии микроРНК (miRNA)). Гетерологичный ген, который локализован в геноме, также называется трансгеном. Трансген, который определен конкретной локализацией в геноме растения, называют трансформационным или трансгенным объектом.

Растения и сорта растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, включают все растения, имеющие генетический материал, который придает особенно преимущественные полезные характеристики этим растениям (полученные селекцией и/или методами биотехнологии растений).

Растения и сорта растений, которые также предпочтительно могут быть обработаны в соответствии с изобретением, представляют собой такие растения, которые являются устойчивыми к одному или нескольким факторам биотического стресса, т.е. указанные растения проявляют повышенную устойчивость по отношению к животным-вредителям и микробным-вредителям, например, к нематодам, насекомым, клещам, фитопатогенным грибам, бактериям, вирусам и/или вириодам.

Растения и сорта растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением,

представляют собой такие растения, которые являются устойчивыми к одному или нескольким факторам абиотического стресса. Условия абиотического стресса включают, например, засуху, высокие и низкие температуры, осмотический стресс, затопление, повышенная засоленность почвы, повышенное присутствие минералов в почве, присутствие экстраординарных количеств озона, избыточный свет, недостаток азотных или фосфорных питательных веществ, отсутствие затенения.

Растения и сорта растений, которые также могут быть обработаны в соответствии с изобретением, представляют собой такие растения, которые характеризуются улучшенными характеристиками урожайности. Улучшенная урожайность указанных растений может быть результатом, например, улучшенных показателей физиологии, роста и развития растения, таких как эффективность использования воды, эффективность влагоудерживания, улучшенная усвояемость азота, усиленная ассимиляция углерода, улучшенный фотосинтез, повышенная всхожесть и ускоренное созревание. На урожайность, кроме того, может оказывать влияние улучшение организации растений (при стрессовых и нестрессовых условиях), включая, помимо прочего, раннее начало цветения, контроль цветения для получения гибридных семян, всхожесть, размер растения, количество междоузлий и расстояния между ними, рост корневой системы, размер семян, размер плодов, размер стручков, количество стручков или колосьев, количество семян в стручке или колосе, масса семени, увеличение процентного отношения выполненных семян, сниженное осыпание семян, сниженное растрескивание стручков и устойчивость к полеганию. Другие характеристики урожайности включают состав семян, например, содержание и композиция углеводов, например, хлопок или крахмал, содержание белков, масличность и состав жиров, пищевая ценность, сниженное содержание не обладающих пищевой ценностью веществ, улучшенная пригодность для переработки и лучшая устойчивость при хранении.

Растения, которые могут быть обработаны в соответствии с изобретением, представляют собой гибридные растения, которые уже проявляют признаки гетерозиса или гибридной силы, что в результате приводит в целом к улучшенной урожайности, силе, жизнеспособности и устойчивости к факторам биотического и абиотического стресса.

Растения или сорта растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть обработаны согласно настоящему изобретению, являются растениями, устойчивыми к гербицидам, т.е. растениями, обладающими устойчивостью к одному или нескольким определенным гербицидам. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такую устойчивость к гербицидам.

Растения или сорта растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, являются трансгенные растения, устойчивые к насекомым, т.е. растения, которым была придана устойчивость к нападению некоторых целевых насекомых. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такую устойчивость к насекомым.

Растения или сорта растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, являются устойчивыми к факторам абиотического стресса. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такую устойчивость к стрессу.

Растения или сорта растений (полученные методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, демонстрируют измененные количественные и качественные характеристики и/или характеристики устойчивости при хранении собранного продукта урожая и/или измененные характеристики определенных ингредиентов собранного продукта урожая.

Растения или сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, представляют собой растения, такие как растения хлопчатника, с измененными характеристиками волокна. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такие измененные свойства волокну.

Растения или сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, представляют собой растения, такие как масличный рапс и родственные растения Brassica, с измененными профильными свойствами масла. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такие измененные профильные свойства маслу.

Растения или сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, представляют собой растения, такие как масличный рапс и родственные растения Brassica, с измененными характеристиками осыпания семян. Такие растения, которые могут быть получены генетической трансформацией или селекцией растений, содержат мутацию, придающую такие измененные характеристики осыпания семян, и включают растения, такие как масличный рапс с запоздалым или пониженным

осыпанием семян.

Растения или сорта растений (которые могут быть получены методами биотехнологии растений, такими как генная инженерия), которые могут быть также обработаны согласно настоящему изобретению, представляют собой растения, такие как табак, с измененными профилями посттрансляционной модификации белка.

#### Применение

При использовании комбинаций по изобретению и композиций, содержащих такие комбинации, в качестве фунгицидов доза внесения может варьироваться в пределах относительно широкого диапазона, в зависимости от вида применения. Дозы внесения в случае обработки частей растения, например, листьев: 0,1 - 10 000 г/га, предпочтительно 10 - 1000 г/га, более предпочтительно 50 - 300 г/га (в случае обработки путем полива или орошения, возможно еще более снизить дозировку, в особенности, если используются инертные субстраты, такие как минеральная вата или перлит);

в случае обработки семян: 0,1 - 200 г на 100 кг семян, предпочтительно 1-150 г на 100 кг семян, более предпочтительно 2,5- 25 г на 100 кг семян, еще более предпочтительно 2,5- 12,5 г на 100 кг семян;

в случае обработки почвы: 0,1 - 10 000 г/га, предпочтительно 1 - 5000 г/га, причем приведенные количества относятся к общему количеству активного ингредиента в соответствующей комбинации или композиции.

Указанные дозировки приводятся исключительно в качестве примера и не ограничивают цели изобретения.

Настоящее изобретение поясняется следующими примерами. Тем не менее, изобретение не ограничено этими примерами.

#### Примеры

Усовершенствованная фунгицидная активность концентрации активных соединений согласно изобретению вытекает из приведенных ниже примеров. В то время как отдельные активные соединения проявляют слабость относительно фунгицидной активности, комбинации демонстрируют активность, превосходящую своими свойствами простую совокупность активностей.

Синергический эффект фунгицидов всегда присутствует, когда фунгицидная активность композиции активных соединений превышает суммарную активность активных соединений при внесении по отдельности. Ожидаемая активность данной комбинации двух активных соединений может быть рассчитана следующим образом (см. Colby, S.R., "Calculating Synergistic and Antagonistic Responses of Herbicide Combinations", Weeds 1967, 15, 20-22):

Если

X представляет собой эффективность, когда активное соединение А наносят при норме внесения m ч./млн. (или г/га),

Y представляет собой эффективность, когда активное соединение В наносят при норме внесения p ч./млн. (или г/га), и

E представляет собой эффективность, когда активные соединения А и В наносят при норме внесения m и p ч./млн. (или г/га), соответственно,

тогда

$$E = X + Y - \frac{X \cdot Y}{100}$$

Для тройных смесей получается следующее уравнение Колби: Если

X представляет собой эффективность, когда активное соединение А наносят при норме внесения m ч./млн (или г/га),

Y представляет собой эффективность, когда активное соединение В наносят при норме внесения p ч./млн (или г/га),

Z представляет собой эффективность, когда активное соединение С наносят при норме внесения o ч./млн (или г/га), и

E представляет собой эффективность, когда активные соединения А, В и С наносят при норме внесения m, p и o ч./млн (или г/га), соответственно,

тогда

$$E = X + Y + Z - \frac{X \cdot Y}{100} - \frac{X \cdot Z}{100} - \frac{Y \cdot Z}{100} + \frac{X \cdot Y \cdot Z}{100 \cdot 100}$$

Степень эффективности выражается в процентном отношении. 0% означает эффективность, соответствующую контрольной группе растений, а эффективность 100% означает, что болезнь не наблюдается.

Если фактическая активность превышает расчетное значение, то активность комбинации является сверхаддитивной, т.е. присутствует синергический эффект. В этом случае фактически наблюдаемая эффективность должна быть выше, чем значение прогнозируемой эффективности (E), расчет которой производится в соответствии с вышеуказанной формулой.

Другим способом демонстрации синергического эффекта является способ, описанный Таммесом (см. "Isoboles, a graphic representation of synergism in pesticides" в Neth. J. Plant Path., 1964, 70, 73-80).

Пример А: Испытания *in vitro* с использованием грибковых микроорганизмов

Лунки 96-луночных микротитрационных планшетов наполнили 30 мкл препаративной формы исследуемого соединения или комбинации соединений в метаноле + эмульгатор алкиларил-полигликолевый эфир. Затем осуществляют испарение растворителя в колпаке. На следующем этапе в каждую лунку добавляют по 200 мкл жидкой картофельно-декстрозной среды, в которую вносят соответствующую концентрацию спор или мицелиальной взвеси исследуемого гриба.

С помощью фотометра производится измерение оптической плотности во всех лунках на длине волны 620 нм.

Инкубацию микротитрационных планшетов осуществляли в течение периода от 3 до 7 дней при 20°C и при относительной влажности 85%. После инкубации торможение роста определяют фотометрически. Эффективность рассчитывается в отношении к контрольной группе необработанных растений; эффективность 0% означает рост гриба, соответствующий контрольной группе необработанных растений, в то время как эффективность 100% означает, что при измерении роста гриба не было обнаружено.

#### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Комбинация активных соединений для борьбы с фитопатогенными грибами, содержащая (А) в качестве соединения (А) метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат, (В) в качестве дополнительного активного соединения (В) (13.004) проквиназид и (С) по меньшей мере, одно дополнительное активное соединение (С), выбранное из (1.018) протиоконазола и (1.020) спирокамина.
2. Комбинация активных соединений по п.1, отличающаяся тем, что комбинация соединений выбрана из следующих смесей:  
метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат + (13.004) проквиназид + (1.018) протиоконазол, метил 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)фенил]-2-гидрокси-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пропаноат + (13.004) проквиназид + (1.020) спирокамин.
3. Комбинация активных соединений по одному из пп.1, 2, отличающаяся тем, что массовое соотношение соединения (А) и соединения (В) составляет от 500:1 до 1:500.
4. Комбинация активных соединений по одному из пп.1-3, отличающаяся тем, что массовое соотношение соединения (А) и соединения(ний) (С) составляет от 500:1 до 1:500.
5. Комбинация активных соединений по одному из пп.1-4, отличающаяся тем, что присутствует точно 1 соединение (С).

