

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(21) **202391490** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки  
**2024.08.30**

(22) Дата подачи заявки  
**2017.12.19**

(51) Int. Cl. *C07K 16/28* (2006.01)  
*A61K 39/395* (2006.01)  
*C12N 15/13* (2006.01)  
*C12N 15/63* (2006.01)  
*C12N 5/10* (2006.01)  
*C12P 21/08* (2006.01)  
*A61P 37/06* (2006.01)

---

(54) **КОНЬЮГАТЫ АНТИТЕЛА И ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТЕЛОВЫХ КЛЕТОК**

---

(31) **62/437,622; 62/520,854**

(32) **2016.12.21; 2017.06.16**

(33) **US**

(62) **201991526; 2017.12.19**

(71) Заявитель:  
**НОВАРТИС АГ (СН)**

(72) Изобретатель:

**Вэнь Бэнь, Боитано Энтони Э., Бургер Мэттью, Селлитти Сюзан Э., Кук Майкл П. (US), Финнер Катрин (DE), Гайерштангер Бернхард Хуберт, Дзин Юнхо, Ли-Хифлич Сы Туен, Фам Хонггюк Тхи, Шлейер Сью Хо (US), Тиссот Катрин (DE), Уно Тецуо (US)**

(74) Представитель:

**Медведев В.Н. (RU)**

---

(57) В настоящем изобретении предусмотрены конъюгаты антитела и лекарственного средства, где антитело или фрагмент антитела, которые специфически связываются с сКІТ человека, соединены с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство, необязательно через линкер. В настоящем изобретении дополнительно предусмотрены фармацевтические композиции, содержащие конъюгаты антитела и лекарственного средства; а также способы изготовления и применения таких фармацевтических композиций для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом.

**A1**

**202391490**

**202391490**

**A1**

**КОНЪЮГАТЫ АНТИТЕЛА И ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК**

**ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ**

Данная заявка испрашивает приоритет на основании предварительной заявки на патент США № 62/437622, поданной 21 декабря 2016 года, и предварительной заявки на патент США № 62/520854, поданной 16 июня 2017 года, содержание которых тем самым включено посредством ссылки во всей своей полноте.

**ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ**

Настоящее изобретение направлено на конъюгаты антитела к cKIT и лекарственного средства и пути их применения для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ**

Настоящая заявка содержит перечень последовательностей, который был подан в электронном виде в формате ASCII и тем самым включен посредством ссылки во всей своей полноте. Указанная ASCII-копия, созданная 14 декабря 2017 года, имеет название PAT057400-WO-PC1\_SL.txt и размер 209938 байт.

**ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ**

cKIT (CD117) представляет собой одиночную трансмембранную рецепторную тирозинкиназу, которая связывается с лигандом, фактором роста стволовых клеток (SCF). SCF индуцирует гомодимеризацию cKIT, что активирует ее тирозинкиназную активность и приводит к передаче сигналов через пути как PI3-AKT, так и MAPK (Kindblom et al., Am J. Path. 1998 152(5):1259). cKIT первоначально была открыта в качестве онкогена в виде усеченной формы, экспрессируемой ретровирусом кошек (Besmer et al., Nature 1986 320:415-421). Клонирование соответствующего человеческого гена показало, что cKIT является представителем класса рецепторных тирозинкиназ III типа, в состав которого входят такие представители семейства, как FLT3, рецептор CSF-1 и рецептор PDGF. cKIT необходима для развития гемопоэтических клеток, гоноцитов, мастоцитов и меланоцитов. Гемопоэтические клетки-предшественники, например гемопоэтические стволовые клетки (HSC), в костном мозге экспрессируют cKIT на высоком уровне на поверхности клеток. Кроме того, cKIT экспрессируют мастоциты, меланоциты в коже и интерстициальные клетки Кахала в желудочно-кишечном тракте.

Гемопоэтические стволовые клетки (HSC) способны восстанавливать все клеточные элементы крови и иммунные клетки у реципиента трансплантации и, следовательно, обладают огромным терапевтическим потенциалом. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток широко применяется в качестве видов терапии при лейкозе, лимфоме и других заболеваниях, представляющих угрозу для жизни. Однако с такой трансплантацией ассоциировано множество рисков, в том числе плохое приживление, иммунологическое отторжение, реакция "трансплантат против хозяина" (GVHD) или инфекция. Чтобы предотвратить иммунологическое отторжение трансплантата при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, обычно необходимо кондиционирование реципиента с помощью видов циторедуктивного лечения. Современные схемы кондиционирования зачастую настолько токсичны для хозяина, что они противопоказаны большим группам пациентов, которые нуждаются в трансплантации, и/или не могут обеспечиваться в достаточных количествах, чтобы предотвратить реакцию "трансплантат против хозяина". Таким образом, существует необходимость в улучшении способов кондиционирования и трансплантации, а также уменьшении рисков, ассоциированных с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток, и повышении ее эффективности при различных нарушениях.

#### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящем изобретении предусмотрены конъюгаты антитела и лекарственного средства, где антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, соединены с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Такие конъюгаты антитела и лекарственного средства могут селективно доставлять цитотоксическое средство к клеткам, экспрессирующим cKIT, например, гемопоэтическим стволовым клеткам, тем самым селективно разрушая эти клетки у пациента, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Предпочтительно конъюгаты антитела к cKIT и лекарственного средства обладают такими фармакокинетическими свойствами, что они не будут присутствовать и/или не будут активны в кровяном русле пациента в течение длительного времени, поэтому их можно применять для кондиционирования реципиентов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток перед трансплантацией гемопоэтических стволовых

клеток. В некоторых вариантах осуществления в данном документе предусмотрены конъюгаты, содержащие фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT, соединенный с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что полноразмерные антитела к cKIT (например, полноразмерные IgG), их фрагменты F(ab')<sub>2</sub> и конъюгаты с токсинами вызывают дегрануляцию мастоцитов, а конъюгаты Fab' или Fab к cKIT и токсина не вызывают дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, как можно было бы наблюдать в случае, когда у пациента выработались или имелись предсуществующие антитела к лекарственному средству, распознающие фрагменты Fab. В настоящем изобретении дополнительно предусмотрены фармацевтические композиции, содержащие конъюгаты антитела и лекарственного средства, и способы изготовления и применения таких фармацевтических композиций для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

В одном аспекте настоящее изобретение направлено на конъюгат формулы (I):

A-(LB-(D)<sub>n</sub>)<sub>y</sub> Формула (I);

где:


A представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с cKIT человека;

L<sub>B</sub> представляет собой линкер;

D представляет собой цитотоксическое средство;


n составляет целое число от 1 до 10, а y составляет целое число от 1 до 10.

В одном аспекте настоящее изобретение направлено на конъюгат, имеющий структуру формулы (C):



где A, L<sub>20</sub>, y и R<sup>2</sup> являются такими, как определено в данном документе.


В одном аспекте настоящее изобретение направлено на конъюгат, имеющий структуру формулы (D):



Формула (D),

где A, L<sub>30</sub>, y, R<sup>1</sup> и R<sup>2</sup>, являются такими, как определено в данном документе.

В одном аспекте настоящее изобретение направлено на конъюгат, имеющий структуру формулы (E):



Формула (E),

где A, L<sub>40</sub>, y, X, R<sup>5</sup> и R<sup>6</sup>, являются такими, как определено в данном документе.

В другом аспекте в данном документе предусмотрены антитела и фрагменты антител (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека. Такие антитела и фрагменты антител (например, Fab или Fab') к cKIT можно применять в любом из конъюгатов, описанных в данном документе.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, представляют собой антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с внеклеточным доменом cKIT человека (SEQ ID NO: 112).

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, представляют собой антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически

связываются с эпитопом в доменах 1-3 сКИТ человека (SEQ ID NO: 113).

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, представляют собой антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), описанные в таблице 1.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 1, HCDR2 под SEQ ID NO: 2; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 4, HCDR2 под SEQ ID NO: 5; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 19; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 21.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 6, HCDR2 под SEQ ID NO: 2; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 7, HCDR2 под SEQ ID NO: 8; HCDR3 под SEQ ID NO: 9; LCDR1 под SEQ ID NO: 22; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 27, HCDR2 под SEQ ID NO: 28; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ ID NO: 42; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 30, HCDR2 под SEQ ID NO: 31; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ ID NO: 44; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 45.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКИТ человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 32, HCDR2 под SEQ ID NO: 28; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ

ID NO: 42; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 33, HCDR2 под SEQ ID NO: 34; HCDR3 под SEQ ID NO: 35; LCDR1 под SEQ ID NO: 46; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 1, HCDR2 под SEQ ID NO: 51; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 4, HCDR2 под SEQ ID NO: 52; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 19; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 21.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 6, HCDR2 под SEQ ID NO: 51; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 7, HCDR2 под SEQ ID NO: 53; HCDR3 под SEQ ID NO: 9; LCDR1 под SEQ ID NO: 22; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 60, HCDR2 под SEQ ID NO: 61; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ ID NO: 75; LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 63, HCDR2 под SEQ ID NO: 64; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ ID NO: 78; LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и LCDR3 под SEQ ID NO: 80.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 65, HCDR2 под SEQ ID NO: 61; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ

ID NO:75; LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 66, HCDR2 под SEQ ID NO: 67; HCDR3 под SEQ ID NO: 68; LCDR1 под SEQ ID NO: 81; LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 86, HCDR2 под SEQ ID NO: 87; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 101; LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 89, HCDR2 под SEQ ID NO: 90; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 104; LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и LCDR3 под SEQ ID NO: 106.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 91, HCDR2 под SEQ ID NO: 87; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 101; LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 92, HCDR2 под SEQ ID NO: 93; HCDR3 под SEQ ID NO: 94; LCDR1 под SEQ ID NO: 107; LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат переменную область тяжелой цепи (VH), содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 10, и переменную область легкой цепи (VL), содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 23.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 36, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 47.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую

аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 54, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 23.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 69, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 82.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 95, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 108.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 14, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 40, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 58, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 73, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 99, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную



последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 119, 120 или 121, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 125, 126 или 127, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 131, 132 или 133, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 137, 138 или 139, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 142, 143 или 144, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 12, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 38, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 56, и

легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 71, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 97, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В некоторых вариантах осуществления в данном документе предусмотрены конъюгаты, содержащие фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT (Fab или Fab' к cKIT), соединенный с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Fab или Fab' к cKIT могут быть любыми из Fab или Fab', описанных в данном документе, например, любыми из Fab или Fab' в таблице 1. Как описано в данном документе, такие конъюгаты Fab' или Fab к cKIT и токсина могут разрушать человеческие клетки HSC *in vitro* и *in vivo*, но не вызывают дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы.

#### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

**ФИГ. 1** представляет собой линейный график, на котором показано, что все протестированные конъюгаты Fab'-(1) к cKIT и DAR4 (подробности состава конъюгатов см. в таблице 2) уничтожали человеческие стволовые клетки и клетки-предшественники (cKIT<sup>+</sup> / CD90<sup>+</sup> клетки) *in vitro*, показывая примерно одинаковую активность: J3 (квадраты); J2 (треугольники, направленные вверх); J1 (треугольники, направленные вниз). Контрольный ADC, J6 (ромбы), не уничтожал человеческие HSC в сравнении с PBS-контролем (круги).

**ФИГ. 2** представляет собой линейный график, на котором показано, что как конъюгат J4 (квадраты), так и конъюгат J5 (треугольники), связывающие cKIT, приводили к цитолизу мышинных долгосрочных HSC (cKIT<sup>+</sup> клетки). В данном анализе цитолиза мышинных HSC более активным был J5 (треугольники), а не J4 (квадраты). Контрольный ADC, J6 (ромбы), не приводил к цитолизу мышинных HSC в сравнении с PBS-контролем (круги).

**ФИГ. 3А–3L** представляют собой линейные графики, на которых показаны типичные результаты *in vitro* анализов дегрануляции человеческих мастоцитов, в которых применяли человеческие мастоциты, полученные из HSC периферической крови, и высвобождение бета-гексозаминидазы в качестве регистрируемой величины (оцениваемой по поглощению при 405 нм с вычитанием исходного уровня, основанного на эталонном поглощении при 620 нм). Данные, показанные здесь, собирали в отсутствие SCF. **ФИГ. 3А** представляет собой линейный график, на котором показано титрование либо конъюгатов Fab'-(1) к cKIT и DAR4 (закрашенные символы, сплошные линии), либо полноразмерных антител к cKIT (незакрашенные символы, пунктирные линии) в виде различных клонов, связывающих cKIT: Ab4/Fab'4 к cKIT (круги), Ab3/Fab'3 к cKIT (квадраты), Ab2/Fab'2 к cKIT (треугольники, направленные вверх), Ab1/Fab'1 к cKIT (треугольники, направленные вниз), и контрольных Ab/Fab' к Her2 (ромбы). **ФИГ. 3В** представляет собой линейный график, на котором показано титрование антитела к IgE, в качестве положительного контроля дегрануляции мастоцитов. Дегрануляцию мастоцитов наблюдали при всех протестированных концентрациях антитела к IgE. **ФИГ. 3С–3J** представляют собой линейные графики, на которых показан уровень дегрануляции мастоцитов, запускаемой конъюгатами Fab'-(1) к cKIT и DAR4 (описаны в таблице 2) или контрольными Ab к cKIT, представляющими собой полноразмерные IgG (описаны в таблице 8), при различных концентрациях: отсутствии (незакрашенные ромбы и пунктирные линии); 0,006 нМ (треугольники); 0,098 нМ (ромбы); 1,56 нМ (круги) и 25 нМ (квадраты), когда тестируемые средства были сшиты с применением антитела, специфического в отношении части Fab на антителах-тестируемых средствах (титр нанесен на ось x). **На ФИГ. 3С и 3D** показано, что дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием конъюгата J4 при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 3С), в то время как полноразмерное Ab4 к cKIT, будучи сшитым, вызывало дегрануляцию мастоцитов (ФИГ. 3D). **На ФИГ. 3Е и 3F** показано, что дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием конъюгата J1 при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 3Е), в то время как полноразмерное Ab1 к cKIT, будучи сшитым, вызывало дегрануляцию мастоцитов (ФИГ. 3F). **На ФИГ. 3G и 3H** показано, что дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием конъюгата J2 при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 3G), в то время как полноразмерное Ab2 к cKIT, будучи сшитым, вызывало дегрануляцию мастоцитов (ФИГ. 3H). **На ФИГ. 3I и 3J** показано, что дегрануляция

мастоцитов не запускалась под действием конъюгата J3 при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 3I), в то время как полноразмерное Ab3 к cKIT, будучи шитым, вызывало дегрануляцию мастоцитов (ФИГ. 3J). ФИГ. 3K и 3L представляют собой линейные графики, на которых показано, что контрольный конъюгат J6 (ФИГ. 3K) или полноразмерное антитело к Her2 (ФИГ. 3L), будучи шитыми, не вызывали дегрануляцию мастоцитов.

ФИГ. 4 представляет собой точечную диаграмму, на которой показаны относительные количества человеческих HSC, присутствующих в костном мозге гуманизированных мышей NSG после обработки различными средствами. Конъюгат J7 разрушал человеческие HSC (квадраты) в сравнении с PBS-контролем (круги), в то время как контрольный конъюгат J8 (ромбы) не разрушал человеческие HSC в костном мозге.

ФИГ. 5 представляет собой точечную диаграмму, на которой показаны относительные количества человеческих HSC, присутствующих в костном мозге гуманизированных мышей NSG после обработки различными средствами. Конъюгаты Fab'-(1) к cKIT и DAR4 разрушали человеческие HSC в сравнении с PBS-контролем (круги). Протестированные конъюгаты, связывающие cKIT (описаны в таблице 2), были следующими: J3 (квадраты); J2 (треугольники, направленные вверх); J1 (треугольники, направленные вниз). У контрольных мышей, обработанных с помощью J6 (ромбы), разрушение человеческих HSC в костном мозге не наблюдали.

ФИГ. 6 представляет собой столбчатый график, на котором показаны относительные количества HSC, присутствующих в костном мозге мышей C57Bl/6 после обработки различными средствами. Столбик A=мыши, обработанные конъюгатом J4, столбик B=мыши, обработанные конъюгатом J5, столбик C=мыши, обработанные PBS.

ФИГ. 7A-7I представляют собой линейные графики, на которых показаны типичные результаты *in vitro* анализов дегрануляции человеческих мастоцитов, в которых применяли человеческие мастоциты, полученные из HSC периферической крови, и высвобождение бета-гексозаминидазы в качестве регистрируемой величины (оцениваемой по поглощению при 405 нм с вычитанием исходного уровня, основанного на эталонном поглощении при 620 нм). Данные, показанные здесь, собирали в отсутствие SCF. На линейных графиках показан уровень дегрануляции мастоцитов, запускаемой под действием антител или фрагментов антител при различных концентрациях: 0,006 нМ (треугольники); 0,098 нМ (ромбы); 1,6 нМ (круги) и 25 нМ

(квадраты), когда тестируемые средства были шпиты с применением антитела, специфического в отношении части Fab на антителах-тестируемых средствах (титр нанесен на ось x). На ФИГ. 7А-7С показано, что полноразмерное Ab4 к cKIT (НС-Е152С-С375С) (ФИГ. 7А) и фрагмент F(ab'4)<sub>2</sub> к cKIT (НС-Е152С), конъюгированный с соединением (4) (ФИГ. 7В), будучи шпиты, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab4 (НС-Е152С) при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 7С). На ФИГ. 7D-7F показано, что полноразмерное Ab3 к cKIT (НС-Е152С-С375С) (ФИГ. 7D) и фрагмент F(ab'3)<sub>2</sub> (НС-Е152С), конъюгированный с соединением (5) (ФИГ. 7E), будучи шпиты, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab3 (Е152С), конъюгированного с соединением (4), при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 7F). ФИГ. 7G-7I представляют собой линейные графики, на которых показано, что антитело к Her2 (НС-Е152С-С375С) (ФИГ. 7G), фрагмент F(ab')<sub>2</sub> к Her2 (НС-Е152С), конъюгированный с соединением (4) (ФИГ. 7H), или фрагмент Fab к Her2 (НС-Е152С), конъюгированный с соединением (7) (ФИГ. 7I), будучи шпиты, не вызывали дегрануляцию мастоцитов.

ФИГ. 8А-8О представляют собой линейные графики, на которых показаны типичные результаты *in vitro* анализов дегрануляции человеческих мастоцитов, в которых применяли человеческие мастоциты, полученные из HSC периферической крови, и высвобождение бета-гексозаминидазы в качестве регистрируемой величины (оцениваемой по поглощению при 405 нм с вычитанием исходного уровня, основанного на эталонном поглощении при 620 нм). Данные, показанные здесь, собирали в отсутствие SCF. На линейных графиках показан уровень дегрануляции мастоцитов, запускаемой под действием антител или фрагментов антител при различных концентрациях: 0,006 нМ (треугольники); 0,098 нМ (ромбы); 1,6 нМ (круги) и 25 нМ (квадраты), когда тестируемые средства были шпиты с применением антитела, специфического в отношении части Fab на антителах-тестируемых средствах (титр нанесен на ось x). В качестве эталонного значения на каждый график нанесены результаты для сшивающего антитела отдельно (незакрашенные ромбы, пунктирная линия). На ФИГ. 8А-8С показано, что полноразмерное Ab4 к cKIT (ФИГ. 8А) и фрагмент F(ab'4)<sub>2</sub> к cKIT (ФИГ. 8В), будучи шпиты, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab4 к cKIT (НС-Е152С) при

всех протестированных концентрациях (ФИГ. 8С). На ФИГ. 8D–8F показано, что полноразмерное Ab1 к cKIT (ФИГ. 8D) и фрагмент F(ab'1)<sub>2</sub> к cKIT (ФИГ. 8E), будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab1 к cKIT (НС–E152С) при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 8F). На ФИГ. 8G–8I показано, что полноразмерное Ab2 к cKIT (ФИГ. 8G) и фрагмент F(ab'2)<sub>2</sub> к cKIT (ФИГ. 8H), будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab2 к cKIT (НС–E152С) при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 8I). На ФИГ. 8J–8L показано, что полноразмерное Ab3 к cKIT (ФИГ. 8J) и фрагмент F(ab'3)<sub>2</sub> к cKIT (ФИГ. 8K) вызывали дегрануляцию мастоцитов, будучи сшитыми, при этом отсутствовала дегрануляция мастоцитов, запускаемая фрагментом Fab3 к cKIT (НС–E152С) при всех протестированных концентрациях (ФИГ. 8L). ФИГ. 8M–8O представляют собой линейные графики, на которых показано, что антитело к Her2 (ФИГ. 8M), фрагмент F(ab')<sub>2</sub> к Her2 (ФИГ. 8N) или фрагмент Fab к Her2 (НС–E152С) (ФИГ. 8O), будучи сшитыми, не вызывали дегрануляцию мастоцитов.

ФИГ. 9A–9C представляют собой результаты *in vitro* анализов цитолиза с применением человеческих клеток. Мобилизованные HSC периферической крови культивировали с факторами роста и указанным тестируемым средством в течение 7 дней и жизнеспособность измеряли с помощью проточной цитометрии и подсчета клеток. Тестируемые средства, представляющие собой Fab' к cKIT и DAR4, получали с различными Fab: Fab'1 (ФИГ. 9A), Fab'2 (ФИГ. 9B) или Fab'3 (ФИГ. 9C) к cKIT. Протестированными полезными нагрузками были C1 (незакрашенный квадрат), mс–MMAF (незакрашенный круг), C5 (ромб) или C2 (треугольник). Данные представлены в виде среднего значения со стандартным отклонением, а 3-параметрическую кривую ответа аппроксимировали по трем повторностям, измеренным в одном эксперименте.

ФИГ. 10A–10D представляют собой линейные графики, на которых показана временная динамика формирования химеризма донорских клеток в образцах крови, взятых у подвергнутых трансплантации мышей. Мышам C57BL/6J (n=5 в группе, обрабатываемой антителом к cKIT, или n=2 в группе, обрабатываемой PBS) вводили дозу 10 мг/кг Fab'5 к cKIT–DAR4–C1 (треугольники), 20 мг/кг Fab'5 к cKIT–DAR4–C1 (круги) или PBS (квадраты) в виде инфузии на протяжении семи дней, а затем подвергали трансплантации донорских CD45.1+ клеток

спустя два дня. Двух контрольных животных облучали при 1100 рад (ромбы) за один день до проведения трансплантации. На линейных графиках показан процент донорских клеток (CD45.1+), измеренный в популяции всех клеток (ФИГ. 10А), миелоидных клеток (ФИГ. 10В), В-клеток (ФИГ. 10С) или Т-клеток (ФИГ. 10D), по результатам FACS-анализа образцов крови, взятых в каждый момент времени. Данные представлены в виде среднего значения со стандартной ошибкой.

**ФИГ. 11А–11В** представляют собой столбчатые графики, на которых показан химеризм донорских клеток в образцах крови, взятых у подвергнутых трансплантации мышей. Мышам C57BL/6J (n=5 для группы, обрабатываемой антителом к cKIT, или n=2 для группы, обрабатываемой PBS) вводили дозу 10 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (горизонтальные полосы), 20 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (вертикальные полосы), 40 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (закрашенные), 40 мг/кг Fab'5' к cKIT-DAR4-мс-MMAF (шахматный узор) или PBS (незакрашенные, черная граница) в виде инфузии в течение пяти дней, а затем трансплантировали через один день донорские CD45.1+ клетки. Двух контрольных животных облучали при 1100 рад (заштрихованные) за один день до проведения трансплантации. На графиках показан процент донорских клеток (CD45.1+), измеренный в популяции всех клеток (ФИГ. 11А) или миелоидных клеток (ФИГ. 11В), по результатам FACS-анализа образцов крови, взятых в день 28 (левый столбик для каждой группы) или день 56 (правый столбик для каждой группы) после трансплантации. Данные представлены в виде среднего значения со стандартной ошибкой.

**ФИГ. 12А–12В** представляют собой линейные графики, на которых показана временная динамика формирования химеризма донорских клеток в образцах крови, взятых у подвергнутых трансплантации мышей. Мышей C57BL/6J (n=5 для группы, обрабатываемой средством, связывающимся с cKIT, или n=2 для группы, обрабатываемой PBS) облучали при 300 рад и через три дня или не вводили (квадраты), или вводили дозу 10 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (треугольники) или 20 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (круги) в виде инфузии на протяжении трех дней и затем трансплантировали через два дня донорские CD45.1+ клетки. Дополнительной группе из 5 животных вводили только дозу 10 мг/кг Fab'5 к cKIT-DAR4-C1 (незакрашенные квадраты) в виде инфузии на протяжении трех дней и затем проводили трансплантацию через два дня. Двух контрольных животных облучали при 1100 рад (ромбы) за один день до трансплантации, а двух контрольных животных не подвергали обработке (незакрашенные ромбы) до трансплантации. На

линейных графиках показан процент донорских клеток (CD45.1+), измеренный в популяции всех клеток (ФИГ. 12А) или миелоидных клеток (ФИГ. 12В), по результатам FACS-анализа образцов крови, взятых в каждый момент времени. Данные представлены в виде среднего значения со стандартной ошибкой.

**ФИГ. 13** представляет собой точечную диаграмму, на которой показаны относительные количества человеческих HSC, присутствующих в костном мозге гуманизированных мышей NSG после обработки различными средствами. Конъюгаты Fab' к cKIT и DAR4 разрушали человеческие HSC в сравнении с PBS-контролем (ромбы). Протестированные конъюгаты, связывающие cKIT (описаны в таблице 2), были следующими: JW (круги); JX (квадраты); JY (треугольники, направленные вверх); JZ (треугольники, направленные вниз).

#### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

В настоящем изобретении предусмотрены конъюгаты антитела и лекарственного средства, где антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, соединены с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Такие конъюгаты антитела и лекарственного средства могут селективно доставлять цитотоксическое средство к клеткам, экспрессирующим cKIT, например, гемопоэтическим стволовым клеткам, тем самым селективно разрушая эти клетки у пациента, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Предпочтительно конъюгаты антитела к cKIT и лекарственного средства обладают такими фармакокинетическими свойствами, что они не будут присутствовать и/или не будут активны в кровяном русле пациента в течение длительного времени, поэтому их можно применять для кондиционирования реципиентов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток перед трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. В некоторых вариантах осуществления в данном документе предусмотрены конъюгаты, содержащие фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT, соединенный с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что полноразмерные антитела к cKIT (например, полноразмерные IgG), их фрагменты F(ab')<sub>2</sub> и конъюгаты с токсинами вызывают дегрануляцию мастоцитов, а конъюгаты Fab' или Fab к cKIT и токсина не вызывают

дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, как можно было бы наблюдать в случае, когда у пациента выработались или имелись предсуществующие антитела к лекарственному средству, распознающие фрагменты Fab. В настоящем изобретении дополнительно предусмотрены фармацевтические композиции, содержащие конъюгаты антитела и лекарственного средства, и способы изготовления и применения таких фармацевтических композиций для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

#### **Определения**

Если не указано иное, подразумевается, что следующие термины и фразы, используемые в данном документе, имеют следующие значения.

Термин "алкил" относится к одновалентной насыщенной углеводородной цепи, содержащей указанное число атомов углерода. Например, C<sub>1-6</sub>-алкил относится к алкильной группе, содержащей от 1 до 6 атомов углерода. Алкильная группа может быть прямой или разветвленной. Типичная разветвленная алкильная группа содержит одну, две или три ветви. Примеры алкильных групп включают без ограничения, метил, этил, пропил (н-пропил и изопропил), бутил (н-бутил, изобутил, втор-бутил и трет-бутил), пентил (н-пентил, изопентил и неопентил) и гексил.

Используемый в данном документе термин "антитело" относится к белковой или полипептидной последовательности, происходящей из молекулы иммуноглобулина, которая специфически связывается с антигеном. Антитела могут быть поликлональными или моноклональными, многоцепочечными или одноцепочечными или интактными иммуноглобулинами, и могут происходить из природных источников или из рекомбинантных источников. Встречающееся в природе "антитело" представляет собой гликопротеин, содержащий по меньшей мере две тяжелые (H) цепи и две легкие (L) цепи, соединенные между собой посредством дисульфидных связей. Каждая тяжелая цепь состоит из переменной области тяжелой цепи (сокращенно обозначаемой в данном документе как VH) и константной области тяжелой цепи. Константная область тяжелой цепи состоит из трех доменов, CH1, CH2 и CH3. Каждая легкая цепь состоит из переменной области легкой цепи (сокращенно обозначаемой в данном документе как VL) и константной области легкой цепи. Константная область легкой цепи состоит из одного домена, CL. Области VH и VL

могут быть дополнительно подразделены на области гипервариабельности, называемые определяющими комплементарность областями (CDR), которые чередуются с более консервативными областями, называемыми каркасными областями (FR). Каждая VH и VL состоит из трех CDR и четырех FR, расположенных от amino-конца к карбокси-концу в следующем порядке: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, FR4. Вариабельные области тяжелой и легкой цепей содержат связывающий домен, который взаимодействует с антигеном. Константные области антител могут опосредовать связывание иммуноглобулина с тканями или факторами хозяина, в том числе с различными клетками иммунной системы (например, эффекторными клетками) и первым компонентом (C1q) классической системы комплемента. Антитело может быть моноклональным антителом, человеческим антителом, гуманизированным антителом, антителом верблюдовых или химерным антителом. Антитела могут относиться к любому изотипу (например, IgG, IgE, IgM, IgD, IgA и IgY), классу (например, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1 и IgA2) или подклассу.

"Определяющие комплементарность домены" или "определяющие комплементарность области" ("CDR") взаимозаменяемо относятся к гипервариабельным областям VL и VH. У цепей антитела CDR представляют собой сайт для связывания белка-мишени, который обуславливает специфичность в отношении такого белка-мишени. В каждой человеческой VL или VH имеется по три CDR (CDR1-3, пронумерованные последовательно от N-конца), составляющие приблизительно 15-20% от вариабельных доменов. CDR могут обозначаться согласно области, к которой они принадлежат, и согласно порядку, в котором они расположены. Например, оба "VHCDR1" или "HCDR1" относятся к первой CDR вариабельной области тяжелой цепи. CDR являются структурно комплементарными эпитопу белка-мишени и, таким образом, непосредственно ответственны за специфичность связывания. Остальные отрезки VL или VH, так называемые каркасные области, проявляют меньшую изменчивость аминокислотной последовательности (Kuby, Immunology, 4th ed., Chapter 4. W.H. Freeman & Co., New York, 2000).

Точные границы аминокислотной последовательности указанной CDR могут быть определены с использованием любой из ряда широко известных схем, в том числе описанных в Kabat *et al.* (1991), "Sequences of Proteins of Immunological Interest," 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD (схема нумерации по "Kabat"), Al-Lazikani *et al.*, (1997) JMB 273, 927-

948 (схема нумерации по "Chothia"), а также нумерация ImMunoGenTics (IMGT) (Lefranc, M.-P., *The Immunologist*, 7, 132-136 (1999); Lefranc, M.-P. et al., *Dev. Comp. Immunol.*, 27, 55-77 (2003) (схема нумерации "IMGT"). Например, в случае классических форматов согласно Kabat аминокислотные остатки CDR в домене тяжелой переменной цепи (VH) имеют номера 31-35 (HCDR1), 50-65 (HCDR2) и 95-102 (HCDR3); а аминокислотные остатки CDR в домене легкой переменной цепи (VL) имеют номера 24-34 (LCDR1), 50-56 (LCDR2) и 89-97 (LCDR3). Согласно Chothia аминокислоты CDR в VH имеют номера 26-32 (HCDR1), 52-56 (HCDR2) и 95-102 (HCDR3); а аминокислотные остатки в VL имеют номера 26-32 (LCDR1), 50-52 (LCDR2) и 91-96 (LCDR3). Объединяя определения CDR по Kabat и по Chothia, CDR состоят из аминокислотных остатков 26-35 (HCDR1), 50-65 (HCDR2) и 95-102 (HCDR3) в человеческой VH и аминокислотных остатков 24-34 (LCDR1), 50-56 (LCDR2) и 89-97 (LCDR3) в человеческой VL. Согласно IMGT аминокислотные остатки CDR в VH имеют номера примерно 26-35 (CDR1), 51-57 (CDR2) и 93-102 (CDR3), а аминокислотные остатки CDR в VL имеют номера примерно 27-32 (CDR1), 50-52 (CDR2) и 89-97 (CDR3) (нумерация в соответствии с "Kabat"). Согласно IMGT области CDR антитела можно определять с применением программы IMGT/DomainGap Align.

Как легкая, так и тяжелая цепи подразделяются на области структурной и функциональной гомологии. Термины "константный" и "переменный" применяются в функциональном смысле. В связи с этим следует понимать, что переменные домены из частей как легкой (VL), так и тяжелой (VH) цепей определяют распознавание антигена и специфичность в его отношении. Напротив, константные домены легкой цепи (CL) и тяжелой цепи (CH1, CH2 или CH3 и в некоторых случаях CH4) придают важные биологические свойства, такие как секреция, перемещение через плаценту, связывание с рецептором FcRn, период полувыведения, фармакокинетические свойства и т. п. Принято, что номера доменов константной области увеличиваются по мере их удаления от антигенсвязывающего сайта или amino-конца антитела. N-конец представляет собой переменную область, а на C-конец находится константная область; домены CH3 и CL фактически содержат карбокси-концевые домены тяжелой и легкой цепи, соответственно.

Используемый в данном документе термин "фрагмент антитела" или "антигенсвязывающий фрагмент" относится к одной или нескольким частям антитела, которые сохраняют способность специфически

взаимодействовать (например, посредством связывания, стерического несоответствия, стабилизации/дестабилизации, пространственного распределения) с эпитопом антигена (например, сКІТ). Примеры фрагментов антител включают без ограничения фрагмент Fab, который представляет собой одновалентный фрагмент, состоящий из доменов VL, VH, CL и CH1; фрагмент Fab', который представляет собой одновалентный фрагмент, состоящий из доменов VL, VH, CL, CH1 и шарнирной области; фрагмент F(ab')<sub>2</sub>, который представляет собой двухвалентный фрагмент, содержащий два фрагмента Fab, соединенных дисульфидным мостиком в шарнирной области; полуантитело, которое включает одну тяжелую цепь и одну легкую цепь, соединенные дисульфидным мостиком; одноплечевое антитело, которое содержит фрагмент Fab, присоединенный к области Fc; антитело с удаленным доменом CH<sub>2</sub>, которое содержит два фрагмента Fab, присоединенные к димерам домена CH<sub>3</sub> (см. Glaser, J Biol Chem. 2005; 280(50):41494–503); одноцепочечный Fv (scFv); соединенный дисульфидным мостиком Fv (sdFv); фрагмент Fd, состоящий из доменов VH и CH1; фрагмент Fv, состоящий из доменов VL и VH одноплечевого антитела; фрагмент dAb (Ward et al., Nature 341:544–546, 1989), который состоит из домена VH; и выделенную определяющую комплементарность область (CDR) или другие эпитопсвязывающие фрагменты антитела. Например, фрагмент Fab может содержать аминокислотные остатки 1–222 (нумерация EU) тяжелой цепи антитела; в то время как фрагмент Fab' может содержать аминокислотные остатки 1–236 (нумерация EU) тяжелой цепи антитела. Фрагмент Fab или Fab' антитела может быть получен рекомбинантным путем или посредством ферментативного расщепления исходного антитела. Получаемые рекомбинантным путем Fab или Fab' можно конструировать, чтобы ввести аминокислоты для сайт-специфической конъюгации, такие как цистеины (Junutula, J. R.; et al., Nature biotechnology 2008, 26, 925), пирролин-карбоксилизины (Ou, W. et al., Proc Natl Acad Sci USA 2011;108(26):10437–42) или неприродные аминокислоты (например, Tian, F. et al., Proc Natl Acad Sci USA 2014, 111, 1766, Ахур, J. Y. et al., Proc Natl Acad Sci USA. 2012, 109, 16101. Аналогичным образом можно добавлять мутации или пептидные метки для облегчения конъюгации за счет фосфопантетеинтрансфераз (Grunewald, J. et al., Bioconjugate chemistry 2015, 26, 2554), формилглицинообразующего фермента (Drake, P. M. et al., Bioconjugate chemistry 2014, 25, 1331), транскляминаз (Strop, P. et al., Chemistry & Bioconjugate chemistry 2013, 20, 161), сортазы (Beerli, R. R.; Hell, T.; Merkel,

A. S.; Grawunder, U. *PLoS one* 2015, 10, e0131177) или других стратегий конъюгации с применением ферментов. Кроме того, хотя два домена фрагмента Fv, VL и VH, кодируются отдельными генами, их можно соединить с применением рекомбинантных способов с помощью синтетического линкера, который обеспечивает их получение в виде одной белковой цепи, в которой области VL и VH соединяются попарно с образованием одновалентной молекулы (известной как одноцепочечный Fv ("scFv")); см., например, Bird *et al.*, *Science* 242:423-426, 1988; и Huston *et al.*, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 85:5879-5883, 1988). Предусматривается, что такие одноцепочечные антитела также охватываются термином "антигенсвязывающий фрагмент". Такие антигенсвязывающие фрагменты получают с применением традиционных методик, известных специалистам в данной области техники, и фрагменты подвергают скринингу на применимость таким же способом, что и интактные антитела.

Фрагменты антител или антигенсвязывающие фрагменты также можно вводить в состав однодоменных антител, максител, минител, нанотел, интрател, диател, триател, тетрател, v-NAR и бис-scFv (см., например, Hollinger and Hudson, *Nature Biotechnology* 23:1126-1136, 2005). Антигенсвязывающие фрагменты можно прививать на остовы на основе полипептидов, таких как фибронектин типа III (Fn3) (см. патент США № 6703199, в котором описаны монотела на основе полипептида фибронектина).

Фрагменты антител или антигенсвязывающие фрагменты можно вводить в состав одноцепочечных молекул, содержащих пару тандемных сегментов Fv (VH-CH1-VH-CH1), которые вместе с комплементарными полипептидами легкой цепи образуют пару антигенсвязывающих областей (Zapata *et al.*, *Protein Eng.* 8:1057-1062, 1995; и патент США № 5641870).

Используемый в данном документе термин "моноклональное антитело" или "композиция на основе моноклонального антитела" относится к полипептидам, включающим антитела и антигенсвязывающие фрагменты, которые характеризуются практически идентичной аминокислотной последовательностью или происходят из одного генетического источника. Данный термин также охватывает препараты молекул антител одного молекулярного состава. Композиция на основе моноклонального антитела проявляет одну специфичность и аффинность связывания в отношении конкретного эпитопа.

Используемый в данном документе термин "человеческое антитело" охватывает антитела, имеющие переменные области, в

которых как каркасные области, так и CDR получены из последовательностей, происходящих от человека. Кроме того, если антитело содержит константную область, то константная область также происходит из таких человеческих последовательностей, например, последовательностей зародышевой линии человека, или мутантных версий последовательностей зародышевой линии человека, или антитела, содержащего консенсусные каркасные последовательности, полученные за счет анализа человеческих каркасных последовательностей, например, как описано в Knappik *et al.*, *J. Mol. Biol.* 296:57-86, 2000.

Человеческие антитела по настоящему описанию могут содержать аминокислотные остатки, закодированные в человеческих последовательностях (например, мутации, введенные посредством случайного или сайт-специфического мутагенеза *in vitro* или за счет соматических мутаций *in vivo*, или консервативные замены, которые содействуют стабильности или облегчают изготовление).

Используемый в данном документе термин "распознавать" относится к антителу или его антигенсвязывающему фрагменту, которые отыскивают свой эпитоп и взаимодействуют (например, связываются) с ним, независимо от того является ли эпитоп линейным или конформационным. Термин "эпитоп" относится к сайту на антигене, с которым специфически связываются антитело или антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению. Эпитопы могут быть образованы как смежными аминокислотами, так и несмежными аминокислотами, размещаемыми рядом за счет третичной укладки белка. Эпитопы, образуемые из смежных аминокислот, как правило, сохраняются при воздействии денатурирующих растворителей, в то время как эпитопы, образуемые за счет третичной укладки, как правило, утрачиваются при обработке денатурирующими растворителями. Эпитоп, как правило, содержит по меньшей мере 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или 15 аминокислот в уникальной пространственной конформации. Способы определения пространственной конформации эпитопов включают методики из уровня техники, например, рентгеноструктурную кристаллографию и 2-мерный ядерный магнитный резонанс (см., например, Epitope Mapping Protocols в *Methods in Molecular Biology*, Vol. 66, G. E. Morris, Ed. (1996)). "Паратоп" представляет собой часть антитела, которая распознает эпитоп антигена.

Фраза "специфически связывает" или "селективно связывает", когда она применяется в контексте описания взаимодействия между

антигеном (например, белком) и антителом, фрагментом антитела или связывающим средством, происходящим из антитела, относится к реакции связывания, которая является определяющей для установления присутствия антигена в неоднородной популяции белков и других биологических веществ, например, в биологическом образце, например, крови, сыворотке, плазме или образце ткани. Таким образом, при некоторых обозначенных условиях проведения иммунологического анализа антитела или связывающие средства, характеризующиеся конкретной специфичностью связывания, связываются с конкретным антигеном в по меньшей мере два раза сильнее, чем фоновый уровень, и практически не связываются в значительном количестве с другими антигенами, присутствующими в образце. В одном аспекте при обозначенных условиях иммунологического анализа антитело или связывающее средство с конкретной специфичностью связывания связывается с конкретным антигеном в по меньшей мере десять (10) раз сильнее относительно фонового уровня, и практически не связывается в значительном количестве с другими антигенами, присутствующими в образце. Специфическое связывание с антителом или связывающим средством в таких условиях может предусматривать то, что антитело или средство должно отбираться за его специфичность в отношении конкретного белка. При желании или необходимости данный отбор можно проводить путем отбрасывания антител, которые вступают в перекрестные реакции с молекулами от другого вида (например, мыши или крысы) или других подтипов. В качестве альтернативы в некоторых аспектах отбирают антитела или фрагменты антител, которые вступают в перекрестные реакции с некоторыми требуемыми молекулами.

Используемый в данном документе термин "аффинность" относится к силе взаимодействия между антителом и антигеном в отдельных антигенных сайтах. В пределах каждого антигенного сайта переменная область "плеча" антитела взаимодействует с антигеном посредством слабых нековалентных сил в многочисленных сайтах; чем больше взаимодействий, тем сильнее аффинность.

Термин "выделенное антитело" относится к антителу, которое практически не содержит других антител с отличающейся антигенной специфичностью. Однако выделенное антитело, которое специфически связывается с одним антигеном, может характеризоваться перекрестной реактивностью в отношении других антигенов. Более того, выделенное антитело может практически не содержать другого клеточного материала и/или химических веществ.

Термин "соответствующая последовательность зародышевой линии человека" относится к последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей аминокислотную последовательность или подпоследовательность человеческой варибельной области, которые обладают самой высокой установленной идентичностью аминокислотной последовательности с эталонной аминокислотной последовательностью или подпоследовательностью варибельной области в сравнении со всеми другими известными аминокислотными последовательностями варибельной области, закодированными в последовательностях варибельной области иммуноглобулина зародышевой линии человека. Соответствующая последовательность зародышевой линии человека также может относиться к аминокислотной последовательности или подпоследовательности человеческой варибельной области, характеризующимися самой высокой идентичностью аминокислотной последовательности с эталонной аминокислотной последовательностью или подпоследовательностью варибельной области в сравнении со всеми другими подвергнутыми оценке аминокислотными последовательностями варибельной области. Соответствующей последовательностью зародышевой линии человека могут быть только каркасные области, только определяющие комплементарность области, каркасные и определяющие комплементарность области, варибельный сегмент (как определено выше) или другие комбинации последовательностей или подпоследовательностей, которые содержат варибельную область. Идентичность последовательности может быть определена с применением способов, описанных в данном документе, например, выравнивания двух последовательностей с применением BLAST, ALIGN или другого алгоритма выравнивания, известного из уровня техники. Соответствующая последовательность нуклеиновой кислоты или аминокислотная последовательность зародышевой линии человека может характеризоваться по меньшей мере приблизительно 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, или 100% идентичностью последовательности с эталонной последовательностью нуклеиновой кислоты или аминокислотной последовательностью варибельной области.

Целый ряд форматов иммунологического анализа может применяться для отбора антител, характеризующихся специфической иммунной реактивностью в отношении конкретного белка. Например, твердофазные иммунологические анализы ELISA традиционно применяются для отбора антител, характеризующихся специфической реактивностью в отношении белка (см., например, Harlow & Lane,

Using Antibodies, A Laboratory Manual (1998), где описаны форматы и условия иммунологического анализа, которые можно применять для определения специфической иммунной реактивности). Как правило, реакция специфического или селективного связывания будет приводить к сигналу, в по меньшей мере два раза превышающему фоновый уровень, и, более типично, в по меньшей мере 10–100 раз превышающему фоновый уровень.

Термин "равновесная константа диссоциации ( $KD [M]$ )" относится к константе скорости диссоциации ( $k_d [c^{-1}]$ ), поделенной на константу скорости ассоциации ( $k_a [c^{-1}, M^{-1}]$ ). Равновесные константы диссоциации могут быть измерены с применением любого способа, известного из уровня техники. Обычно антитела по настоящему изобретению будут характеризоваться равновесной константой диссоциации, составляющей менее приблизительно  $10^{-7}$  или  $10^{-8}$  М, например, менее приблизительно  $10^{-9}$  М или  $10^{-10}$  М, в некоторых аспектах менее приблизительно  $10^{-11}$  М,  $10^{-12}$  М или  $10^{-13}$  М.

Термин "биодоступность" относится к системной доступности (т. е. уровням в крови/плазме) заданного количества лекарственного средства, вводимого пациенту. Биодоступность представляет собой абсолютный термин, обозначающий показатель как времени (скорости), в течение которого лекарственное средство достигает общего кровообращения из введенной лекарственной формы, так и общего количества (степени) лекарственного средства в нем.

Используемая в данном документе фраза "состоящий фактически из" относится к родам или видам активных фармацевтических средств, включенных в способ или композицию, а также любым вспомогательным веществам, не проявляющим активность в отношении намеченной цели применения способов или композиций. В некоторых аспектах фраза "состоящий фактически из" однозначно исключает включение одного или нескольких дополнительных активных средств, отличных от конъюгата антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению. В некоторых аспектах фраза "состоящий фактически из" однозначно исключает включение одного или нескольких дополнительных активных средств, отличных от конъюгата антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению и второго средства, вводимого совместно.

Термин "аминокислота" относится к встречающимся в природе, синтетическим и неприродным аминокислотам, а также аналогам аминокислот и миметикам аминокислот, которые функционируют подобно встречающимся в природе аминокислотам. Встречающиеся в природе

аминокислоты представляют собой аминокислоты, закодированные в генетическом коде, а также такие аминокислоты, которые были впоследствии модифицированы, например, гидроксипролин,  $\gamma$ -карбоксиглутамат и O-фосфосерин. Аналоги аминокислот относятся к соединениям, которые характеризуются такой же основной химической структурой, что и встречающаяся в природе аминокислота, то есть имеют  $\alpha$ -углерод, который связан с водородом, карбоксильной группой, аминогруппой и R-группой, например, к гомосерину, норлейцину, метионинсульфоксиду, метионинметилсульфонию. Такие аналоги имеют модифицированные R-группы (например, норлейцин) или модифицированные пептидные остовы, но сохраняют такую же основную химическую структуру, что и встречающаяся в природе аминокислота. Миметики аминокислот относятся к химическим соединениям, которые имеют структуру, отличающуюся от общей химической структуры аминокислоты, но которые функционируют подобно встречающейся в природе аминокислоте.

Термин "консервативно модифицированный вариант" применяется в отношении как аминокислотных последовательностей, так и последовательностей нуклеиновой кислоты. Применительно к конкретным последовательностям нуклеиновой кислоты, консервативно модифицированные варианты относятся к тем нуклеиновым кислотам, которые кодируют идентичные или фактически идентичные аминокислотные последовательности, или же, если нуклеиновая кислота не кодирует аминокислотную последовательность, к фактически идентичным последовательностям. Вследствие вырожденности генетического кода любой заданный белок кодируется большим количеством функционально идентичных нуклеиновых кислот. Например, все из кодонов GCA, GCC, GCG и GCU кодируют аминокислоту аланин. Таким образом, в каждом положении, в котором кодоном задан аланин, кодон может быть изменен на любой из соответствующих описанных кодонов без изменения кодируемого полипептида. Такие вариации нуклеиновой кислоты являются "молчащими вариациями", которые представляют собой одну разновидность вариаций с консервативными модификациями. В данном документе каждая последовательность нуклеиновой кислоты, которая кодирует полипептид, также описывает каждую возможную молчащую вариацию нуклеиновой кислоты. Специалист в данной области будет осознавать, что каждый кодон в нуклеиновой кислоте (за исключением AUG, который обычно является единственным кодоном для метионина, и TGG, который обычно является единственным кодоном для триптофана) может быть

модифицирован с получением функционально идентичной молекулы. Соответственно, каждая молчащая вариация нуклеиновой кислоты, которая кодирует полипептид, неявно определена в каждой описанной последовательности.

В случае полипептидных последовательностей "консервативно модифицированные варианты" охватывают отдельные замены, делеции или добавления в полипептидной последовательности, которые приводят к замене аминокислоты на аналогичную по химическим свойствам аминокислоту. Таблицы консервативных замен, обеспечивающие функционально аналогичные аминокислоты, хорошо известны из уровня техники. Такие консервативно модифицированные варианты дополняют, а не исключают полиморфные варианты, межвидовые гомологи и аллели. Следующие восемь групп содержат аминокислоты, которые являются консервативными заменами друг для друга: 1) аланин (A), глицин (G); 2) аспарагиновая кислота (D), глутаминовая кислота (E); 3) аспарагин (N), глутамин (Q); 4) аргинин (R), лизин (K); 5) изолейцин (I), лейцин (L), метионин (M), валин (V); 6) фенилаланин (F), тирозин (Y), триптофан (W); 7) серин (S), треонин (T); и 8) цистеин (C), метионин (M) (см., например, Creighton, *Proteins* (1984)). В некоторых аспектах термин "консервативные модификации последовательности" используется для обозначения аминокислотных модификаций, которые не оказывают значительного влияния на характеристики связывания у антитела, содержащего аминокислотную последовательность, или не изменяют их.

Используемый в данном документе термин "оптимизированная" относится к нуклеотидной последовательности, кодирующей аминокислотную последовательность, которая была изменена с применением кодонов, предпочтительных в продуцирующей клетке или организме, обычно в эукариотической клетке, например, дрожжевой клетке, клетке *Pichia*, грибной клетке, клетке *Trichoderma*, клетке яичника китайского хомячка (CHO) или человеческой клетке. Оптимизированную нуклеотидную последовательность конструируют таким образом, чтобы полностью или насколько это возможно сохранить аминокислотную последовательность, изначально закодированную в исходной нуклеотидной последовательности, которая также известна как "родительская" последовательность.

Термины "процент идентичности" или "процентная идентичность", в контексте двух или более нуклеиновых кислот или полипептидных последовательностей, относятся к степени, в которой две или более последовательности или подпоследовательности являются

одинаковыми. Две последовательности являются "идентичными", если они имеют одинаковую последовательность из аминокислот или нуклеотидов на протяжении области, подлежащей сравнению. Две последовательности являются "практически идентичными", если две последовательности имеют указанную процентную долю аминокислотных остатков или нуклеотидов, которые являются одинаковыми (т. е. 60% идентичность, необязательно 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% или 99% идентичность на протяжении указанной области или, если не указано, на протяжении всей последовательности), при сравнении и выравнивании для обеспечения максимального соответствия на протяжении окна сравнения или обозначенной области, как измерено с применением одного из следующих алгоритмов сравнения последовательности или посредством ручного выравнивания и визуального просмотра. Необязательно идентичность существует на протяжении области, длина которой составляет по меньшей мере приблизительно 30 нуклеотидов (или 10 аминокислот), или более предпочтительно на протяжении области, длина которой составляет 100–500 или 1000 или более нуклеотидов (или 20, 50, 200 или более аминокислот).

При сравнении последовательностей обычно одна последовательность выступает в качестве эталонной последовательности, с которой сравнивают тестируемые последовательности. При использовании алгоритма сравнения последовательностей тестируемую и эталонную последовательности вводят в компьютер, если необходимо, устанавливают координаты подпоследовательностей и устанавливают программные параметры алгоритма для анализа последовательностей. Могут применяться программные параметры по умолчанию или можно устанавливать альтернативные параметры. На основании программных параметров алгоритм сравнения последовательностей затем рассчитывает значения процента идентичности последовательностей для тестируемых последовательностей относительно эталонной последовательности.

Используемое в данном документе "окно сравнения" предусматривает ссылку на сегмент из любого количества смежных положений, выбранных из группы, состоящей из от 20 до 600, обычно от приблизительно 50 до приблизительно 200, чаще от приблизительно 100 до приблизительно 150, в котором последовательность можно сравнивать с эталонной последовательностью с таким же количеством смежных положений, после того как две последовательности подвергли оптимальному выравниванию. Способы выравнивания

последовательностей для проведения сравнения хорошо известны из уровня техники. Оптимальное выравнивание последовательностей для сравнения можно проводить, например, с помощью алгоритма поиска локальной гомологии Смита-Уотермана, *Adv. Appl. Math.* 2:482с (1970), с помощью алгоритма выравнивания областей гомологии Нидлмана-Вунша, *J. Mol. Biol.* 48:443 (1970), с помощью способа поиска сходства Пирсона-Липмана, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 85:2444 (1988), с помощью компьютерных реализаций таких алгоритмов (GAP, BESTFIT, FASTA и TFASTA в составе пакета программного обеспечения Wisconsin Genetics, Genetics Computer Group, 575 Science Dr., Мэдисон, Висконсин) или с помощью ручного выравнивания и визуального просмотра (см., например, Brent *et al.*, *Current Protocols in Molecular Biology*, 2003).

Два примера алгоритмов, которые подходят для определения процента идентичности последовательностей и сходства последовательностей, представляют собой алгоритмы BLAST и BLAST 2.0, которые описаны в Altschul *et al.*, *Nuc. Acids Res.* 25:3389-3402, 1977; и Altschul *et al.*, *J. Mol. Biol.* 215:403-410, 1990, соответственно. Программное обеспечение для осуществления анализов BLAST является общедоступным от Национального центра биотехнологической информации. На первом этапе данный алгоритм предусматривает идентификацию пар последовательностей с высоким показателем сходства (HSP) за счет идентификации коротких слов длиной  $W$  в запрашиваемой последовательности, которые либо совпадают, либо удовлетворяют некоторому пороговому баллу  $T$  с положительным значением при выравнивании со словом такой же длины в последовательности из базы данных.  $T$  известен под названием пороговый балл соседних слов (Altschul *et al.*, выше). Эти первоначальные совпадения соседних слов выступают в качестве "затравок" для начала поисков, чтобы найти более длинные HSP, содержащие их. Совпадения слов продлеваются в обоих направлениях вдоль каждой последовательности до тех пор, пока может увеличиваться суммарный балл выравнивания. Суммарные баллы рассчитывают с применением, в случае нуклеотидных последовательностей, параметров  $M$  (вознаграждающий балл за пару совпадающих остатков; всегда  $>0$ ) и  $N$  (штрафной балл за несовпадающие остатки; всегда  $<0$ ). В случае аминокислотных последовательностей для подсчета суммарного балла применяют матрицу замен. Продление совпадений слов в каждом направлении останавливается, когда суммарный балл выравнивания уменьшается на

величину  $X$  относительно своего максимального достигнутого значения; суммарный балл стремится к нулю или ниже вследствие накопления одного или нескольких выравниваний остатков с отрицательными баллами; или достигается конец любой из последовательностей. Параметры  $W$ ,  $T$  и  $X$  алгоритма BLAST определяют чувствительность и скорость выравнивания. В программе BLASTN (для нуклеотидных последовательностей) в качестве параметров по умолчанию применяется длина слова ( $W$ ), составляющая 11, ожидание ( $E$ ), составляющее 10,  $M=5$ ,  $N=-4$  и сравнение обеих нитей. В случае аминокислотных последовательностей в программе BLASTP в качестве параметров по умолчанию применяется длина слова, составляющая 3, и ожидание ( $E$ ), составляющее 10, и матрица замен BLOSUM62 (см. Henikoff and Henikoff (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:10915), выравнивания ( $B$ ), составляющие 50, ожидание ( $E$ ), составляющее 10,  $M=5$ ,  $N=-4$  и сравнение обеих нитей.

Алгоритм BLAST также осуществляет статистический анализ сходства между двумя последовательностями (см., например, Karlin and Altschul, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:5873–5787, 1993). Одной мерой сходства, предусмотренной в алгоритме BLAST, является наименьшая суммарная вероятность ( $P(N)$ ), которая указывает на вероятность, с которой совпадение между двумя нуклеотидными или аминокислотными последовательностями возникло случайно. Например, нуклеиновая кислота считается схожей с эталонной последовательностью, если наименьшая суммарная вероятность при сравнении тестируемой нуклеиновой кислоты с эталонной нуклеиновой кислотой составляет менее приблизительно 0,2, более предпочтительно менее приблизительно 0,01 и наиболее предпочтительно менее приблизительно 0,001.

Процентную идентичность между двумя аминокислотными последовательностями также можно определить с использованием алгоритма из E. Meyers and W. Miller (Comput. Appl. Biosci. 4:11–17, (1988) который был включен в программу ALIGN (версия 2.0), с применением таблицы весов замен остатков PAM120, штрафа за продление гэпа, составляющего 12, и штрафа за открытие гэпа, составляющего 4. Кроме того, процентная идентичность между двумя аминокислотными последовательностями может быть определена с применением алгоритма Нидлмана–Вунша, J. Mol. Biol. 48:444–453, (1970), который был включен в программу GAP в составе пакета программного обеспечения GCG (доступного на [www.gcg.com](http://www.gcg.com)), с применением либо матрицы Blossum 62, либо матрицы PAM250, и также

штрафа за открытие гэпа, составляющего 16, 14, 12, 10, 8, 6 или 4, и штрафа за продление гэпа, составляющего 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Помимо процента идентичности последовательностей, упомянутого выше, еще одним показателем того, что две последовательности нуклеиновой кислоты или полипептида являются практически идентичными, является то, что полипептид, кодируемый первой нуклеиновой кислотой, является иммунологически перекрестно реактивным с антителами, выработка которых индуцирована полипептидом, кодируемым второй нуклеиновой кислотой, как описано ниже. Таким образом, полипептид, как правило, является практически идентичным второму полипептиду, например, если два пептида отличаются только консервативными заменами. Другим показателем того, что две последовательности нуклеиновой кислоты являются практически идентичными, является то, что две молекулы или их комплементарные цепи гибридизируются друг с другом в жестких условиях, как описано ниже. Еще одним показателем того, что две последовательности нуклеиновой кислоты являются практически идентичными, является то, что для амплификации последовательности могут применяться одни и те же праймеры.

Термин "нуклеиновая кислота" используется в данном документе взаимозаменяемо с термином "полинуклеотид" и относится к дезоксирибонуклеотидам или рибонуклеотидам и полимерам на их основе в одно- или двухнитевой форме. Термин охватывает нуклеиновые кислоты, содержащие известные аналоги нуклеотидов или модифицированные остатки или связи в остове, которые являются синтетическими, встречающимися в природе и не встречающимися в природе, которые характеризуются свойствами связывания, подобными эталонной нуклеиновой кислоте, и которые метаболизируются подобно эталонным нуклеотидам. Примеры таких аналогов включают без ограничения фосфоротиааты, фосфорамидаты, метилфосфонаты, хиральные метилфосфонаты, 2-О-метилрибонуклеотиды, пептидонуклеиновые кислоты (PNA).

Если не указано иное, конкретная последовательность нуклеиновой кислоты также в неявном виде охватывает ее консервативно модифицированные варианты (например, замены на основе вырожденных кодонов) и комплементарные последовательности, а также последовательность, указанную явным образом. А именно, как подробно описано ниже, замены на основе вырожденных кодонов можно проводить за счет создания последовательностей, в которых третье положение в одном или нескольких выбранных (или всех) кодонах

заменено на любой из канонических нуклеозидов и/или остаток дезоксиинозина (Batzer *et al.*, *Nucleic Acid Res.* 19:5081, 1991; Ohtsuka *et al.*, *J. Biol. Chem.* 260:2605–2608, 1985; и Rossolini *et al.*, *Mol. Cell. Probes* 8:91–98, 1994).

В контексте нуклеиновых кислот термин "функционально связанный" относится к функциональной взаимосвязи двух или более сегментов полинуклеотида (например, ДНК). Как правило, он относится к функциональной взаимосвязи регулирующей транскрипцию последовательности с транскрибируемой последовательностью. Например, промоторная или энхансерная последовательность является функционально связанной с кодирующей последовательностью, если она стимулирует или модулирует транскрипцию кодирующей последовательности в соответствующей клетке-хозяине или другой системе экспрессии. Обычно регулирующие транскрипцию промоторные последовательности, которые являются функционально связанными с транскрибируемой последовательностью, являются физически смежными с транскрибируемой последовательностью, т. е. они функционируют в цис-положении. Однако некоторые регулирующие транскрипцию последовательности, такие как энхансеры, не обязательно должны быть физически смежными или располагаться в непосредственной близости от кодирующих последовательностей, транскрипцию которых они усиливают.

Термины "полипептид" и "белок" используются в данном документе взаимозаменяемо для обозначения полимера из аминокислотных остатков. Термины применимы к полимерам из аминокислот, в которых один или несколько аминокислотных остатков представляют собой искусственный химический миметик соответствующей встречающейся в природе аминокислоты, а также к полимерам из встречающихся в природе аминокислот и полимеру из не встречающихся в природе аминокислот. Если не указано иное, конкретная полипептидная последовательность также в неявном виде охватывает ее консервативно модифицированные варианты.

Используемый в данном документе термин "конъюгат" или "конъюгат антитела и лекарственного средства" относится к связи антитела или его антигенсвязывающего фрагмента с другим средством, таким как химиотерапевтическое средство, токсин, иммунотерапевтическое средство, зонд для визуализации и т. п. Связь может представлять собой ковалентные связи или нековалентные взаимодействия, такие как посредством электростатических сил. Для образования конъюгата могут использоваться различные линкеры,

известные из уровня техники. Кроме того, конъюгат может предусматриваться в форме слитого белка, который может экспрессироваться с полинуклеотида, кодирующего конъюгат. Используемый в данном документе "слитый белок" относится к белкам, созданным за счет соединения двух или более генов или фрагментов генов, которые изначально кодировали отдельные белки (в том числе пептиды и полипептиды). Трансляция слитого гена приводит к единому белку с функциональными свойствами, происходящими из каждого из исходных белков.

Термин "субъект" охватывает человека и отличных от человека животных. Отличные от человека животные охватывают всех позвоночных, например, млекопитающих и отличных от млекопитающих животных, как, например, отличных от человека приматов, овцу, собаку, корову, кур, амфибий и рептилий. За исключением случаев, когда это отмечается, термины "пациент" или "субъект" используются в данном документе взаимозаменяемо.

Используемый в данном документе термин "токсин", "цитотоксин" или "цитотоксическое средство" относится к любому средству, которое является вредным для роста и пролиферации клеток и которое может функционировать с уменьшением, ингибированием или разрушением клетки или злокачественной опухоли.

Используемый в данном документе термин "противораковое средство" относится к любому средству, которое может использоваться для лечения нарушения пролиферации клеток, такого как рак, в том числе без ограничения к цитотоксическим средствам, химиотерапевтическим средствам, лучевой терапии и средствам для лучевой терапии, нацеливающим противораковым средствам и иммунотерапевтическим средствам.

Используемый в данном документе термин "фрагмент, представляющий собой лекарственное средство" или "полезная нагрузка" относится к химическому фрагменту, который конъюгирован с антителом или антигенсвязывающим фрагментом, и может охватывать любое терапевтическое или диагностическое средство, например, противораковое, противовоспалительное, противомикробное (например, противогрибковое, антибактериальное, антипаразитарное, противовирусное) или анестетическое средство. В определенных аспектах фрагмент, представляющий собой лекарственное средство, выбран из ингибитора Eg5, ингибитора V-ATФазы, ингибитора HSP90, ингибитора IAP, ингибитора mTor, стабилизатора микротрубочек, дестабилизатора микротрубочек, ауристатина, доластатина,

майтанзиноида, MetAP (метионинаминопептидаза), ингибитора ядерного экспорта белков CRM1, ингибитора DPPIV, ингибитора реакций переноса фосфорила в митохондриях, ингибитора синтеза белков, ингибитора киназ, ингибитора CDK2, ингибитора CDK9, ингибитора протеасом, ингибитора кинезина, ингибитора HDAC, ДНК-повреждающего средства, ДНК-алкилирующего средства, ДНК-интеркалятора, средства, связывающего малую бороздку ДНК, ингибитора РНК-полимеразы, аманитина, ингибитора сплайсосомы, ингибитора топоизомеразы и ингибитора DHFR. Способы прикрепления каждого из них к линкеру, совместимому с антителами и способом по настоящему изобретению, известны из уровня техники. См., например, Singh et al., (2009) *Therapeutic Antibodies: Methods and Protocols*, vol. 525, 445-457. Кроме того, полезная нагрузка может представлять собой зонд для биофизического обнаружения, флуорофор, спиновую метку, зонд для инфракрасного обнаружения, зонд для обнаружения аффинности, хелатор, зонд для спектроскопического обнаружения, радиоактивный зонд, липидную молекулу, полиэтиленгликоль, полимер, спиновую метку, ДНК, РНК, белок, пептид, поверхность, антитело, фрагмент антитела, наночастицу, квантовую точку, липосому, частицу PLGA, сахарид или полисахарид.

Термин "рак" охватывает первичные злокачественные опухоли (например, опухоли, клетки которых не мигрировали в локализации в организме субъекта, отличные от локализации исходной опухоли) и вторичные злокачественные опухоли (например, опухоли, развившиеся за счет метастазирования, миграции опухолевых клеток во вторичные локализации, которые отличны от локализации исходной опухоли).

Термин "сKIT" (также известный как KIT, PBT, SCFR, C-Kit, CD117) относится к тирозинкиназному рецептору, который является представителем семейства III рецепторных тирозинкиназ. Последовательности нуклеиновой кислоты и аминокислотные последовательности изоформ сKIT человека известны и были опубликованы в GenBank под следующими №№ доступа:

NM\_000222.2 → NP\_000213.1 предшественник изоформы 1 рецептора Kit фактора роста мастоцитов/стволовых клеток;

NM\_001093772.1 → NP\_001087241.1 предшественник изоформы 2 рецептора Kit фактора роста мастоцитов/стволовых клеток.

По своей структуре рецептор сKIT представляет собой трансмембранный белок I типа, и он содержит сигнальный пептид, 5 Ig-подобных доменов C2 во внеклеточном домене и имеет протеинкиназный домен в своем внутриклеточном домене. Используемый

в данном документе термин "сKIT" применяют для совместного обозначения всех встречающихся в природе изоформ белка сKIT или его вариантов.

Термин "вариант" относится к полипептиду, который имеет практически идентичную аминокислотную последовательность с эталонным полипептидом, или кодируется практически идентичной нуклеотидной последовательностью и может характеризоваться одной или несколькими активностями эталонного полипептида. Например, вариант может характеризоваться приблизительно 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% или более высокой идентичностью последовательности с эталонным полипептидом, при этом он сохраняет одну или несколько активностей эталонного полипептида.


Используемые в данном документе термины "лечить", "осуществление лечения" или "лечение" любого заболевания или нарушения в одном аспекте относится к уменьшению тяжести заболевания или нарушения (т. е. замедлению, или остановке, или снижению развития заболевания или по меньшей мере одного из его клинических симптомов). В другом аспекте "лечить", "осуществление лечения" или "лечение" относятся к облегчению или уменьшению тяжести по меньшей мере одного физического параметра, в том числе таких, которые могут быть не очевидными для пациента. В еще одном аспекте "лечить", "осуществление лечения" или "лечение" относятся к модулированию заболевания или нарушения либо физическому (например, стабилизации очевидного симптома), либо физиологическому (например, стабилизации физического параметра), либо обоим. В еще одном аспекте "лечить", "осуществление лечения" или "лечение" относятся к предотвращению или отсрочке проявления, или развития, или прогрессирования заболевания или нарушения.

Термин "терапевтически приемлемое количество" или "терапевтически эффективная доза" взаимозаменяемо относится к количеству, достаточному для произведения требуемого результата (т. е. уменьшения размера опухоли, ингибирования роста опухоли, предотвращения метастазирования, ингибирования или предотвращения вирусной, бактериальной, грибковой или паразитарной инфекции). В некоторых аспектах терапевтически приемлемое количество не индуцирует или не вызывает нежелательные побочные эффекты. Терапевтически приемлемое количество можно определять, вводя вначале низкую дозу, а затем постепенно увеличивая данную дозу до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект. "Терапевтически эффективная доза" молекул по настоящему изобретению может


предотвращать проявление или, соответственно, приводить к уменьшению тяжести симптомов заболевания, в том числе симптомов, ассоциированных с раком.

Термин "совместное введение" относится к одновременному присутствию двух активных средств в крови индивидуума. Активные средства, которые вводятся совместно, могут доставляться одновременно или последовательно.

Используемый в данном документе термин 'тиол-малеимид' относится к группе, образуемой за счет реакции тиола с малеимидом, имеющей такую общую формулу:



где Y и Z представляют собой группы, подлежащие соединению с помощью тиол-малеимидной связи, и они могут предусматривать линкерные компоненты, антитела или полезные нагрузки. Тиол-малеимид может формировать следующие структуры с открытым кольцом



Используемый в данном документе "расщепляемый" относится к связывающей группе или линкерному компоненту, которые соединяют два фрагмента за счет ковалентных связей, но распадаются с разрывом ковалентной связи между фрагментами при физиологически соответствующих условиях, как правило расщепляемая связывающая группа разрывается *in vivo* быстрее во внутриклеточной среде, чем при нахождении вне клетки, что вызывает предпочтительное высвобождение полезной нагрузки внутри целевой клетки. Расщепление может быть ферментативным или неферментативным, но обычно приводит к высвобождению полезной нагрузки из антитела без разрушения антитела. При расщеплении некоторая часть связывающей группы или линкерного компонента может оставаться присоединенной к полезной нагрузке, или высвобождение полезной нагрузки может происходить без какого-либо остатка связывающей группы.

Используемый в данном документе "нерасщепляемый" относится к связывающей группе или линкерному компоненту, которые практически

не подвергаются распадению при физиологических условиях, например, они устойчивы по меньшей мере в такой же степени, что и часть конъюгата, представляющая собой антитело или антигенсвязывающий фрагмент. Такие связывающие группы иногда называют 'устойчивыми', это означает, что они в достаточной степени устойчивы к разрушению, чтобы удержать полезную нагрузку, присоединенной к антителу или антигенсвязывающему фрагменту до тех пор, пока антитело или антигенсвязывающий фрагмент сами по себе по меньшей мере частично не разрушатся, т. е. разрушение антитела или антигенсвязывающего фрагмента предшествует расщеплению связывающей группы *in vivo*. При разрушении части, представляющей собой антитело, у ADC с устойчивой или нерасщепляемой связывающей группой часть или вся связывающая группа, например, одна или несколько аминокислотных групп из антитела, могут оставаться присоединенными к полезной нагрузке или фрагменту, представляющему собой лекарственное средство, которые доставляются *in vivo*.

**Фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство (L<sub>B</sub>- (D)<sub>n</sub>)**

В одном аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру (L<sub>B</sub>), где один или несколько цитотоксинов независимо выбраны из ауристатина, аманитина, майтанзиноида и сапорина.

В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру (L<sub>B</sub>), где один или несколько цитотоксинов независимо выбраны ауристатина и аманитина.

В одном аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру (L<sub>B</sub>), где линкер (L<sub>B</sub>) представляет собой расщепляемый линкер, а один или несколько цитотоксинов независимо выбраны из ауристатина, аманитина, майтанзиноида и сапорина.


В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру (L<sub>B</sub>), где линкер (L<sub>B</sub>) представляет собой расщепляемый линкер, а один или несколько цитотоксинов независимо выбраны из ауристатина и аманитина.

В одном аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру ( $L_B$ ), где линкер ( $L_B$ ) представляет собой нерасщепляемый линкер, а один или несколько цитотоксинов независимо выбраны из ауристатиона, аманитина, майтанзиноида и сапорина.

В другом аспекте фрагмент, представляющий собой лекарственное средство (D), представляет собой белковый токсин, выбранный из сапорина, противовирусного белка лаконоса (PAP), бриодина 1, буганина, гелонина, рицина, абрина, лектина омелы, модекцина, волкенсина, аспарина, момордина, эбулина, вискумина, шигатоксина, дифтерийного токсина (DT) или экзотоксина *Pseudomonas* (PE). Такие белковые токсины способны приводить к цитолизу клеток за счет инактивации рибосомы или ингибирования синтеза белков путем нарушения функции фактора элонгации 2 (EF2) (см. Kreitman et al., Immunotoxins for targeted cancer therapy, The AAPS Journal 2006; 8 (3) Article 63; Gadadhar and Karande, Targeted Cancer Therapy: History and Development of Immunotoxins, Глава 1 в Resistance to Immunotoxins in Cancer Therapy, pp 1-31). В некоторых вариантах осуществления белковый токсин представляет собой сапорин. Такой белковый токсин может быть ковалентно присоединен к расщепляемому или нерасщепляемому линкеру ( $L_B$ ).


В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусматривает один или несколько цитотоксинов, ковалентно присоединенных к линкеру ( $L_B$ ), где линкер ( $L_B$ ) представляет собой нерасщепляемый линкер, а один или несколько цитотоксинов независимо выбраны из ауристатиона или аманитина.

В одном аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, представляет собой соединение, имеющее структуру формулы (A), или его стереоизомеры или фармацевтически приемлемые соли,



Формула (A),


где:



R<sup>1</sup> представляет собой

и R<sup>3</sup> представляет собой -OH;

ИЛИ



$R^1$  представляет собой  $-L_5R^{14}$ ;

$R^2$  представляет собой  $C_1-C_6$ алкил;

$R^4$  представляет собой  $-L_1R^{14}$ ,  $-L_2R^{24}$ ,  $-L_2R^{34}$  или  $-L_3R^{44}$ ;




$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m$ ,  $-(CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;

$L_2$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m$ ,  $-(CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;


$L_3$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m$ ,  $-(CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;


$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;


$L_5$  представляет собой  $-NHS(=O)_2(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-NH(CH_2)_m-$ ,  $-NH(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-NH(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-NH(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-NH(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-NH(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  или  $-NH(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;












X<sub>4</sub> представляет собой







R<sup>14</sup> представляет собой , -N<sub>3</sub>, -ONH<sub>2</sub>, -NR<sup>7</sup>C(=O)CH=CH<sub>2</sub>, SH, -SSR<sup>13</sup>, -S(=O)<sub>2</sub>(CH=CH<sub>2</sub>), -NR<sup>7</sup>S(=O)<sub>2</sub>(CH=CH<sub>2</sub>), -NR<sup>7</sup>C(=O)CH<sub>2</sub>Br, -

NR<sup>7</sup>C(=O)CH<sub>2</sub>I, -NHC(=O)CH<sub>2</sub>Br, -NHC(=O)CH<sub>2</sub>I, -C(=O)NHNH<sub>2</sub>, ,




-CO<sub>2</sub>H, -NH<sub>2</sub>, , , , , ,

, , , ,





$R^{34}$  представляет собой  $-\text{N}_3$ ,  $-\text{ONH}_2$ ,  $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$ ,  $-\text{C}(=\text{O})\text{NHNH}_2$ ,  $-\text{CO}_2\text{H}$ ,  $-\text{NH}_2$ ,



каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ алкила;

$R^8$  представляет собой  $-\text{S}(\text{CH}_2)_n\text{CHR}^9\text{NH}_2$ ;


$R^9$  представляет собой  $-C(=O)OR^7$ ;  
каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и  $-OH$ ;  
каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и  $-OH$ ;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_{1-4}$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_{1-4}$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

$R^{13}$  представляет собой 2-пиридил или 4-пиридил;  
каждый  $m$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый  $p$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, представляет собой соединение, имеющее структуру формулы (B), или его стереоизомеры или фармацевтически приемлемые соли,



Формула (B),

где:

$R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ,  $-L_7R^{24}$ ,  $-L_7R^{34}$  или  $-L_8R^{44}$ ;

X представляет собой  $S(=O)$ ,  $S(=O)_2$  или S;

$R^5$  представляет собой H,  $-CH_3$  или  $-CD_3$ ;

$R^6$  или  $-NH_2$  или  $-OH$ ;



$L_6$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$  или  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ;


$L_7$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,












$(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2-$  или  $-(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2\text{SS}(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ;

$\text{L}_8$  представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_1\text{L}_4-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}((\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_1\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{X}_1(\text{CH}_2)_m-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  
 $(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2-$  или  $-(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2\text{SS}(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ;


$\text{L}_4$  представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m-$ ;




$\text{R}^{14}$  представляет собой ,  $-\text{N}_3$ ,  $-\text{ONH}_2$ ,  $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{CH}=\text{CH}_2$ ,  $\text{SH}$ ,




ИЛИ



$R^{34}$  представляет собой  $-N_3$ ,  $-ONH_2$ ,  $-NR^7C(=O)CH=CH_2$ ,  $-C(=O)NHNH_2$ ,  $-CO_2H$ ,  $-NH_2$ ,



$R^{44}$  представляет собой



каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

$R^8$  представляет собой  $-S(CH_2)_nCHR^9NH_2$ ;

$R^9$  представляет собой  $-C(=O)OR^7$ ;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и  $-OH$ ;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и  $-OH$ ;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

$R^{13}$  представляет собой 2-пиридил или 4-пиридил;


каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Определенные аспекты и примеры фрагмента, представляющего собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, предусмотрены в следующем перечне дополнительных пронумерованных

вариантов осуществления. Следует понимать, что признаки, указанные в каждом варианте осуществления, можно объединять с другими указанными признаками с получением дополнительных вариантов осуществления настоящего изобретения.


Вариант осуществления 1. Соединение формулы (А) или его фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (А-1) или ее фармацевтически приемлемой соли:




Формула (А-1),

где:  $R^4$  является таким, как определено выше.

Вариант осуществления 2. Соединение формулы (А) или его фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (А-2) или формулы (А-3) или их фармацевтически приемлемой соли:




Формула (А-2),



Формула (А-3),

где:  $L_5$  и  $R^{14}$  являются такими, как определено выше.


Вариант осуществления 3. Соединение формулы (А) или его фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (А-1а) или ее фармацевтически приемлемой соли:




Формула (А-1а),

где:  $R^4$  является таким, как определено выше.

Вариант осуществления 4. Соединение формулы (А) или его фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (А-2а) или формулы (А-3а) или их фармацевтически приемлемой соли:



Формула (А-2а),



Формула (А-3а),

где:  $L_5$  и  $R^{14}$  являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 5. Соединение формулы (А), формулы (А-1) или формулы (А-1а) или его фармацевтически приемлемая соль,

где:

$R^4$  представляет собой  $-L_1R^{14}$ ,  $-L_2R^{24}$ ,  $-L_2R^{34}$  или  $-L_3R^{44}$ ;





$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;

$L_2$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;


$L_3$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;

$X_1$  представляет собой



или







,


где \* указывает на точку

присоединения к  $L_4$ ;

X<sub>2</sub> представляет собой






или




, где \* указывает на точку

присоединения к L<sub>4</sub>;

X<sub>3</sub> представляет собой










или




;

X<sub>4</sub> представляет собой




или




;

R<sup>14</sup> представляет собой














, -N<sub>3</sub>, -ONH<sub>2</sub>, -NR<sup>7</sup>C(=O)CH=CH<sub>2</sub>, SH,

$-\text{S}(=\text{O})_2(\text{CH}=\text{CH}_2)$ ,  $-\text{NR}^7\text{S}(=\text{O})_2(\text{CH}=\text{CH}_2)$ ,  $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{Br}$ ,  $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{I}$ ,







$-\text{NHC}(=\text{O})\text{CH}_2\text{Br}$ ,  $-\text{NHC}(=\text{O})\text{CH}_2\text{I}$ ,  $-\text{C}(\text{O})\text{NHNH}_2$ ,  $-\text{CO}_2\text{H}$ ,  $-\text{NH}_2$ ,




ИЛИ

$\text{R}^{24}$  представляет собой







$R^{34}$  представляет собой  $-N_3$ ,  $-ONH_2$ ,  $-NR^7C(=O)CH=CH_2$ ,  $-C(O)NHNH_2$ ,  $-CO_2H$ ,  $-NH_2$ ,



$R^{44}$  представляет собой



или  $-NR^7C(=O)CH_2R^8$ ;

каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

$R^8$  представляет собой  $-S(CH_2)_nCHR^9NH_2$ ;

$R^9$  представляет собой  $-C(=O)OR^7$ ;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и  $-OH$ ;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и  $-OH$ ;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и




каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.


Вариант осуществления 6. Соединение формулы (A), формулы (A-2), формулы (A-3), формулы (A-2a) или формулы (A-3a) или его фармацевтически приемлемая соль,

где:

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_5$  представляет собой  $-NHS(=O)_2(CH_2)_mX_1L_4$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-NH(CH_2)_m-$ ;





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13 и 14.


Вариант осуществления 7. Соединение формулы (А), формулы (А-1) или формулы (А-1а) или его фармацевтически приемлемая соль, где:





$R^4$  представляет собой  $-L_1R^{14}$ ;

$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_5$  представляет собой  $-NHS(=O)_2(CH_2)_mX_1L_4$ ;

$X_1$  представляет собой , где \* указывает на точку присоединения к  $L_4$ ;

$R^{14}$  представляет собой ,  $-ONH_2$ , ,  или ;


каждый  $m$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и




каждый  $p$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.


Вариант осуществления 8. Соединение формулы (А), формула (А-2), формулы (А-3), формулы (А-2а) или формулы (А-3а) или его фармацевтически приемлемая соль, где:

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_5$  представляет собой  $-NHS(=O)_2(CH_2)_mX_1L_4$ ;

$X_1$  представляет собой , где \* указывает на точку присоединения к  $L_4$ ;





$R^{14}$  представляет собой ,  $-ONH_2$ , ,  или




каждый  $m$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый  $r$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 9. Соединение формулы (A), выбранное  
из:




Вариант осуществления 10. Соединение формулы (B) или его  
фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (B-1)  
или ее фармацевтически приемлемой соли:



Формула (B-1),

где:  $R^{54}$ ,  $R^5$  и  $R^6$ , являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 11. Соединение формулы (B) или его фармацевтически приемлемая соль, имеющее структуру формулы (B-1a) или ее фармацевтически приемлемой соли:



Формула (B-1a),

где:  $R^{54}$ ,  $R^5$  и  $R^6$ , являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 12. Соединение формулы (B), формулы (B-1) или формулы (B-1a) или его фармацевтически приемлемая соль, где:

$R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ,  $-L_7R^{24}$ ,  $-L_7R^{34}$  или  $-L_8R^{44}$ ;

$R^5$  представляет собой H,  $-CH_3$  или  $-CD_3$ ;






$R^6$  или  $-NH_2$  или  $-OH$ ;








$L_6$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_7$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;







$L_8$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;









ИЛИ

R<sup>24</sup> представляет собой


ИЛИ




R<sup>34</sup> представляет собой -N<sub>3</sub>, -ONH<sub>2</sub>, -NR<sup>7</sup>C(=O)CH=CH<sub>2</sub>, -C(O)NHNH<sub>2</sub>,  
-CO<sub>2</sub>H, -NH<sub>2</sub>,



ИЛИ





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1-C_6$ алкила;

$R^8$  представляет собой  $-S(CH_2)_nCHR^9NH_2$ ;

$R^9$  представляет собой  $-C(=O)OR^7$ ;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1-C_6$ алкила, F, Cl и  $-OH$ ;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1-C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и  $-OH$ ;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1-C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1-4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1-4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 13. Соединение формулы (B), формулы (B-1) или формулы (B-1a) или его фармацевтически приемлемая соль, где:

$R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ;


$R^5$  представляет собой  $-CH_3$ ;

$R^6$  представляет собой  $-NH_2$ ;


$L_6$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;


$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m-$ ;

$X_1$  представляет собой



, где \* указывает на точку присоединения к  $L_4$ ;







каждый  $m$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый  $p$  независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 14. Соединение формулы (B), выбранное  
из:






(5) и




(6).

В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-  
лекарственное средство по настоящему изобретению, выбран из:







и




В другом аспекте фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство по настоящему изобретению, выбран из:



(SMCC-DM1),




(SPDB-DM4),



(сульфо-SPDB-DM4)

и



(MPET-DM4) .

#### Конъюгаты антитела и лекарственного средства

В настоящем изобретении предусмотрены конъюгаты антитела и лекарственного средства, где антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT, соединены с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. В одном аспекте антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') соединены посредством ковалентной связи за счет линкера с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство, которое представляет собой цитотоксическое средство.

Конъюгаты антитела и лекарственного средства могут селективно доставлять цитотоксическое средство к клеткам, экспрессирующим cKIT, например, гемопоэтическим стволовым клеткам, тем самым селективно разрушая эти клетки у пациента, например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Предпочтительно конъюгаты антитела к cKIT и лекарственного средства характеризуются коротким периодом полувыведения и будут выводиться из кровяного русла пациента, поэтому их можно применять для кондиционирования реципиентов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток до трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела к сКІТ и лекарственного средства, раскрытые в данном документе, модифицированы, чтобы характеризоваться сниженной способностью индуцировать дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы. Например, конъюгаты антитела к сКІТ и лекарственного средства, раскрытые в данном документе, модифицированы, чтобы характеризоваться сниженной способностью индуцировать дегрануляцию мастоцитов, то есть она снижена на приблизительно или по меньшей мере 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99% в сравнении с полноразмерным антителом к сКІТ, фрагментом F(ab')<sub>2</sub> или F(ab)<sub>2</sub> или их конъюгатом, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела к сКІТ и лекарственного средства, раскрытые в данном документе, могут содержать фрагмент Fab или Fab' к сКІТ. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела к сКІТ и лекарственного средства, раскрытые в данном документе, могут характеризоваться минимальной активностью индуцирования дегрануляции мастоцитов, например, скорректированной по исходному уровню регистрируемой величиной O.D., составляющей менее 0,25, например, менее 0,2, менее 0,15 или менее 0,1, в анализе высвобождения тексозаминидазы, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы.

В некоторых вариантах осуществления в данном документе предусмотрены конъюгаты, содержащие фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сКІТ (Fab или Fab' к сКІТ), соединенный с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (например, цитотоксическое средство), необязательно через линкер. Как описано в данном документе, такие конъюгаты Fab' или Fab к сКІТ и токсина могут разрушать человеческие клетки HSC *in vitro* и *in vivo*, но не вызывают дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы.

В одном аспекте раскрытия предусмотрен конъюгат формулы (I):

$A-(LB-(D)_n)_y$  Формула (I);

где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сКІТ человека;


L<sub>B</sub> представляет собой линкер;

D представляет собой цитотоксическое средство;

n составляет целое число от 1 до 10, и

у составляет целое число от 1 до 10,  
 где фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство  $(L_B-(D)_n)$ , ковалентно присоединен к фрагменту антитела (А).

В одном аспекте настоящее изобретение направлено на конъюгат формулы (II):



$A_1$  представляет собой фрагмент (например, Fab или Fab') или цепь антитела (например, HC или LC), которые специфически связываются с cKIT человека;

$A_2$  представляет собой фрагмент (например, Fab или Fab') или цепь антитела (например, HC или LC), которые специфически связываются с cKIT человека;

$L_B$  представляет собой линкер;

D представляет собой цитотоксическое средство, и

n составляет целое число от 1 до 10,

где фрагмент, представляющий собой линкер-лекарственное средство  $(L_B-(D)_n)$ , ковалентно спаривает фрагменты антитела  $A_1$  и  $A_2$ .

В одном аспекте один из нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, в конъюгатах формулы (I) и формулы (II) независимо выбран из ауристати́на, амани́тина, майтанзинои́да и сапори́на.

В другом аспекте один из нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, в конъюгатах формулы (I) независимо выбраны из ауристати́на и амани́тина.

В конъюгатах формулы (I) один или несколько фрагментов, представляющих собой линкер-лекарственное средство  $(L_B-(D)_n)$ , могут быть ковалентно присоединены к фрагменту антитела, А (например Fab или Fab'), тем самым соединяя ковалентной связью один или несколько фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, с фрагментом антитела А (например Fab или Fab') через линкер  $L_B$ .  $L_B$  представляет собой любой химический фрагмент, который способен соединить фрагмент антитела, А (например, Fab или Fab') с одним или несколькими фрагментами, представляющими собой лекарственные средства D. Конъюгаты формулы (I), где один или несколько фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, ковалентно связаны с фрагментом антитела А (например Fab или

Fab'), могут быть образованы с применением реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера, имеющего одну или несколько реакционноспособных функциональных групп, которые являются одинаковыми или различными. Одну из реакционноспособных функциональных групп реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера применяют для осуществления реакции с группой на фрагменте антитела, А, в качестве примера, тиольной или аминной (например, на цистеине, N-конце или боковой цепи аминокислоты, такой как лизин), с образованием ковалентной связи с одним концом линкера L<sub>B</sub>. Такие реакционноспособные функциональные группы реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера включают без ограничения малеимидную, тиольную и NHS-сложноэфирную. Другую реакционноспособную функциональную группу или группы реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера применяют для ковалентного присоединения одного или нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, к линкеру L<sub>B</sub>.

В конъюгатах формулы (II) кетоновый мостик образуется за счет реакции боковых тиолов на фрагментах антитела A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub> и 1,3-дигалогенацетона, такого как 1,3-дихлорацетон, 1,3-дибромацетон, 1,3-дийодацетон и биссульфонатные сложные эфиры 1,3-дигидроксиацетона, который тем самым ковалентно спаривает фрагменты антитела A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub>. Данный фрагмент, представляющий собой кетоновый мостик, применяют для ковалентного присоединения одного или нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, к фрагментам антитела A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub> через линкер L<sub>B</sub>. L<sub>B</sub> представляет собой любой химический фрагмент, который способен соединить фрагмент антитела, A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub>, с одним или несколькими фрагментами, представляющими собой лекарственные средства D. Конъюгаты формулы (II), где один или несколько фрагментов, представляющих собой лекарственные средства D, ковалентно связаны с фрагментами антитела A<sub>1</sub> и A<sub>2</sub>, могут быть образованы с применением реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера, имеющего одну или несколько реакционноспособных функциональных групп, которые являются одинаковыми или различными. В одном варианте осуществления одна из реакционноспособных функциональных групп реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера представляет собой алкоксиамин, который применяют для осуществления реакции с кетоновым мостиком

с образованием оксимной связи с одним концом линкера  $L_B$ , а другую реакционноспособную функциональную группу или группы реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера применяют для ковалентного присоединения одного или нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства  $D$ , к линкеру  $L_B$ . В другом варианте осуществления одна из реакционноспособных функциональных групп реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера представляет собой гидразин, который применяют для осуществления реакции с кетоновым мостиком с образованием гидразоновой связи с одним концом линкера  $L_B$ , а другую реакционноспособную функциональную группу или группы реагента на основе бифункционального или мультифункционального линкера применяют для ковалентного присоединения одного или нескольких фрагментов, представляющих собой лекарственные средства  $D$ , к линкеру  $L_B$ .

В одном аспекте  $L_B$  представляет собой расщепляемый линкер. В другом аспекте  $L_B$  представляет собой нерасщепляемый линкер. В некоторых аспектах  $L_B$  представляет собой кислотолабильный линкер, фотولاбильный линкер, расщепляемый пептидазами линкер, расщепляемый эстеразами линкер, расщепляемый гликозидазами линкер, расщепляемый фосфодиэстеразами линкер, линкер с восстанавливаемой дисульфидной связью, гидрофильный линкер или линкер на основе дикарбоновой кислоты.

В другом аспекте фрагмент, представляющий собой лекарственное средство ( $D$ ), представляет собой белковый токсин, выбранный из сапорина, противовирусного белка лаконоса (PAP), бриодина 1, буганина, гелонина, рицина, абрина, лектина омелы, модекцина, волкенсина, аспарина, момордина, эбулина, вискумина, шигатоксина, дифтерийного токсина (DT) или экзотоксина *Pseudomonas* (PE). Такие белковые токсины способны приводить к цитолизу клеток за счет инактивации рибосомы или ингибирования синтеза белков путем нарушения функции фактора элонгации 2 (EF2) (см. Kreitman et al., *Immunotoxins for targeted cancer therapy*, The AAPS Journal 2006; 8 (3) Article 63; Gadadhar and Karande, *Targeted Cancer Therapy: History and Development of Immunotoxins*, Глава 1 в *Resistance to Immunotoxins in Cancer Therapy*, pp 1-31). В некоторых вариантах осуществления белковый токсин представляет собой сапорин. Белковый токсин может быть присоединен фрагменту антитела к скИТ (A) ковалентно через расщепляемый или нерасщепляемый линкер ( $L_B$ ). В некоторых вариантах осуществления белковый токсин соединен с

фрагментом антитела к cKIT через дисульфидную или тиоэфирную связь.

Хотя в конкретной молекуле конъюгата отношение лекарственного средства к антителу имеет точное целочисленное значение (например, произведение  $n$  и  $y$  в формуле (I) и " $n$ " в формуле (II)), известно, что зачастую значение будет представлять собой среднее значение, когда его применяют для описания образца, содержащего множество молекул, вследствие некоторой степени неоднородности, обычно сопряженной со стадией конъюгации. Средняя нагрузка для образца конъюгата обозначается в данном документе как отношение лекарственного средства к антителу (или Fab') или "DAR". В некоторых аспектах DAR составляет от приблизительно 1 до приблизительно 5, и обычно составляет приблизительно 1, 2, 3 или 4. В некоторых аспектах по меньшей мере 50% образца по весу составляет соединение, характеризующееся средним DAR плюс или минус 2, и предпочтительно по меньшей мере 50% образца составляет конъюгат, который подразумевает среднее DAR плюс или минус 1. Другие аспекты включают конъюгаты, в которых DAR составляет приблизительно 2. В некоторых аспектах DAR, составляющее 'приблизительно  $y$ ', означает, что измеренное значение DAR находится в пределах 20% от произведения  $n$  и  $y$  в формуле (I). В некоторых аспектах DAR, составляющее 'приблизительно  $n$ ', означает, что измеренное значение DAR находится в пределах 20% от  $n$  в формуле (II).


В одном аспекте среднее молярное отношение лекарственного средства к фрагменту антитела (Fab или Fab') в конъюгатах формулы (I) (т. е. среднее значение произведения  $n$  и  $y$ , также известное как отношение лекарственного средства к антителу (DAR)) составляет от приблизительно 1 до приблизительно 10, от приблизительно 1 до приблизительно 6 (например, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0), от приблизительно 1 до приблизительно 5, от приблизительно 1,5 до приблизительно 4,5 или от приблизительно 2 до приблизительно 4.

В одном аспекте среднее молярное отношение лекарственного средства к фрагментам антитела  $A_1$  и  $A_2$  в конъюгатах формулы (II) (т. е. среднее значение  $n$ , также известное как отношение лекарственного средства к антителу (DAR)) составляет от

приблизительно 1 до приблизительно 10, от приблизительно 1 до приблизительно 6 (например, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0), от приблизительно 1 до приблизительно 5, от приблизительно 1,5 до приблизительно 4,5 или от приблизительно 2 до приблизительно 4.

В одном аспекте предусмотренный в настоящем изобретении конъюгат характеризуется в значительной степени высокой чистотой и имеет один или несколько из следующих признаков: (а) более приблизительно 90% (например, больше или равно приблизительно 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% или 100%), предпочтительно более приблизительно 95% разновидностей конъюгата являются мономерными, (b) уровень неконъюгированного линкера в препарате конъюгата составляет менее приблизительно 10% (например, меньше или равно приблизительно 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% или 0%) (относительно общего количества линкера), (с) менее 10% молекул конъюгата являются сшитыми (например, меньше или равно приблизительно 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% или 0%), (d) уровень свободного лекарственного средства (например, ауристатина, аманитина, майтанзиноида или сапорина) в препарате конъюгата составляет менее приблизительно 2% (например, меньше или равно приблизительно 11,5%, 1,4%, 1,3%, 1,2%, 1,1%, 1,0%, 0,9%, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2%, 0,1%, или 0%) (моль/моль относительно общего количества цитотоксического средства).

В одном аспекте конъюгаты по настоящему изобретению имеют структуру формулы (С):



где:

А представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сКІТ человека;



у составляет целое число от 1 до 10;






R<sup>2</sup> представляет собой C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил;


$L_{20}$  представляет собой  $-L_1R^{40}$ ;

$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;







каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl, -NH<sub>2</sub>, -OCH<sub>3</sub>, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, -N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, -CN, -NO<sub>2</sub> и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного -C(=O)OH, бензила, замещенного -C(=O)OH,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного -C(=O)OH, и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного -C(=O)OH;

каждый  $R^{15}$  независимо выбран из H, -CH<sub>3</sub> и фенила;


каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,

и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13 и 14.

В другом аспекте конъюгаты по настоящему изобретению имеют структуру формулы (D):





Формула (D),

где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;

y составляет целое число от 1 до 10;




R<sup>1</sup> представляет собой  или ;


R<sup>2</sup> представляет собой C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил;


L<sub>30</sub> представляет собой -L<sub>5</sub>R<sup>40</sup>;

L<sub>4</sub> представляет собой -(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>;

L<sub>5</sub> представляет собой -NHS(=O)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>2</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(=O)NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(=O)NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>C(R<sub>7</sub>)<sub>2</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(R<sub>7</sub>)<sub>2</sub>SS(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub> или -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>3</sub>C(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-;





X<sub>1</sub> представляет собой , , ,






, где \* указывает на точку присоединения к L<sub>4</sub>;

X<sub>2</sub> представляет собой






или




, где \* указывает на точку

присоединения к L<sub>4</sub>;

X<sub>3</sub> представляет собой











или










;

X<sub>4</sub> представляет собой





R<sup>40</sup> представляет собой






ИЛИ









$(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_{m-}$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_{m-}$ ,  $-$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_{m-}$ ,  $-$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2-$  или  $-(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2\text{SS}(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_{m-}$ ;

$\text{L}_4$  представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m$ ;



C(=O)-, -NHC(=O)-, -CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, -NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, -S-,



ИЛИ

каждый R<sup>7</sup> независимо выбран из H и C<sub>1</sub>-С<sub>6</sub>алкила;

каждый R<sup>10</sup> независимо выбран из H, C<sub>1</sub>-С<sub>6</sub>алкила, F, Cl и -OH;

каждый R<sup>11</sup> независимо выбран из H, C<sub>1</sub>-С<sub>6</sub>алкила, F, Cl, -NH<sub>2</sub>, -OCH<sub>3</sub>, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, -N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, -CN, -NO<sub>2</sub> и -OH;

каждый R<sup>12</sup> независимо выбран из H, C<sub>1</sub>-алкила, фтора, бензилокси, замещенного -C(=O)OH, бензила, замещенного -C(=O)OH, C<sub>1</sub>-<sub>4</sub>алкокси, замещенного -C(=O)OH, и C<sub>1</sub>-<sub>4</sub>алкила, замещенного -C(=O)OH;


каждый  $R^{15}$  независимо выбран из H,  $-CH_3$  и фенила;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 и 14.

Определенные аспекты и примеры конъюгатов согласно настоящему изобретению предусмотрены в следующем перечне дополнительных пронумерованных вариантов осуществления. Следует понимать, что признаки, указанные в каждом варианте осуществления, можно объединять с другими указанными признаками с получением дополнительных вариантов осуществления настоящего изобретения.

Вариант осуществления 15. Конъюгат, имеющий структуру формулы (С), представляет собой конъюгат, имеющий структуру формулы (С-1):



где: А, у, и  $L_{20}$  являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 16. Конъюгат, имеющий структуру формулы (С) или формулы (С-1), где:

А представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сКИТ человека;


у составляет целое число от 1 до 10;



$L_{20}$  представляет собой  $-L_1R^{40}$ ;

$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ;






$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;

$X_1$  представляет собой









X<sub>2</sub> представляет собой






присоединения к L4;

X<sub>3</sub> представляет собой







X<sub>4</sub> представляет собой





$R^{40}$  представляет собой



каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_{1-4}$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_{1-4}$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 17. Конъюгат, имеющий структуру формулы (C) или формулы (C-1), где:



A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;






y составляет целое число от 1 до 10;

$L_{20}$  представляет собой  $-L_1R^{40}$ ;

$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1-C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1-C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1-C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_{1-4}$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_{1-4}$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 18. Конъюгат, имеющий структуру формулы (С) или формулы (С-1), где:


A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;

y составляет целое число от 1 до 10;


$L_{20}$  представляет собой  $-L_1R^{40}$ ;


$L_1$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;


$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;



$X_1$  представляет собой , где \* указывает на точку присоединения к  $L_4$ ;









$R^{40}$  представляет собой  или




каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.


Вариант осуществления 19. Конъюгат, имеющий структуру формулы (С) или формулы (С-1), выбранный из:



Вариант осуществления 20. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), представляет собой конъюгат, имеющий структуру формулы (D-1) или формулы (D-2):




Формула (D-1),




Формула (D-2),

где: А, у и L<sub>30</sub> являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 21. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), представляет собой конъюгат, имеющий структуру формулы (D-1a) или формулы (D-2a):



Формула (D-1a),



Формула (D-2a),

где: А, у и L<sub>30</sub> являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 22. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), формулы (D-1), формулы (D-2), формулы (D-1a) или формулы (D-2a), где:

А представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с скИТ человека;





у составляет целое число от 1 до 10;

L<sub>30</sub> представляет собой -L<sub>5</sub>R<sup>40</sup>;


L<sub>4</sub> представляет собой -(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>;

L<sub>5</sub> представляет собой -NHS(=O)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>2</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>- или -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-;

$X_1$  представляет собой







или




где \* указывает на точку

присоединения к  $L_4$ ;

$X_2$  представляет собой








или



где \* указывает на точку


присоединения к  $L_4$ ;


$R^{40}$  представляет собой



,  $-NR^7C(=O)CH_2-$ ,  $-NHC(=O)CH_2-$ ,  $-S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-(CH_2)_2S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-NR^7S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-NR^7C(=O)CH_2CH_2-$ ,  $-NH-$ ,  $-$

$C(=O)-$ ,  $-NHC(=O)-$ ,  $-CH_2NHCH_2CH_2-$ ,  $-NHCH_2CH_2-$ ,  $-S-$ ,





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 23. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), формулы (D-1), формулы (D-2), формулы (D-1a) или формулы (D-2a),

где:




A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;


y составляет целое число от 1 до 10;

$L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ ;

$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;

$L_5$  представляет собой  $-NHS(=O)_2(CH_2)_mX_1L_4$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-NH(CH_2)_m-$ ;





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 24. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), формулы (D-1), формулы (D-2), формулы (D-1a) или формулы (D-2a), где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или


Fab'), который специфически связывается с сКІТ человека;


у составляет целое число от 1 до 10;


L<sub>30</sub> представляет собой -L<sub>5</sub>R<sup>40</sup>;

L<sub>4</sub> представляет собой -(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>;


L<sub>5</sub> представляет собой -NHS(=O)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>;



X<sub>1</sub> представляет собой , где \* указывает на точку присоединения к L<sub>4</sub>;



R<sup>40</sup> представляет собой




;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,


и

каждый r независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.


Вариант осуществления 25. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D), формулы (D-1), формулы (D-2), формулы (D-1a) или формулы (D-2a), выбранный из:




;




;



;




Вариант осуществления 26. Конъюгат, имеющий структуру формулы (Е), представляет собой конъюгат, имеющий структуру формулы (Е-1):



Формула (Е-1),

где: А, у, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> и L<sub>40</sub> являются такими, как определено выше.  
Вариант осуществления 27. Конъюгат, имеющий структуру формулы (Е), представляет собой конъюгат, имеющий структуру формулы (Е-1а):



Формула (E-1a),

где: A, y, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup> и L<sub>40</sub> являются такими, как определено выше.

Вариант осуществления 28. Конъюгат, имеющий структуру формулы (E), формулы (E-1) или формулы (E-1a), где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с СКІТ человека;

y составляет целое число от 1 до 10;

R<sup>5</sup> представляет собой H, -CH<sub>3</sub> или -CD<sub>3</sub>;





R<sup>6</sup> представляет собой -NH<sub>2</sub> или -OH;

L<sub>40</sub> представляет собой -L<sub>6</sub>R<sup>40</sup>;


L<sub>6</sub> представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_1\text{L}_4-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_1\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m-$  или  $-(\text{CH}_2)_m-$ ;

L<sub>4</sub> представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m$ ;

X<sub>1</sub> представляет собой





или



, где \* указывает на точку

присоединения к L<sub>4</sub>;

X<sub>2</sub> представляет собой





или




где \* указывает на точку


присоединения к L<sub>4</sub>;

R<sup>40</sup> представляет собой



C(=O)-, -NHC(=O)-, -CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, -NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, -S-,





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 29. Конъюгат, имеющий структуру формулы (E), формулы (E-1) или формулы (E-1a), где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;

y составляет целое число от 1 до 10;

$R^5$  представляет собой H,  $-CH_3$  или  $-CD_3$ ;


$R^6$  представляет собой  $-NH_2$  или -OH;


$L_{40}$  представляет собой  $-L_6R^{40}$ ;

$L_6$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;





$L_4$  представляет собой  $-((CH_2)_m)$ ;

$X_1$  представляет собой













X<sub>2</sub> представляет собой



R<sup>40</sup> представляет собой





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;

каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Вариант осуществления 30. Конъюгат, имеющий структуру формулы (E), формулы (E-1) или формулы (E-1a), где:

A представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с cKIT человека;

y составляет целое число от 1 до 10;


$R^5$  представляет собой  $-CH_3$ ;


$R^6$  представляет собой  $-NH_2$ ;


$L_{40}$  представляет собой  $-L_6R^{40}$ ;


$L_6$  представляет собой  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-((CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-L_4NHC(=O)NH((CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$  или  $-(CH_2)_m-$ ;


$L_4$  представляет собой  $-((CH_2)_m)-$ ;



X<sub>1</sub> представляет собой , где \* указывает на точку присоединения к L<sub>4</sub>;





R<sup>40</sup> представляет собой , ИЛИ




каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, и

каждый r независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.







Вариант осуществления 31. Конъюгат, имеющий структуру формулы (E), формулы (E-1) или формулы (E-1a), выбранный из:






В другом аспекте конъюгат антитела и лекарственного средства













где А представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сК1Т человека, и у составляет целое число от 1 до 10.

В другом аспекте конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению выбран из:








где А представляет собой фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с СКІТ человека, и у составляет целое число от 1 до 10.

### Синтез иллюстративных соединений линкер-лекарственное средство

Пример 1. Синтез (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-(3-(2-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)этоксипропаноил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропановой кислоты (C1)



**Стадия 1.** К раствору BocVal-Dil-Dap-OH (1,00 г, 1,75 ммоль) в N,N-диметилформамиде (DMF, 20,0 мл) при 0°C добавляли N,N-диизопропилэтиламин (DIEA, 0,677 г, 5,25 ммоль) и 1-[бис(диметиламино)метил]-1H-1,2,3-триазоло[4,5-b]пиридиний 3-оксида гексафторфосфат (HATU) (0,731 г, 1,93 ммоль). Затем полученный раствор перемешивали в течение 5 минут и добавляли к раствору HCl-соли метилового сложного эфира L-фенилаланина (0,377 г, 1,75 ммоль) и DIEA (0,226 г, 1,75 ммоль) в DMF (5,0 мл) при 0°C. Реакционную смесь нагревали до комнатной температуры, перемешивали в течение дополнительных 30 минут и затем концентрировали. Остаток очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением системы ISCO, колонка C18, элюировали с помощью 20-90% ацетонитрила в воде с получением BocVal-Dil-Dap-PheOMe: MS масса/заряд 733,4 (M+1); время удерживания 1,47 минуты.

**Стадия 2.** К раствору BocVal-Dil-Dap-PheOMe (0,683 г, 0,932 ммоль), полученному на стадии 1, в метаноле (20 мл) добавляли HCl

(4 н. в 1,4-диоксане, 16 мл). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 7 часов и концентрировали. Остаток растворяли в диоксане и лиофилизировали с получением HCl-соли Val-Dil-Dap-PheOMe: MS масса/заряд 633,4 (M+1); время удерживания 0,96 минуты.

**Стадия 3.** (1R,3S,4S)-N-Вос-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоновую кислоту (12,6 мг, 0,052 ммоль) растворяли в DMF (1 мл) в 15-мл круглодонной колбе. Добавляли DIEA (12,3 мг, 0,095 ммоль) и HATU (19 мг, 0,050 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 10 минут и добавляли HCl-соль Val-Dil-Dap-PheOMe (30 мг, 0,090 ммоль) в DMF (1,0 мл). Реакционную смесь перемешивали в течение 1 часа. С помощью LCMS-анализа определили, что реакция завершена, и полученную смесь очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением колонки C18, элюировали с помощью 20-90% ацетонитрила в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% трифторуксусной кислоты (TFA). Фракции, содержащие требуемый продукт, объединяли и концентрировали с получением (1R,3S,4S)-трет-бутил 3-(((S)-1-(((3R,4S,5S)-3-метокси-1-((S)-2-((1R,2R)-1-метокси-3-((S)-1-метокси-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)карбамоил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-2-карбоксилата: MS масса/заряд 856,6 (M+1); время удерживания 1,67 минуты.


**Стадия 4.** Продукт, полученный на стадии 3, растворяли в дихлорметане (DCM) (2,0 мл) и обрабатывали с помощью TFA (0,5 мл). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 1 часа. LCMS-анализ показал, что реакция завершена. Реакционную смесь концентрировали с помощью роторного испарителя с получением (S)-метил-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропаноата в виде TFA-соли: MS масса/заряд 756,6 (M+1); время удерживания 1,22 минуты.

**Стадия 5.** В 25-мл круглодонную колбу добавляли TFA-соль (S)-метил 2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропаноата (38,4 мг, 0,044 ммоль), моногидрат LiOH (50,0 мг, 1,19 ммоль) и смесь растворителей MeOH-H<sub>2</sub>O (2:1, 4,0 мл). Смесь перемешивали при комнатной температуре в

течение 60 часов. С помощью LC-MS-анализа определили, что реакция завершена. Реакционную смесь концентрировали и очищали посредством HPLC с обращенной фазой, колонка C18, элюировали с помощью ацетонитрила в H<sub>2</sub>O (10-70%), содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт объединяли и концентрировали с получением (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропановой кислоты в виде TFA-соли, MS масса/заряд 742,5 (M+1). Время удерживания 1,15 минуты.

**Стадия 6.** К раствору 3-(2-(малеимида)этокси)пропановой кислоты (2,2 мг, 0,010 ммоль) в DMF (1 мл) добавляли HATU (3,7 мг, 0,0098 ммоль) и DIEA (3,6 мг, 0,028 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин и затем добавляли (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропановую кислоту (8 мг, 0,0093 ммоль) в DMF (0,5 мл). Реакционную смесь перемешивали при rt в течение 1 ч и затем концентрировали и очищали посредством препаративной HPLC (10-60% ацетонитрила в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% TFA) с получением (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-(3-(2-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)этокси)пропаноил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропановой кислоты (**C1**). MS масса/заряд 937,5 (M+H). Время удерживания 1,138 мин.

**Пример 2.** (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-(6-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)гексаноил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамидо)-N,3-диметилбутанамидо)-3-метокси-5-метилгептаноил)пирролидин-2-ил)-3-метокси-2-метилпропанамидо)-3-фенилпропановая кислота (**C2**)


**(C2)**

(S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-(6-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)гексаноил)-2-

азабицикло [2.2.1] гептан-3-карбоксамидо) -N, 3-диметилбутанамидо) - 3-метокси-5-метилгептаноил) пирролидин-2-ил) -3-метокси-2-метилпропанамидо) -3-фенилпропановую кислоту (2) получали в соответствии со способом из примера 1, за исключением того, что на стадии 6

6-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1Н-пиррол-1-ил) гексановую кислоту (EMSA) (1,2 мг, 0,0058 ммоль) в DMF (1,0 мл) применяли вместо 3-(2-(малеимида)этокси)пропановой кислоты. (S)-2-((2R,3R)-3-((S)-1-((3R,4S,5S)-4-((S)-2-((1R,3S,4S)-2-(6-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1Н-пиррол-1-ил) гексаноил)-2-азабицикло [2.2.1] гептан-3-карбоксамидо) -N, 3-диметилбутанамидо) -3-метокси-5-метилгептаноил) пирролидин-2-ил) -3-метокси-2-метилпропанамидо) -3-фенилпропановая кислота (2) MS масса/заряд 935,6 (M+1). Время удерживания 1,17 минуты.

Пример 3. (1R,3S,4S)-N-((S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1Н-пиррол-1-ил) метил)-1Н-1,2,3-триазол-1-ил) пропилсульфонамидо) -1-оксо-3-фенилпропан-2-ил) амино) -1-метокси-2-метил-3-оксопропил) пирролидин-1-ил) -3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил) амино) -3-метил-1-оксобутан-2-ил) -2-метил-2-азабицикло [2.2.1] гептан-3-карбоксамид (С3)



(C3)

**Стадия 1.** К перемешиваемому раствору азидата натрия (3,50 г, 53,8 ммоль) в воде (25 мл) добавляли раствор 1,3-пропансульфона (6,10 г, 50,0 ммоль) в ацетоне (25 мл). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 24 часов и концентрировали до сухого состояния. Полученное твердое вещество суспендировали в диэтиловом эфире (100 мл) и перемешивали с обратным холодильником в течение 1 часа. Суспензию охлаждали до комнатной температуры и твердое вещество собирали фильтрацией, промывали с помощью ацетона и диэтилового эфира и высушивали под вакуумом с получением 3-азидо-1-пропансульфоновой кислоты. MS масса/заряд 188,1 (M+1). <sup>1</sup>H ЯМР (400 МГц, CD<sub>3</sub>OD): δ 3,47 (t, J=6,8 Гц, 2H), 2,87 (t, J=7,6 Гц, 2H), 2,07-2,00 (m, 2H).

**Стадия 2.** 3-азидо-1-пропансульфоновую кислоту (2,07 г, 13,0 ммоль) суспендировали в толуоле. Добавляли PCl<sub>5</sub> (2,61 г, 13,0 ммоль). Смесь нагревали с обратным холодильником в течение 3 часов.

Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и фильтровали для удаления нерастворимых веществ. Осадок на фильтре промывали с помощью DCM. Объединенные фильтраты концентрировали с получением 3-азидопропан-1-сульфонилхлорида в виде темно-желтого масла, которое применяли на следующей стадии без дополнительной очистки.

**Стадия 3.** К  $\text{NH}_4\text{OH}$  (5 мл), охлажденному до  $0^\circ\text{C}$ , добавляли 3-азидопропан-1-сульфонилхлорид (1,75 г, 9,53 ммоль). Спустя 10 минут реакционную смесь нагревали до комнатной температуры и перемешивали при той же температуре в течение 3 часов. Маслянистая смесь стала прозрачной. Реакционную смесь трижды экстрагировали с помощью EtOAc. Органическую фазу промывали с помощью солевого раствора, высушивали над безводным  $\text{MgSO}_4$  и концентрировали. Остаточный растворитель дополнительно удаляли под высоким вакуумом в течение 18 часов с получением 3-азидопропан-1-сульфонамида. MS масса/заряд 187,1 (M+1).  $^1\text{H}$  ЯМР (400 МГц,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  4,83 (s, 2H), 3,51 (t, J=6,4 Гц, 2H), 3,23 (t, J=7,6 Гц, 2H), 2,17–2,10 (m, 2H).

**Стадия 4.** (S)-2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-3-фенилпропановую кислоту (100 мг, 0,38 ммоль) растворяли в DMF (4 мл), с последующим добавлением DIEA (0,395 мл, 2,26 ммоль) и HATU (358 мг, 0,940 ммоль). Спустя 15 минут добавляли 3-азидопропан-1-сульфонамид (186 мг, 1,13 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 2 часов, при этом с помощью LCMS-анализа определили завершение реакции в это время. Затем полученную смесь очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением колонки C18, элюировали с помощью 10–90% ацетонитрила в  $\text{H}_2\text{O}$ , содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, объединяли и лиофилизировали с получением (S)-трет-бутил (1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил) карбамата. MS масса/заряд 312,1 (M+1-Вос). Время удерживания 1,15 минуты. Полученный таким образом продукт (72,4 мг, 0,176 ммоль) растворяли в 3 М метанольной HCl (5 мл). Растворитель удаляли при пониженном давлении. Остаток поглощали в ацетонитриле и  $\text{H}_2\text{O}$  и лиофилизировали с получением (S)-2-амино-N-((3-азидопропил)сульфонил)-3-фенилпропанамида в виде розовато-желтоватого твердого вещества. MS масса/заряд 312,1 (M+1).  $^1\text{H}$  ЯМР (400 МГц,  $\text{CD}_3\text{OD}$ ):  $\delta$  7,42–7,31 (m, 5H), 4,16–4,13 (m, 1H), 3,51–3,47 (m, 4H), 3,32–3,26 (m, 1H), 3,13–3,08 (m, 1H), 2,00–1,94 (m, 2H).

**Стадия 5.** К Вос-Val-Dil-Dap-ОН (195 мг, 0,34 ммоль), растворенному в DMF (4 мл), добавляли DIEA (132 мг, 1,02 ммоль) и HATU (108 мг, 0,28 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение

15 минут при комнатной температуре перед добавлением (S)-2-амино-N-((3-азидопропил)сульфонил)-3-фенилпропанамида (59,2 мг, 0,17 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение дополнительных 2 часов при комнатной температуре. А затем очищали посредством HPLC с обращенной фазой с получением требуемого продукта (95 мг, выход 65%, MS масса/заряд 865,4 (M+1), время удерживания 1,43 минуты). Продукт растворяли в 3 М HCl в MeOH (3 мл). Растворители удаляли под вакуумом. Затем к остатку добавляли ацетонитрил и H<sub>2</sub>O и раствор лиофилизировали с получением требуемого продукта, (S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-2-амино-3-метил-1-оксобутана. MS масса/заряд 765,4 (M+1). Время удерживания 1,04 минуты.

**Стадия 6.** К (1R,3S,4S)-2-(трет-бутоксикарбонил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоновой кислоте (16,5 мг, 0,068 ммоль) в DMF (2,0 мл) добавляли DIEA (17,6 мг, 0,137 ммоль) и NATU (21,6 мг, 0,057 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 10 минут перед добавлением (S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-2-амино-3-метил-1-оксобутана (20 мг, TFA-соль, 0,023 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 2 часов при комнатной температуре, при этом с помощью LCMS-анализа определили завершение реакции в это время. Затем полученную смесь очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением колонки C18, элюировали с помощью 10-90% ACN в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, объединяли и лиофилизировали с получением (1R,3S,4S)-N-((S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-(трет-бутоксикарбонил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамид. MS масса/заряд 988,5 (M+1). Время удерживания 1,51 минуты. Полученный таким образом продукт (9,4 мг, 0,0095 ммоль) растворяли


в метанольной HCl (3 M, 2,0 мл). Растворитель удаляли медленно при пониженном давлении. Остаток растворяли в ацетонитриле и H<sub>2</sub>O и лиофилизировали с получением (1R, 3S, 4S)-N-((S)-1-(((3R, 4S, 5S)-1-((S)-2-((1R, 2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамид в виде HCl-соли. MS масса/заряд 888,5 (M+1). Время удерживания 1,10 минуты.

**Стадия 7.** (1R, 3S, 4S)-N-((S)-1-(((3R, 4S, 5S)-1-((S)-2-((1R, 2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамид (8,8 мг, 0,0099 ммоль) растворяли в MeOH (2,0 мл). Добавляли параформальдегид (10,1 мг, 0,337 ммоль) и уксусную кислоту (0,0102 мл), а затем цианоборгидрид натрия (21,2 мг, 0,337 ммоль). Реакционную смесь нагревали при 50°C с перемешиванием в течение 1 часа. Добавляли дополнительный параформальдегид (10,1 мг, 0,337 ммоль), уксусную кислоту (0,0102 мл) и цианоборгидрид натрия (21,2 мг, 0,337 ммоль). Спустя 1 час при 50°C с помощью LCMS-анализа определили завершение реакции. Затем полученную смесь очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением колонки C18, элюировали с помощью 10-90% ACN в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, объединяли и лиофилизировали с получением (1R, 3S, 4S)-N-((S)-1-(((3R, 4S, 5S)-1-((S)-2-((1R, 2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-метил-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамид. MS масса/заряд 902,5 (M+1). Время удерживания 1,12 минуты.

**Стадия 8.** Раствор (1R, 3S, 4S)-N-((S)-1-(((3R, 4S, 5S)-1-((S)-2-((1R, 2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил) (метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-метил-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамид (5,2 мг, 0,0058 ммоль), 1-(проп-2-ин-1-ил)-1H-пиррол-2,5-диона (1,56 мг, 0,012 ммоль) и

$\text{CuSO}_4$  (0,7 мг, 0,004 ммоль) в DMF (2,0 мл) и  $\text{H}_2\text{O}$  (0,5 мл) обрабатывали натриевой солью L-аскорбиновой кислоты (2,5 мг, 0,014 ммоль) и перемешивали при комнатной температуре в течение 2 часов. Добавляли дополнительные  $\text{CuSO}_4$  (0,7 мг, 0,004 ммоль) и натриевую соль L-аскорбиновой кислоты (2,5 мг, 0,014 ммоль). После дополнительных 2 часов при комнатной температуре с помощью LCMS-анализа определили завершение реакции. Затем полученную смесь очищали посредством HPLC с обращенной фазой с применением колонки C18, элюировали с помощью 10–90% ацетонитрила в  $\text{H}_2\text{O}$ , содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, объединяли и лиофилизировали с получением (1R,3S,4S)-N-((S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-(((S)-N-1-(3-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)пропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-2-метил-2-азабицикло[2.2.1]гептан-3-карбоксамида **(C3)**. MS масса/заряд 1037,4 (M+1). Время удерживания 1,00 минуты.

Пример 4. Синтез (S)-2-((бис(диметиламино)метилден)амино)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-(((S)-N-1-(3-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)пропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутана **(C4)**



**Стадия 1.** К перемешиваемому раствору азидата натрия (3,5 г, 54 ммоль) в воде (25 мл) добавляли раствор 1,3-пропансульфона (6,1 г, 50 ммоль) в ацетоне (25 мл). Реакционную смесь перемешивали при rt в течение 24 ч и концентрировали. Полученное твердое вещество суспендировали в диэтиловом эфире (100 мл) и перемешивали с обратным холодильником в течение 1 ч. Суспензию охлаждали до rt. Твердое вещество собирали фильтрацией, промывали с помощью ацетона и диэтилового эфира и высушивали под вакуумом с получением 3-азидо-1-пропансульфоновой кислоты. MS масса/заряд 188,1 (M+23).  $^1\text{H}$  ЯМР (400 МГц,  $\text{CD}_3\text{OD}$ ):  $\delta$  3,47 (t,  $J=6,8$  Гц, 2H), 2,87 (t,  $J=7,6$  Гц, 2H), 2,07–2,00 (m, 2H).


**Стадия 2.** 3-азидо-1-пропансульфовую кислоту (2,07 г, 13 ммоль) суспендировали в толуоле. Добавляли  $\text{PCl}_5$  (2,61 г, 13 ммоль). Смесь нагревали с обратным холодильником в течение 3 ч. Реакционную смесь охлаждали до *rt*. Нерастворимые вещества удаляли фильтрацией и промывали с помощью DCM. Объединенный фильтрат концентрировали с получением 3-азидопропан-1-сульфонилхлорида в виде желто-коричневого масла, которое применяли на следующей стадии без дополнительной очистки.

**Стадия 3.**  $\text{NH}_4\text{OH}$  (28%, 5 мл) охлаждали до  $0^\circ\text{C}$ . Добавляли 3-азидопропан-1-сульфонилхлорид (1,75 г, 9,53 ммоль). Спустя 10 мин реакционную смесь нагревали до *rt* и затем перемешивали в течение 3 часов при *rt*. Две фазы становились однородными. Реакционную смесь трижды экстрагировали с помощью  $\text{EtOAc}$ . Объединенные органические фазы промывали с помощью солевого раствора, высушивали над  $\text{MgSO}_4$  и концентрировали на роторном испарителе, а затем с применением высокого вакуума в течение 18 ч с получением 3-азидопропан-1-сульфонамида. MS масса/заряд 187,1 (M+23).  $^1\text{H}$  ЯМР (400 МГц,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  4,83 (s, 2H), 3,51 (t, J=6,4 Гц, 2H), 3,23 (t, J=7,6 Гц, 2H), 2,17-2,10 (m, 2H).

**Стадия 4.** (S)-2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-3-фенилпропановую кислоту (100 мг, 0,38 ммоль) растворяли в DMF (4 мл). Добавляли DIEA (0,395 мл, 2,26 ммоль) и HATU (358 мг, 0,94 ммоль). Спустя 15 мин добавляли 3-азидопропан-1-сульфонамид (186 мг, 1,13 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 2 ч. С помощью LCMS определили завершение реакции. Реакционную смесь очищали посредством препаративной HPLC с применением 10-90% градиента с получением (S)-трет-бутил-(1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)карбамата. MS масса/заряд 312,1 (M+1-Boc). Время удерживания 1,15 мин. Полученный таким образом продукт (72,4 мг, 0,176 ммоль) растворяли в метанольной HCl (3 M, 5 мл). Растворитель удаляли выпариванием. Остаток лиофилизировали из ацетонитрила и  $\text{H}_2\text{O}$  с получением (S)-2-амино-N-((3-азидопропил)сульфонил)-3-фенилпропанамида в виде розовато-желтоватого твердого вещества. MS масса/заряд 312,1 (M+1)  $^1\text{H}$  ЯМР (400 МГц,  $\text{CD}_3\text{OD}$ ):  $\delta$  7,42-7,31 (m, 5H), 4,16-4,13 (m, 1H), 3,51-3,47 (m, 4H), 3,32-3,26 (m, 1H), 3,13-3,08 (m, 1H), 2,00-1,94 (m, 2H).

**Стадия 5.** K Boc-Val-Dil-Dap-OH (195 мг, 0,34 ммоль) в DMF (4

мл) добавляли DIEA (132 мг, 1,02 ммоль) и NATU (108 мг, 0,28 ммоль). Их перемешивали 15 мин при rt. Добавляли (S)-2-амино-N-((3-азидопропил)сульфонил)-3-фенилпропанамид (59,2 мг, 0,17 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 2 ч при rt. Неочищенный материал очищали посредством препаративной HPLC с получением требуемого продукта (95 мг, выход 65%, MS масса/заряд 865,4 (M+1), время удерживания 1,43 минуты). Продукт растворяли в 3 M HCl в MeOH (3 мл). Растворители удаляли выпариванием. Остаток лиофилизировали из ацетонитрила в воде с получением (S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-2-амино-3-метил-1-оксобутана,




, в виде HCl-соли, MS масса/заряд 765,4 (M+1), время удерживания 1,04 мин.

**Стадия 6.** К HCl-соли (S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-2-амино-3-метил-1-оксобутана (20 мг, 0,025 ммоль) в DMF (2 мл) добавляли DIEA (0,024 мл, 0,14 ммоль) и NATU (21,6 мг, 0,057 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при rt в течение 2 ч. С помощью LCMS определили завершение реакции. Затем полученную смесь очищали посредством препаративной HPLC с применением 10-90% градиента с получением (S)-2-((бис(диметиламино)метилден)амино)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутана в виде TFA-соли. MS масса/заряд 863,5 (M+1). Время удерживания 1,169 мин.

**Стадия 7.** TFA-соль (S)-2-((бис(диметиламино)метилден)амино)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-((S)-N-1-(3-азидопропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутана (87,4 мг, 0,089 ммоль) и 1-(проп-2-ин-1-ил)-1H-пиррол-2,5-дион (24,2 мг,

0,0179 ммоль) суспендировали в *t*-BuOH и воде из расчета по 3,0 мл каждого. Реакционный сосуд пять раз заполняли N<sub>2</sub> с помощью вакуум-наполнительного цикла с N<sub>2</sub>. Последовательно добавляли дегазированные растворы L-аскорбата натрия (17,7 мг, 0,089 ммоль) в H<sub>2</sub>O (2,4 мл) и CuSO<sub>4</sub> (2,86 мг, 0,018 ммоль) в H<sub>2</sub>O (0,6 мл) и реакционную смесь перемешивали при *rt* в течение 5 ч. С помощью LCMS определили завершение реакции. Неочищенный материал очищали посредством препаративной HPLC с применением 20–45% градиента с получением (S)-2-((бис(диметиламино)метил)амино)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-(((S)-N-1-(3-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)пропилсульфонамидо)-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)амино)-1-метокси-2-метил-3-оксопропил)пирролидин-1-ил)-3-метокси-5-метил-1-оксогептан-4-ил)(метил)амино)-3-метил-1-оксобутана (**C4**) в виде TFA-соли. MS масса/заряд 998,5 (M+1). Время удерживания 1,014 мин.

Пример 5. Синтез 6'-O-метил-7'-C-((23-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозантио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**C5**), 7'-C-((23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозантио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**A-3**) и 6'-O-метил-7'-C-((23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозантио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**A4**)



**Стадия 1.** Формальдегид (0,035 мл, 0,44 ммоль) и 23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозан-1-тиол (35 мг, 0,11 ммоль) добавляли к раствору  $\alpha$ -аманитина (20 мг, 0,022 ммоль) в MeOH (2 мл). К реакционной смеси добавляли триэтиламин (1,2 мл, 8,7 ммоль) и уксусную кислоту (0,25 мл, 4,4 ммоль) и трижды продували N<sub>2</sub>-газом. Реакционную смесь перемешивали при 40°C в течение 2 дней. После концентрирования под вакуумом затем остаток очищали посредством HPLC и лиофилизировали с получением 7'-C-((23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозантио)метил)- $\alpha$ -аманитина. MS (m+1) = 1342,4, RT пика при HPLC=0,834 минуты, <sup>1</sup>H-ЯМР (MeOD, 500 МГц)  $\delta$  10,65 (s, 1H), 8,81 (m, 1H), 8,59 (d, 1H, J=2,0 Гц), 8,45


(m, 2H), 8,33 (s, 1H), 8,14 (d, 1H, J=10,5 Гц), 8,00 (d, 1H, J=12,0 Гц), 7,90 (d, 1H, J=11,0 Гц), 7,67 (s, 1H), 7,48 (d, 1H, J=11,0 Гц), 6,69 (d, 1H, J=10,5 Гц), 5,25 (m, 1H), 5,12 (m, 1H), 4,74 (bs, 1H), 4,61 (dd, 1H, J=6,5 и 12,0 Гц), 4,51 (m, 2H), 4,29 (dd, 1H, J=10,5 и 23,0 Гц), 4,09 (m, 3H), 3,92 (m, 1H), 3,38~3,73 (m, 43H), 3,29 (m, 2H), 3,21 (m, 1H), 3,06 (m, 1H), 3,12 (m, 1H), 2,91 (m, 1H), 2,56 (m, 2H), 2,39 (m, 2H), 2,00 (m, 1H), 1,60 (m, 2H), 1,15 (m, 1H), 0,94 (d, 3H, J=9,0 Гц), 0,85 (m, 6H).

**Стадия 2:** 7'C-(23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозант(ио)метил)- $\alpha$ -аманитин (14,0 мг, 0,011 ммоль) и DMSO (1 мл) обрабатывали с помощью метилйодида (0,0007 мл) и K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (1,5 мг) при rt и перемешивали при rt в течение 1 ч. Дополнительные метилйодид (0,0007 мл) и K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (1,5 мг) добавляли при rt и перемешивали при rt в течение 2 ч. Дополнительные метилйодид (0,0007 мл) и K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (1,5 мг) снова добавляли при rt и перемешивали при rt в течение 2 ч. Затем реакционную смесь очищали посредством RP-C18 ISCO и лиофилизировали с получением 6'O-метил-7'C-((23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозант(ио)метил)- $\alpha$ -аманитина). MS (m+2/2) = 679,0, RT пика при HPLC=0,887 минуты, <sup>1</sup>H-ЯМР (MeOD, 500 МГц)  $\delta$  10,75 (s, 1H), 8,83 (m, 1H), 8,64 (d, 1H, J=2,0 Гц), 8,52 (d, 1H, J=10,0 Гц), 8,47 (d, 1H, J=3,5 Гц), 8,36 (s, 1H), 8,18 (d, 1H, J=8,5 Гц), 8,05 (d, 1H, J=9,5 Гц), 7,96 (d, 1H, J=9,0 Гц), 7,70 (d, 1H, J=9,0 Гц), 7,69 (s, 1H), 6,98 (d, 1H, J=9,0 Гц), 5,33 (m, 1H), 5,18 (m, 1H), 4,80 (bs, 1H), 4,68 (dd, 1H, J=5,5 и 9,5 Гц), 4,56 (m, 2H), 4,35 (dd, 1H, J=9,0 и 18,5 Гц), 4,10~4,21 (m, 3H), 3,97 (m, 1H), 3,92 (s, 3H), 3,45~3,79 (m, 42H), 3,35~3,44 (m, 3H), 3,11 (m, 1H), 2,96 (m, 1H), 2,61 (m, 2H), 2,44 (m, 2H), 2,06 (m, 1H), 1,65 (m, 2H), 1,21 (m, 1H), 0,99 (d, 3H, J=7,0 Гц), 0,90 (m, 6H).


**Стадия 3.** 6'O-метил-7'C-((23-азидо-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозант(ио)метил)- $\alpha$ -аманитин (8 мг, 0,006 ммоль) и 1-(проп-2-ин-1-ил)-1H-пиррол-2,5-дион (2 мг, 0,012 ммоль) добавляли к трет-бутанолу (0,5 мл) и реакционную смесь пять раз продували N<sub>2</sub>-газом. Затем добавляли натриевую соль L-аскорбиновой кислоты (1 мг, 0,006 ммоль), CuSO<sub>4</sub> (0,2 мг, 0,0012 ммоль) и 0,5 мл H<sub>2</sub>O. Реакционную смесь пять раз продували N<sub>2</sub>-газом и перемешивали при rt в течение 4 ч и затем очищали посредством RP-C18 ISCO с получением 6'O-метил-7'C-((23-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозант(ио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**C5**). MS (m+2/2) = 746,5,

RT пика при HPLC=0,850 минуты,  $^1\text{H}$ -ЯМР (MeOD, 500 МГц)  $\delta$  10,74 (s, 1H), 8,83 (m, 1H), 8,63 (d, 1H,  $J=2,0$  Гц), 8,51 (d, 1H,  $J=10,0$  Гц), 8,47 (d, 1H,  $J=3,5$  Гц), 8,36 (s, 1H), 8,17 (d, 1H,  $J=8,5$  Гц), 8,04 (d, 1H,  $J=10,0$  Гц), 7,96 (d, 1H,  $J=9,5$  Гц), 7,94 (s, 1H), 7,69 (d, 1H,  $J=9,0$  Гц), 6,97 (d, 1H,  $J=9,0$  Гц), 6,83 (s, 2H), 5,34 (m, 1H), 5,17 (m, 1H), 4,79 (bs, 1H), 4,75 (s, 2H), 4,68 (dd, 1H,  $J=5,0$  и  $9,5$  Гц), 4,56 (m, 2H), 4,52 (t, 1H,  $J=5,0$  Гц), 4,34 (dd, 1H,  $J=9,0$  и  $18,5$  Гц), 4,08~4,20 (m, 3H), 3,97 (m, 1H), 3,91 (s, 3H), 3,39~3,78 (m, 38H), 3,10 (m, 1H), 2,94 (dd, 1H,  $J=14,0$  и  $15,0$  Гц), 2,61 (m, 2H), 2,41 (m, 2H), 2,05 (m, 1H), 1,57~1,68 (m, 2H), 1,20 (m, 1H), 0,99 (d, 3H,  $J=7,0$  Гц), 0,91 (m, 6H).

Пример 6. Синтез 6'-O-метил-7'-C-((4-(3-(23-((4-малеимидо)метил-1H-1,2,3-триазол-1-ил)-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозил)уреидо)бутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**C6**)




**Стадия 1.** Формальдегид (0,027 мл, 0,33 ммоль) и трет-бутил-(4-меркаптобутил)карбамат (**i-7**) (34 мг, 0,16 ммоль) добавляли к раствору  $\alpha$ -аманитина (**A**) (15 мг, 0,016 ммоль) в MeOH (5 мл) и триэтилаmine (0,46 мл, 3,26 ммоль) в 40-мл флаконе и реакционную смесь перемешивали при  $40^\circ\text{C}$  в течение 3 дней. После концентрирования под вакуумом остаток растворяли в 2 мл MeOH и добавляли 408 мкл 2 М триметилсилилдиазометана в диэтиловом эфире и смесь перемешивали в течение 2 ч при rt. Затем добавляли еще 408 мкл 2 М триметилсилилдиазометана в диэтиловом эфире и перемешивали при rt в течение 2 ч. Реакционную смесь очищали посредством HPLC и лиофилизировали с получением 6'-O-метил-7'-C-((4-т-бутоксикарбониламинобутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина (**A-4**),



. MS ( $m+2$ -вос/2) = 525,8, RT пика

при HPLC=0,936 минуты,  $^1\text{H}$ -ЯМР (MeOD- $d_4$ , 400 МГц)  $\delta$  10,78 (s, 1H), 8,84 (m, 1H), 8,59 (d, 1H,  $J=2,4$  Гц), 8,48 (s, 1H), 8,46 (d, 1H,  $J=14,4$  Гц), 8,35 (s, 1H), 8,15 (d, 1H,  $J=8,8$  Гц), 8,01 (d, 1H,  $J=10,0$  Гц), 7,92 (d, 1H,  $J=8,8$  Гц), 7,69 (s, 1H), 7,63 (d, 1H,  $J=8,8$  Гц), 6,92 (d, 1H,  $J=8,8$  Гц), 5,28 (m, 1H), 5,13 (m, 1H), 4,73 (bs, 1H), 4,61 (dd, 1H,  $J=5,6$  и 8,4 Гц), 4,51 (m, 2H), 4,30 (dd, 1H,  $J=8,8$  и 18,4 Гц), 4,12 (m, 1H), 4,04 (d, 1H,  $J=13,2$  Гц), 3,94 (d, 1H,  $J=13,2$  Гц), 3,92 (m, 1H), 3,86 (s, 3H), 3,35~3,75 (m, 14H), 3,05 (m, 1H), 2,92 (m, 3H), 2,49 (m, 4H), 2,00 (m, 1H), 1,39~1,65 (m, 8H), 1,37 (s, 9H), 1,15 (m, 1H), 0,93 (d, 3H,  $J=7,2$  Гц), 0,84 (m, 6H).

**Стадия 2:** TFA (1 мл) добавляли к 8 мг соединения **(A-4)** в 40-мл флаконе и полученный раствор оставляли отстояться при rt в течение 2 мин, а затем концентрировали под вакуумом с получением 6'-О-метил-7'-С-((4-аминобутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина **(A-5)**,




, который применяли без

дополнительной очистки. MS ( $m+1$ ) = 1050,4, RT пика при HPLC=0,635 минуты,  $^1\text{H}$ -ЯМР (MeOD- $d_4$ , 400 МГц)  $\delta$  8,87 (m, 1H), 8,58 (d, 1H,  $J=2,4$  Гц), 8,48 (d, 1H,  $J=10,4$  Гц), 8,44 (d, 1H,  $J=1,6$  Гц), 8,16 (d, 1H,  $J=8,4$  Гц), 7,97 (d, 1H,  $J=9,6$  Гц), 7,94 (d, 1H,  $J=9,2$  Гц), 7,62 (d, 1H,  $J=8,8$  Гц), 6,92 (d, 1H,  $J=9,2$  Гц), 5,25 (m, 1H), 5,13 (m, 1H), 4,73 (m, 1H), 4,60 (dd, 1H,  $J=5,6$  и 9,2 Гц), 4,49 (m,

2H), 4,28 (dd, 1H, J=8,8 и 18,4 Гц), 4,12 (m, 1H), 4,04 (d, 1H, J=13,2 Гц), 3,99 (s, 2H), 3,92 (m, 1H), 3,86 (s, 3H), 3,83 (s, 1H), 3,60~3,72 (m, 4H), 3,30~3,60 (m, 10H), 3,00~3,20 (m, 2H), 2,90 (m, 1H), 2,76 (m, 2H), 2,00 (m, 1H), 1,50~1,75 (m, 7H), 1,16 (d, 1H, J=5,6 Гц), 1,24 (d, 2H, J=7,6 Гц), 1,15 (m, 1H), 0,94 (d, 3H, J=6,8 Гц), 0,85 (m, 6H).

**Стадия 3.** Триэтиламин (3 мкл, 18 мкмоль) добавляли к раствору соединения **(A-5)** (7,5 мг, 7 мкмоль) и 4-нитрофенил-(23-(4-((2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)метил)-1H-1,2,3-триазол-1-ил)-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозил)карбамата (5,0 мг, 7 мкмоль) в DMF (1 мл) и реакционную смесь перемешивали при rt в течение 2 ч, очищали посредством HPLC и лиофилизировали с получением 6'-O-метил-7'-C-((4-(3-(23-((4-малеимида)метил-1H-1,2,3-триазол-1-ил)-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикозил)уреидо)бутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина **(C6)**. MS (m+2/2) = 803,5, RT пика при HPLC=0,834 минуты,  $^1\text{H-NMR}$  (MeOD-d<sub>4</sub>, 400 МГц)  $\delta$  10,76 (s, 1H), 8,84 (m, 1H), 8,59 (d, 1H, J=2,0 Гц), 8,49 (s, 1H), 8,47 (d, 1H, J=8,0 Гц), 8,15 (d, 1H, J=8,4 Гц), 8,01 (d, 1H, J=9,6 Гц), 7,92 (d, 1H, J=8,8 Гц), 7,90 (s, 1H), 7,63 (d, 1H, J=8,8 Гц), 6,92 (d, 1H, J=9,2 Гц), 6,79 (s, 2H), 5,28 (m, 1H), 5,13 (m, 1H), 4,74 (m, 1H), 4,71 (s, 2H), 4,62 (dd, 1H, J=5,2 и 9,6 Гц), 4,49 (m, 4H), 4,30 (dd, 1H, J=8,8 и 18,4 Гц), 4,14 (m, 1H), 4,04 (d, 1H, J=13,2 Гц), 3,94 (d, 1H, J=13,2 Гц), 3,92 (m, 1H), 3,85 (s, 3H), 3,80 (t, 2H, J=4,8 Гц), 3,35~3,75 (m, 38H), 2,90~3,10 (m, 4H), 2,92 (m, 1H), 2,40 (m, 4H), 2,01 (m, 1H), 1,38~1,65 (m, 6H), 1,15 (m, 1H), 0,94 (d, 3H, J=6,8 Гц), 0,85 (m, 6H).

Пример 7. Синтез тетрафторфенилового сложного эфира 6'-O-метил-7'-C-((4-(3-(карбоксии)пропанкарбоксамидо)бутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина **(C7)**




**(A-5)** (5 мг, 5 мкмоль) и DMF (1 мл) объединяли в 40-мл флаконе

с получением прозрачного раствора. Добавляли бис(2,3,5,6-тетрафторфенил)глутарат (2 мг, 5 мкмоль) и DIEA (4 мкл, 20 мкмоль). После этого реакционную смесь перемешивали при rt в течение 2 ч, реакционную смесь очищали посредством HPLC с получением тетрафторфенилового сложного эфира 6'-О-метил-7'-С-((4-(3-(карбокситрипропанкарбоксамидо)бутилтио)метил)- $\alpha$ -аманитина **(С-7)**. MS (m+1) = 1313,3, RT пика при HPLC=0,996 минуты,  $^1\text{H-NMR}$  (MeOD, 400 МГц)  $\delta$  10,78 (s, 1H), 8,85 (m, 1H), 8,59 (s, 1H), 8,49 (s, 1H), 8,47 (d, 1H, J=10,0 Гц), 8,35 (bs, 1H), 8,15 (d, 1H, J=8,0 Гц), 8,01 (d, 1H, J=9,6 Гц), 7,93 (d, 1H, J=8,8 Гц), 7,69 (bs, 1H), 7,63 (d, 1H, J=8,8 Гц), 7,36 (m, 1H), 6,92 (d, 1H, J=8,8 Гц), 5,27 (m, 1H), 5,14 (m, 1H), 4,75 (bs, 1H), 4,61 (dd, 1H, J=5,2 и 9,6 Гц), 4,51 (m, 2H), 4,30 (dd, 1H, J=8,4 и 18,0 Гц), 4,12 (m, 1H), 4,00 (d, 1H, J=13,2 Гц), 3,95 (d, 1H, J=13,2 Гц), 3,91 (m, 1H), 3,85 (s, 3H), 3,34~3,70 (m, 9H), 3,08 (m, 4H), 2,91 (m, 1H), 2,73 (t, 2H, J=14,4 Гц), 1,98 (t, 2H, J=7,6 Гц), 1,92~2,04 (m, 1H), 1,40~1,60 (m, 6H), 1,16 (m, 1H), 0,94 (d, 3H, J=6,8 Гц), 0,87 (m, 6H) ..

Другие соединения формулы (А), формулы (В), формулы (А-1), формулы (А-2), формулы (А-3), формулы (В-1), формулы (А-1а), формулы (А-2а), формулы (А-3а) или формулы (В-1а) можно получать с применением способов из примеров 1-7 и подходящих исходных материалов.

Пример 8. Получение линкера-полезной нагрузки МРЕТ.DM4



Аналитические способы

Если не указано иное, в Получении промежуточных соединений и Примерах применяли следующие способы HPLC и HPLC/MS.

Анализ LC/MS осуществляли на системе Agilent 1200sl/6140.

Колонка: Waters Acquity HSS T3 C18, 50×2,0, 1,8 мкм

Подвижная фаза: А) H<sub>2</sub>O+0,05% TFA; В: ацетонитрил+0,035% TFA

Параметры работы насоса:

Время	А%	В%	Расход (мл/мин)
0	90	10	0,9

1,35	0	100	0,9
1,36	0	100	0,9
1,95	0	100	0,9
1,96	90	10	0,9
2,0	90	10	0,9

Обнаружение: Дiodно-матричный УФ-детектор при 190 нм – 400 нм


Сканирование при MS: 200-1350 аму

ELSD: 60°C

Параметры MS:

Полярность	Положительная
Сушильный газ	12
Давление распылителя	50
Температура сушильного газа	350
Напряжение на капилляре	3000

(14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-хлор-14-гидрокси-85,14-диметокси-33,2,7,10-тетраметил-12,6-диоксо-7-аза-1(6,4)-оксазинана-3(2,3)-оксирана-8(1,3)-бензолациклотетрадекафан-10,12-диен-4-ил N-(4-((2-(3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)пропанамидо)этил)дисульфанил)-4-метилпентаноил)-N-метил-L-аланинат



Стадия 1. Получение (14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-хлор-14-гидрокси-85,14-диметокси-33,2,7,10-тетраметил-12,6-диоксо-7-аза-1(6,4)-оксазинана-3(2,3)-оксирана-8(1,3)-бензолациклотетрадекафан-10,12-диен-4-ил N-(4-((2-аминоэтил)дисульфанил)-4-метилпентаноил)-N-метил-L-аланината

К DM4 (480 мг, 0,62 ммоль), растворенному в PBS-буфере (10,5 мл) и безводном THF (21 мл), добавляли 2-(пиридин-2-илдисульфанил)этан-1-амин (151 мг, 0,68 ммоль) и DIEA (0,27 мл, 1,54 ммоль) при комнатной температуре. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 30 мин и концентрировали под вакуумом. Водный остаток разбавляли с помощью CH<sub>3</sub>CN (1 мл) и H<sub>2</sub>O (2 мл) и очищали посредством ISCO с обращенной фазой, элюировали с помощью 10-60% ацетонитрила в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, лиофилизировали с получением требуемого продукта (555 мг, выход 93%). <sup>1</sup>H ЯМР (400 МГц, MeOD-d<sub>4</sub>) δ ppm 0,83 (s, 3 H) 1,21 (d, J=5,0 Гц, 3 H) 1,25 (s, 3 H) 1,28 (s, 3 H) 1,30 (d, J=5,0 Гц, 3 H) 1,45-1,55 (m, 3 H) 1,67 (s, 3 H) 1,84-1,88 (m, 1 H) 1,95-2,01 (m, 1 H) 2,14 (dd, J=5,0 и 15,0 Гц, 1 H) 2,37-2,43 (m, 1 H) 2,53-2,59 (m, 1 H) 2,64 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) 2,82-2,89 (m, 5 H) 2,91 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 3,16 (dd, J=5,0 и 10,0 Гц, 2 H) 3,20 (s, 3 H) 3,23 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 3,35 (s, 3 H) 3,55 (d, J=5,0 Гц, 1 H) 3,58 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 4,15-4,20 (m, 1 H) 4,64 (dd, J=5,0 и 10,0 Гц, 1 H) 5,43 (q, J=5,0 Гц, 2 H) 5,66 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) 6,58 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) 6,65 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 6,66 (s, 1 H) 7,11 (bs, 1H) 7,28 (bs, 1H); MS масса/заряд 855,3 (M+H), Время удерживания 0,988 минуты.

Стадия 2. Получение (14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-хлор-14-гидрокси-85,14-диметокси-33,2,7,10-тетраметил-12,6-диоксо-7-аза-1(6,4)-оксазинана-3(2,3)-оксирана-8(1,3)-бензолациклотетрадекафан-10,12-диен-4-ил N-(4-((2-(3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)пропанамидо)этил)дисульфанил)-4-метилпентаноил)-N-метил-L-аланината.

К (14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-хлор-14-гидрокси-85,14-диметокси-33,2,7,10-тетраметил-12,6-диоксо-7-аза-1(6,4)-оксазинана-3(2,3)-оксирана-8(1,3)-бензолациклотетрадекафан-10,12-диен-4-ил N-(4-((2-аминоэтил)дисульфанил)-4-метилпентаноил)-N-метил-L-аланинату (555 мг, 0,57 ммоль), растворенному в безводном DMSO (7 мл), добавляли 2,5-диоксопирролидин-1-ил 3-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-1-ил)пропаноат (171 мг, 0,63 ммоль) и DIEA (249 мл, 1,43 ммоль) при комнатной температуре. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 15 мин и нейтрализовали с применением TFA. Смесь охлаждали до 0°C с помощью бани со льдом, с последующим добавлением CH<sub>3</sub>CN (2 мл) и H<sub>2</sub>O (7 мл), а затем очищали


посредством ISCO с обращенной фазой, элюируя с помощью 10–70% ацетонитрила в H<sub>2</sub>O, содержащей 0,05% TFA. Фракции, содержащие требуемый продукт, лиофилизировали с получением требуемого продукта (430 мг, выход 66%). <sup>1</sup>H ЯМР (400 МГц, CDCl<sub>3</sub>) δ ppm 0,81 (s, 3 H) 1,23 (s, 3 H) 1,24 (s, 3 H) 1,25 (s, 1 H) 1,28 (d, J=5,0 Гц, 3 H) 1,31 (d, J=5,0 Гц, 3 H) 1,43–1,49 (m, 1 H) 1,61 (d, J=15,0 Гц, 1 H) 1,64 (s, 3 H) 1,81–1,87 (m, 1 H) 1,94–2,01 (m, 1 H) 2,19 (dd, J=5,0 и 15,0 Гц, 1 H) 2,30–2,36 (m, 1 H) 2,54 (t, J=5,0 Гц, 2 H) 2,61 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) 2,70 (t, J=5,0 Гц, 2 H) 2,88 (s, 3 H) 3,00 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 3,13 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 3,21 (s, 3 H) 3,55 (s, 3 H) 3,45 (q, J=5,0 Гц, 2 H) 3,49 (d, J=5,0 Гц, 1 H) 3,62 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 3,83 (t, J=5,0 Гц, 1 H) 3,98 (s, 3 H) 4,32 (m, 1 H) 4,8=5,0 и 10,0 Гц, 1 H) 5,28 (d, J=5,0 Гц, 1 H) 5,66 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) ) 6,22 (bs, 1 H) 6,42 (dd, J=10,0 и 15,0 Гц, 1 H) 6,50 (s, 1 H) 6,63 (s, 1 H) 6,66 (d, J=10,0 Гц, 1 H) 6,70 (s, 2H) 6,83(s, 1H); MS масса/заряд 988,3 (M+H-H<sub>2</sub>O), Время удерживания 1,145 минуты.

### 3. Конъюгация и получение ADC

Способы получения конъюгата антитела формулы (I)

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (I) показана на схеме 1 ниже:

Схема 1




где: RG<sub>1</sub> представляет собой реакционноспособную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой реакционноспособной группой, RG<sub>2</sub>, присоединенной к фрагменту, представляющему собой линкер-лекарственное средство, обеспечивая тем самым ковалентную связь фрагмента антитела, А, с одним или несколькими фрагментами, представляющими собой линкер-лекарственное средство. Неограничивающими примерами таких реакций с участием групп RG<sub>1</sub> и RG<sub>2</sub> является малеимидная группа (RG<sub>2</sub>), реагирующая с тиольной группой (RG<sub>1</sub>) с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа (RG<sub>2</sub>), реагирующая с кетонной группой (RG<sub>1</sub>) с получением оксима.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (II) показана на схеме 2 ниже:

Схема 2






где: L<sub>20</sub> представляет собой -L<sub>1</sub>R<sup>40</sup>; R<sup>4</sup> представляет собой -L<sub>1</sub>R<sup>14</sup>, -L<sub>2</sub>R<sup>24</sup> или -L<sub>2</sub>R<sup>34</sup>, а RG<sub>1</sub> представляет собой реакцию способную группу, которая реагирует с совместимой группой R<sup>14</sup>, R<sup>24</sup> или R<sup>34</sup> соединения формулы (A-1) с образованием соответствующей группы R<sup>40</sup>. В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетоновой с получением оксима. А, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, R<sup>14</sup>, R<sup>24</sup>, R<sup>34</sup> и R<sup>40</sup> являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (C-1a) показана на схеме 5 ниже:


Схема 5



где: L<sub>20</sub> представляет собой -L<sub>1</sub>R<sup>40</sup>; R<sup>4</sup> представляет собой -L<sub>1</sub>R<sup>14</sup>, -L<sub>2</sub>R<sup>24</sup> или -L<sub>2</sub>R<sup>34</sup> и RG<sub>1</sub> представляет собой реакцию способную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетоновую, которая реагирует с совместимой группой R<sup>14</sup>, R<sup>24</sup> или R<sup>34</sup> соединения формулы (A-1a) с образованием соответствующей группы R<sup>40</sup>. В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетоновой с получением оксима. А, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, R<sup>14</sup>, R<sup>24</sup>, R<sup>34</sup> и R<sup>40</sup> являются такими, как определено в данном документе.


Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (D) показана на схеме 6 ниже:

Схема 6



где:  $L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ ;  $R^3$  представляет собой  $-L_5R^{14}$ , а  $RG_1$  представляет собой реакционноспособную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$  соединения формулы (A) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима. А,  $R^2$ ,  $L_5$ ,  $R^{14}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.


Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (D-1) показана на схеме 7 ниже:



где:  $L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ , а  $RG_1$  представляет собой реакционноспособную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$  соединения формулы (A-2) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима. А,  $L_5$ ,  $R^{14}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.


Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (D-1a) показана на схеме 8 ниже:

Схема 8




где:  $L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ , а  $RG_1$  представляет собой реакцию способную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$  соединения формулы (А-2) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима. А,  $L_5$ ,  $R^{14}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (D-2) показана на схеме 9 ниже:



где:  $L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ , а  $RG_1$  представляет собой реакцию способную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$  соединения формулы (А-3) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима. А,  $L_5$ ,  $R^{14}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (D-2а) показана на схеме 10 ниже:




где:  $L_{30}$  представляет собой  $-L_5R^{40}$ , а  $RG_1$  представляет собой реакцию способную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с

совместимой группой  $R^{14}$  соединения формулы (А-3а) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетоновой с получением оксима.

А,  $L_5$ ,  $R^{14}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (Е) показана на схеме 11 ниже:


Схема 11



где:  $L_{40}$  представляет собой  $-L_6R^{40}$ ;  $R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ,  $-L_7R^{24}$  или  $-L_7R^{34}$  и  $RG_1$  представляет собой реакцию способную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетоновую, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$ ,  $R^{24}$  или  $R^{34}$  соединения формулы (В) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетоновой с получением оксима. А, X,  $R^5$ ,  $R^6$ ,  $L_6$ ,  $L_7$ ,  $R^{14}$ ,  $R^{24}$ ,  $R^{34}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (Е-1) показана на схеме 12 ниже:


Схема 12



где:  $L_{40}$  представляет собой  $-L_6R^{40}$ ;  $R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ,  $-L_7R^{24}$  или  $-L_7R^{34}$  и  $RG_1$  представляет собой реакционноспособную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$ ,  $R^{24}$  или  $R^{34}$  соединения формулы (B-1) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима.  $A$ ,  $y$ ,  $R^5$ ,  $R^6$ ,  $L_6$ ,  $L_7$ ,  $R^{14}$ ,  $R^{24}$ ,  $R^{34}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.

Общая схема реакции образования конъюгатов формулы (E-1a) показана на схеме 13 ниже:


Схема 13



где:  $L_{40}$  представляет собой  $-L_6R^{40}$ ;  $R^{54}$  представляет собой  $-L_6R^{14}$ ,  $-L_7R^{24}$  или  $-L_7R^{34}$  и  $RG_1$  представляет собой реакционноспособную группу, исключительно в качестве примера тиольную, или аминную, или кетонную, которая реагирует с совместимой группой  $R^{14}$ ,  $R^{24}$  или  $R^{34}$  соединения формулы (B-1a) с образованием соответствующей группы  $R^{40}$ . В качестве примера, малеимидная группа реагирует с тиольной с получением сукцинимидного кольца, или гидроксилламинная группа реагирует с кетонной с получением оксима.  $A$ ,  $y$ ,  $R^5$ ,  $R^6$ ,  $L_6$ ,  $L_7$ ,  $R^{14}$ ,  $R^{24}$ ,  $R^{34}$  и  $R^{40}$  являются такими, как определено в данном документе.


Общая схема реакции образования конъюгатов, содержащих майтанзиноидный фрагмент, показана на схеме 14 ниже:

Схема 14



где один или несколько NHS-сложных эфиров одного или нескольких линкеров-полезных нагрузок реагируют с одним или несколькими свободными аминами на А (т. е.  $(A'-(NH_2)_y)$ , с образованием тем самым конъюгата. А является таким, как определено в данном документе, а А' представляет собой часть А, которая не содержит фрагмент, представляющий собой свободный амин.


Общая схема реакции образования конъюгатов, содержащих майтанзиноидный фрагмент, показана на схеме 15 ниже:



где один или несколько NHS-сложных эфиров одного или нескольких линкеров-полезных нагрузок реагируют с одним или несколькими свободными аминами на А (т. е.  $(A'-(NH_2)_y)$ , с образованием тем самым конъюгата. А является таким, как определено в данном документе, а А' представляет собой часть А, которая не содержит фрагмент, представляющий собой свободный амин.


Общая схема реакции образования конъюгатов, содержащих

майтанзиноидный фрагмент, показана на схеме 16 ниже:



где один или несколько NHS-сложных эфиров одного или нескольких линкеров-полезных нагрузок реагируют с одним или несколькими свободными аминами на А (т. е.  $(A'-(NH_2)_y)$ , с образованием тем самым конъюгата. А является таким, как определено в данном документе, а  $A'$  представляет собой часть А, которая не содержит фрагмент, представляющий собой свободный амин.

Общая схема реакции образования конъюгатов, содержащих мaitанзиноидный фрагмент, показана на схеме 17 ниже:



где один или несколько малеимидов одного или нескольких линкеров-полезных нагрузок реагируют с одним или несколькими свободными тиолами на А (т. е.  $(A'-(SH)_y)$ , с образованием тем самым конъюгата. А является таким, как определено в данном документе, а  $A'$  представляет собой часть А, которая не содержит фрагмент, представляющий собой свободный тиол.

#### **4. Определение характеристик и отбор требуемых ADC к cKIT**

##### **Определение DAR и агрегация ADC**

Значение DAR ADC к cKIT оценивали посредством жидкостной хроматографии–масс–спектрометрии (LC–MS). Отношение соединения–к–антителу экстраполировали на основании данных LC–MS для восстановленных и дегликозилированных образцов (в соответствующих случаях, т. е. если включена Fc). LC–MS обеспечивает возможность получения количественной оценки среднего количества молекул линкер–полезная нагрузка (соединение), присоединенных к антителу в образце конъюгата.

Конъюгаты антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению оценивали с применением аналитических способов. Такие аналитическая методология и результаты могут продемонстрировать, что конъюгаты обладают благоприятными свойствами, например, свойствами, которые смогут облегчить их изготовление, облегчить введение пациентам, сделают их более эффективными и/или потенциально более безопасными для пациентов. Одним примером является определение молекулярного размера посредством эксклюзионной хроматографии (SEC), где количество требуемых молекул антитела в образце определено относительно количества высокомолекулярных загрязнителей (например, димера, мультимера или агрегированного антитела) или низкомолекулярных загрязнителей (например, фрагментов антител, продуктов распада или отдельных цепей антитела), присутствующих в образце. Обычно, желательно, например, чтобы они имели более высокие количества мономера и более низкие количества агрегированного антитела, например, вследствие воздействия агрегатов на другие свойства образца антитела, такие как без ограничения скорость выведения, иммуногенность и токсичность. Дополнительным примером является определение гидрофобности посредством хроматографии гидрофобных взаимодействий (HIC), где гидрофобность образца оценивают относительно набора стандартных антител с известными свойствами. Обычно, желательно, чтобы они характеризовались низкой гидрофобностью, вследствие воздействия гидрофобности на другие свойства образца антитела, такие как без ограничения агрегация, агрегация с течением времени, прилипание к поверхности, гепатотоксичность, скорости выведения и фармакокинетический профиль. См. Damle, N.K., Nat Biotechnol. 2008; 26(8):884–885; Singh, S.K., Pharm Res. 2015; 32(11):3541–71.

##### **Отбор ADC к cKIT**

Для отбора ADC к cKIT, подходящих для применения в способах, описанных в данном документе, можно применять *in vitro* анализ цитолиза человеческих гемопоэтических стволовых клеток для проведения скрининга ADC к cKIT в отношении их эффективности и активности. Например, способы, описанные в примере 5, можно применять для проведения скрининга ADC к cKIT. Подходящие ADC к cKIT могут отбираться на основе EC50, например, ADC к cKIT с EC50, составляющей менее 500 мкг/мл, например, менее 100 мкг/мл, менее 50 мкг/мл, менее 10 мкг/мл или менее 5 мкг/мл.

Кроме того, сообщалось, что cKIT экспрессируется на мастоцитах, а фактор роста стволовых клеток (SCF), лиганд cKIT, индуцирует непосредственную дегрануляцию перитонеальных крысиных мастоцитов *in vitro* и *in vivo* (Taylor et al., Immunology. 1995 Nov;86(3):427-33). SCF также индуцирует дегрануляцию человеческих мастоцитов *in vivo* (Costa et al., J Exp Med. 1996; 183(6): 2681-6). Чтобы избежать потенциальных вредных эффектов, вызванных дегрануляцией мастоцитов у реципиентов трансплантации, отбираемые ADC к cKIT можно тестировать в отношении их способности индуцировать дегрануляцию мастоцитов *in vitro*. Например, эксперименты, описанные в примере 6, можно применять для проведения скрининга ADC к cKIT и подходящие ADC к cKIT можно отбирать на основании минимальной дегрануляции мастоцитов, например, скорректированной по исходному уровню регистрируемой величины O.D, составляющей менее 0,25, например, менее 0,2, менее 0,15 или менее 0,1, в анализе высвобождения бета-гексозаминазы.

#### Антитело и фрагменты антител к cKIT

В настоящем изобретении предусмотрены антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты), которые специфически связываются с cKIT человека. Антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты) по настоящему изобретению включают без ограничения человеческие моноклональные антитела или их фрагменты, описанные ниже.

В некоторых вариантах осуществления раскрытые в настоящем изобретении антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты) к cKIT характеризуются сниженной способностью вызывать дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, в сравнении с полноразмерным антителом к cKIT. В некоторых вариантах осуществления антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты) к cKIT, раскрытые в данном

документе, модифицированы, чтобы характеризоваться сниженной способностью индуцировать дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы. Например, антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты) к сКІТ, раскрытые в данном документе, модифицированы, чтобы характеризоваться сниженной способностью индуцировать дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, то есть она снижена на приблизительно или по меньшей мере 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% в сравнении с полноразмерным антителом или его фрагментом  $F(ab')_2$  или  $F(ab)_2$  к сКІТ. В некоторых вариантах осуществления антитела или фрагменты антитела (например, антигенсвязывающие фрагменты) к сКІТ, раскрытые в данном документе, могут содержать фрагмент Fab или Fab' к сКІТ. В некоторых вариантах осуществления антитела или фрагменты антител (например, антигенсвязывающие фрагменты) к сКІТ, раскрытые в данном документе, могут характеризоваться минимальной активностью индуцирования дегрануляции мастоцитов, например, скорректированной по исходному уровню регистрируемой величиной O.D., составляющей менее 0,25, например, менее 0,2, менее 0,15 или менее 0,1, в анализе высвобождения тексозаминидазы, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы.

Конъюгаты антитела и лекарственного средства, предусмотренные в данном документе, включают фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), связывающий сКІТ человека. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела и лекарственного средства, предусмотренные в данном документе, включают фрагмент человеческого или гуманизированного антитела (например, Fab или Fab'), который специфически связывается с сКІТ человека. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела и лекарственного средства, предусмотренные в данном документе, включают человеческий или гуманизированный Fab', который специфически связывается с сКІТ человека. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела и лекарственного средства, предусмотренные в данном документе, включают человеческий или гуманизированный Fab, который специфически связывается с сКІТ человека.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сКІТ человека, содержат домен VH, имеющий

аминокислотную последовательность любого из доменов VH, описанных в таблице 1 (например, SEQ ID NO: 10, 36, 54, 69, 95). Другие подходящие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут содержать домен VH, который характеризуется по меньшей мере 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, или 99 процентной идентичностью последовательности с любым из доменов VH, описанных в таблице 1.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат CDR VH (или HCDR), имеющую аминокислотную последовательность любой из CDR VH (или HCDR), перечисленных в таблице 1. В конкретных аспектах настоящего изобретения предусмотрены антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), содержащие (или в качестве альтернативы состоящие из) один, два, три, четыре, пять или более CDR VH (или HCDR), имеющих аминокислотную последовательность любой из CDR VH (или HCDR), перечисленных в таблице 1.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат домен VL, имеющий аминокислотную последовательность любого из доменов VL, описанных в таблице 1 (например, SEQ ID NO: 23, 47, 82, 108). Другие подходящие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут содержать домен VL, который характеризуется по меньшей мере 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, или 99 процентной идентичностью последовательности с любым из доменов VL, описанных в таблице 1.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат CDR VL (или LCDR), имеющую аминокислотную последовательность любой из CDR VL (или LCDR), перечисленных в таблице 1. В конкретных аспектах настоящего изобретения предусмотрены антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), содержащие (или в качестве альтернативы состоящие из) один, два, три, четыре, пять или более CDR VL (или LCDR), имеющих аминокислотную последовательность любой из CDR VL (или LCDR), перечисленных в таблице 1.

Другие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к cKIT, раскрытые в данном документе, содержат аминокислоты, которые были подвергнуты мутации, но при этом они все еще характеризуются по меньшей мере 60, 70, 80, 90 или 95 процентной идентичностью последовательностей в областях CDR с областями CDR,

отраженными в последовательностях, описанных в таблице 1. В некоторых аспектах они содержат мутантные аминокислотные последовательности, в которых не более 1, 2, 3, 4 или 5 аминокислот были подвергнуты мутации в областях CDR в сравнении с областями CDR, отраженными в последовательности, описанной в таблице 1.

В настоящем изобретении также предусмотрены последовательности нуклеиновой кислоты, которые кодируют VH, VL, тяжелую цепь и легкую цепь антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека. Такие последовательности нуклеиновой кислоты могут быть оптимизированы для экспрессии в клетках млекопитающих.

**Таблица 1. Последовательности иллюстративных антител и фрагментов антител к cKIT**

Ab1/Fab1/Fab'1 к cKIT			
SEQ NO: 1	ID	HCDR1 (Kabat)	SYAIS
SEQ NO: 2	ID	HCDR2 (Kabat)	VIFPAEGAPGYAQKFQG
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (Kabat)	GGYISDFDV
SEQ NO: 4	ID	HCDR1 (Chothia)	GGTFSSY
SEQ NO: 5	ID	HCDR2 (Chothia)	FPAEGA
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (Chothia)	GGYISDFDV
SEQ NO: 6	ID	HCDR1 (комбинированная)	GGTFSSY AIS
SEQ NO: 2	ID	HCDR2 (комбинированная)	VIFPAEGAPGYAQKFQG
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (комбинированная)	GGYISDFDV
SEQ ID	ID	HCDR1 (IMGT)	GGTFSSYA

NO: 7		
SEQ ID NO: 8	HCDR2 (IMGT)	IFPAEGAP
SEQ ID NO: 9	HCDR3 (IMGT)	ARGGYISDFDV
SEQ ID NO: 10	VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSYAI SWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYISDFDVWGQG TLVTVSS
SEQ ID NO: 11	ДHK VH	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG CGCCAGGCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG TTATCTTCCCGGCTGAAGGCGCTCCGGTTACGCCCA GAAATTCAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA AGCACCAGCACCGCCTATATGGAAGT GAGCAGCCTGC GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC ACCCTGGT GACTGTTAGCTCA
SEQ ID NO: 12	HC Ab	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSYAI SWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYISDFDVWGQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD KTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPE VTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQ YNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPI EKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLV KGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFL YSKLTVDKSRWQQGNV FSCSVMHEALHNHYTQKLSLSL SPGK
SEQ ID NO: 13	ДHK HC Ab	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG

				<p>CGCCAGGCCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG  TTATCTTCCCGGCTGAAGGCGCTCCGGGTACGCCCA  GAAATTTAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCGCCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC  GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG  TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC  ACCTGGTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCC  CCAGCGTGTTCCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTAC  TTCCGGCGGAACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAG  GACTACTTCCCCGAGCCCGTGACAGTGTCTTGGAACT  CTGGGGCTCTGACTTCCGGCGTGACACCTTCCCCGC  CGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGC  GTGGTGACAGTGGCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGA  CCTATATCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACAC  CAAGGTGGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGAC  AAGACCCACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAAC  TGCTGGGAGGGCCTTCCGTGTTCTGTCCCCCCCAA  GCCCAAGGACACCCTGATGATCAGCAGGACCCCGAG  GTGACCTGCGTGGTGGTGGACGTGTCCCACGAGGACC  CAGAGGTGAAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGA  GGTGCACAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAG  TACAACAGCACCTACAGGGTGGTGTCCGTGCTGACCG  TGCTGCACCAGGACTGGCTGAACGGCAAAGAATACAA  GTGCAAAGTCTCCAACAAGGCCCTGCCAGCCCCAATC  GAAAAGACAATCAGCAAGGCCAAGGGCCAGCCACGGG  AGCCCCAGGTGTACACCCTGCCCCCAGCCGGGAGGA  GATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTGACCTGTCTGGTG  AAGGGCTTCTACCCAGCGATATCGCCGTGGAGTGGG  AGAGCAACGGCCAGCCCAGAACAACTACAAGACCAC  CCCCCAGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCTG  TACAGCAAGCTGACCGTGGACAAGTCCAGGTGGCAGC  AGGGCAACGTGTTTACAGCTGCAGCGTGATGCACGAGGC  CCTGCACAACCCTACACCCAGAAGTCCCTGAGCCTG  AGCCCCGGCAAG</p>
SEQ	ID	HC	(EU236)	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAIISWV

NO: 14	Fab'	RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFDVGWQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSKVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVEPKSCD KTHTCPPCPAPELLG
SEQ ID NO: 15	ДНК HC Fab'	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG CGCCAGGCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG TTATCTTCCCGGCTGAAGGCGCTCCGGGTTACGCCCA GAAATTTCAAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA AGCACCAGCACCCGCCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC ACCCTGGTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCC CCAGCGTGTTCCTCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTAC TTCCGGCGGAACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAG GACTACTTCCCCGAGCCCGTGACAGTGTCTGGAAGT CTGGGGCTCTGACTTCCGGCGTGCACACCTTCCCCGC CGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGC GTGGTGACAGTGCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGA CCTATATCTGCAACGTGAACCACAAGCCAGCAACAC CAAGGTGGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGAC AAGACCCACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAAC TGCTGGGA
SEQ ID NO: 118	Cys- HC (EU221) -HC- E152C (EU) Fab	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFDVGWQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPCPVTVSWNSGALTSKVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVEPKSCD
SEQ ID NO: 119	HC (EU230) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFDVGWQG

		TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD KTHTCPPCP
SEQ ID NO: 120	HC (EU232) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVCKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYISDFDVGQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD KTHTCPPCPAP
SEQ ID NO: 121	HC (EU236) -Pro Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVCKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGVI FPAEGAPGYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGGYISDFDVGQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD KTHTCPPCPAPELLGP
SEQ ID NO: 16	LCDR1 (Kabat)	RASQISISNYLA
SEQ ID NO: 17	LCDR2 (Kabat)	DASSLQS
SEQ ID NO: 18	LCDR3 (Kabat)	QYYYESIT
SEQ ID NO: 19	LCDR1 (Chothia)	SQISISNY
SEQ ID NO: 20	LCDR2 (Chothia)	DAS
SEQ ID NO: 21	LCDR3 (Chothia)	YYYESI
SEQ ID NO: 16	LCDR1 (комбинирован ная)	RASQISISNYLA
SEQ ID NO: 17	LCDR2 (комбинирован	DASSLQS

		ная)	
SEQ ID NO: 18		LCDR3 (комбинированная)	QYYYESIT
SEQ ID NO: 22		LCDR1 (IMGT)	QSIISNY
SEQ ID NO: 20		LCDR2 (IMGT)	DAS
SEQ ID NO: 18		LCDR3 (IMGT)	QYYYESIT
SEQ ID NO: 23		VL (каппа-цепь)	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSIISNYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQYYYESITFGQGTKVEIK
SEQ ID NO: 24		ДНК VL	GATATCCAGATGACCCAGAGCCCAGCAGCCTGAGCG CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC CAGCCAGTCTATTTCTAACTACCTGGCTTGGTACCAG CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCCTGACC ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGACCTATT ATTGCCAGCAGTACTACTACGAATCTATCACCTTTGG CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAA
SEQ ID NO: 25		LC (каппа-цепь) Ab/Fab'	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSIISNYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APSVFI FPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC
SEQ ID NO: 26		ДНК LC Ab/Fab'	GATATCCAGATGACCCAGAGCCCAGCAGCCTGAGCG CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC CAGCCAGTCTATTTCTAACTACCTGGCTTGGTACCAG CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCCTGACC ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGACCTATT

		ATTGCCAGCAGTACTACTACGAATCTATCACCTTTGG CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAACGTACGGTGGCC GCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCCCAGCGACGAGC AGCTGAAGAGTGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCT GAACAACCTTCTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGG AAGGTGGACAACGCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGG AGAGCGTCACCGAGCAGGACAGCAAGGACTCCACCTA CAGCCTGAGCAGCACCCCTGACCCTGAGCAAGGCCGAC TACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTGCGAGGTGACCC ACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAGCTTCAA CAGGGGCGAGTGC
SEQ ID NO: 122	Cys-LC-E165C (EU) Fab	DIQMTQSPSSLSASVGRVTITCRASQISNYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTCQDSKDYSLSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 123	Cys-LC-S114C (EU) Fab	DIQMTQSPSSLSASVGRVTITCRASQISNYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APCVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
<b>Ab2/Fab2/Fab'2 κ cKIT</b>		
SEQ ID NO: 27	HCDR1 (Kabat)	SHALS
SEQ ID NO: 28	HCDR2 (Kabat)	GIIPSFGTADYAQKFQG
SEQ ID NO: 29	HCDR3 (Kabat)	GLYDFDY
SEQ ID NO: 30	HCDR1 (Chothia)	GGTFSSH
SEQ ID NO: 31	HCDR2 (Chothia)	IPSFGT
SEQ ID	HCDR3	GLYDFDY

NO: 29	(Chothia)	
SEQ ID NO: 32	HCDR1 (комбинированная)	GGTFSSHALS
SEQ ID NO: 28	HCDR2 (комбинированная)	GIIPSGTADYAQKFQG
SEQ ID NO: 29	HCDR3 (комбинированная)	GLYDFDY
SEQ ID NO: 33	HCDR1 (IMGT)	GGTFSSHA
SEQ ID NO: 34	HCDR2 (IMGT)	IIPSGTA
SEQ ID NO: 35	HCDR3 (IMGT)	ARGLYDFDY
SEQ ID NO: 36	VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSHALS SWVRQAPGQGLEWMGGIIPSGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGLT VTVSS
SEQ ID NO: 37	ДНК VH	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC CGGAGGGACGTTTTCTTCTCATGCTCTGTCTTGGGTG CGCCAGGCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG GTATCATCCCGTCTTTTCGGCACTGCGGACTACGCCCA GAAATTTCAAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA AGCACCAGCACCCGCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG TCTGTACGACTTCGACTACTGGGGCCAAGGCACCCTG GTGACTGTTAGCTCA
SEQ ID NO: 38	HC Ab	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSHALS SWVRQAPGQGLEWMGGIIPSGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGLT VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV

		<p>TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVPEPKSCDKT  HTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVT  CVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYN  STYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEK  TISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKG  FYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYS  KLTVDKSRWQQGNVFSVCSVMHEALHNHYTQKSLSLSP  GK</p>
<p>SEQ ID  NO: 39</p>	<p>ДНК HC Ab</p>	<p>CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA  AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC  CGGAGGGACGTTTTCTTCTCATGCTCTGTCTTGGGTG  CGCCAGGCCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG  GTATCATCCCGTCTTTCGGCACTGCGGACTACGCCCA  GAAATTCAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCGCCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC  GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG  TCTGTACGACTTCGACTACTGGGGCCAAGGCACCCTG  GTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCCCCAGCG  TGTTCCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTACTTCCGG  CGGAAGTGTGTCCTGGGTGCCTGGTGAAGGACTAC  TTCCCCGAGCCCGTGACAGTGTCTGGAAGTCTGGGG  CTCTGACTTCCGGCGTGACACCTTCCCCGCCGTGCT  GCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGTGGTG  ACAGTGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGACCTATA  TCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGT  GGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGACAAGACC  CACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAAGTGTGG  GAGGGCCTTCCGTGTTCTGTTCCTGTTCCCCCAAGCCAA  GGACACCCTGATGATCAGCAGGACCCCCGAGGTGACC  TGCGTGGTGGTGGACGTGTCCCACGAGGACCCAGAGG  TGAAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGTGCA  CAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAGTACAAC  AGCACCTACAGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGTGCTGC  ACCAGGACTGGCTGAACGGCAAAGAATACAAGTGCAA  AGTCTCCAACAAGGCCCTGCCAGCCCCAATCGAAAAG</p>

				<p>ACAATCAGCAAGGCCAAGGGCCAGCCACGGGAGCCCC  AGGTGTACACCCTGCCCCCAGCCGGGAGGAGATGAC  CAAGAACCAGGTGTCCCTGACCTGTCTGGTGAAGGGC  TTCTACCCCAGCGATATCGCCGTGGAGTGGGAGAGCA  ACGGCCAGCCCGAGAACAACACTACAAGACCACCCCCC  AGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTGTACAGC  AAGCTGACCGTGGACAAGTCCAGGTGGCAGCAGGGCA  ACGTGTTTACAGCTGCAGCGTGATGCACGAGGCCCTGCA  CAACCACTACACCAGAAAGTCCCTGAGCCTGAGCCCC  GGCAAG</p>
SEQ NO: 40	ID	HC Fab'	(EU236)	<p>QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSHALSWV  RQAPGQGLEWMGGIIPSGTADYAQKFQGRVTITADE  STSTAYMELSSLRSEDYAVYYCARGLYDFDYWGQGL  VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGLVKDY  FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSV  TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKT  HTCPPCPAPELLG</p>
SEQ NO: 41	ID	ДНК HC Fab'		<p>CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA  AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC  CGGAGGGACGTTTTCTTCTCATGCTCTGTCTTGGGTG  CGCCAGGCCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCG  GTATCATCCCGTCTTTTCGGCACTGCGGACTACGCCCA  GAAATTTTACGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCGCCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC  GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG  TCTGTACGACTTCGACTACTGGGGCCAAGGCACCCTG  GTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCCCCAGCG  TGTTCCTCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTACTTCCGG  CGGAACTGCTGCCCTGGGTTCCTGGTGAAGGACTAC  TTCCCGAGCCCGTGACAGTGTCTTGGAACTCTGGGG  CTCTGACTTCCGGCGTGCACACCTTCCCGCCGTGCT  GCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGTGGTG  ACAGTGCCCTCCAGCTCTTGGGAACCCAGACCTATA  TCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGT  GGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGACAAGACC</p>

		CACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAACTGCTGG GA
SEQ ID NO: 124	Cys- HC (EU221) -HC- E152C (EU) Fab	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSHALSWV RQAPGQGLEWMGGIIP SFGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGTL VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY FPCPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD
SEQ ID NO: 125	HC (EU230) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSHALSWV RQAPGQGLEWMGGIIP SFGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGTL VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKT HTCPPCP
SEQ ID NO: 126	HC (EU232) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSHALSWV RQAPGQGLEWMGGIIP SFGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGTL VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKT HTCPPCPAP
SEQ ID NO: 127	HC (EU236) -Pro Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSHALSWV RQAPGQGLEWMGGIIP SFGTADYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDTAVYYCARGLYDFDYWGQGTL VTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDY FPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVV TVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKT HTCPPCPAPPELLGP
SEQ ID NO: 42	LCDR1 (Kabat)	RASQDISQDLA
SEQ ID NO: 17	LCDR2 (Kabat)	DASSLQS
SEQ ID NO: 43	LCDR3 (Kabat)	QQYYL PST

SEQ NO: 44	ID	LCDR1 (Chothia)	SQDISQD
SEQ NO: 20	ID	LCDR2 (Chothia)	DAS
SEQ NO: 45	ID	LCDR3 (Chothia)	YYYLPS
SEQ NO: 42	ID	LCDR1 (комбинированная)	RASQDISQDLA
SEQ NO: 17	ID	LCDR2 (комбинированная)	DASSLQS
SEQ NO: 43	ID	LCDR3 (комбинированная)	QQYYLPS
SEQ NO: 46	ID	LCDR1 (IMGT)	QDISQD
SEQ NO: 20	ID	LCDR2 (IMGT)	DAS
SEQ NO: 43	ID	LCDR3 (IMGT)	QQYYLPS
SEQ NO: 47	ID	VL (каппа-цепь)	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDISQDLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFAVYYCQQYYLPSYFGQGTKVEIK
SEQ NO: 48	ID	ДНК VL	GATATCCAGATGACCCAGAGCCGAGCAGCCTGAGCG CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC CAGCCAGGACATTTCTCAGGACCTGGCTTGGTACCAG CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCTGACC ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGGTGTATT ATTGCCAGCAGTACTACTACCTGCCGTCTACCTTTGG CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAA
SEQ NO: 49	ID	LC (каппа-цепь) Ab/Fab'	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDISQDLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT

				<p>ISSLQPEDFAVYYCQYYLPLSTFGQGTKVEIKRTVA          APSVFI FPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW          KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD          YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC</p>
SEQ NO: 50	ID	ДНК Ab/Fab'	LC	<p>GATATCCAGATGACCCAGAGCCCGAGCAGCCTGAGCG          CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC          CAGCCAGGACATTTCTCAGGACCTGGCTTGGTACCAG          CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG          ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT          TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCCTGACC          ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGGTGTATT          ATTGCCAGCAGTACTACTACCTGCCGTCTACCTTTGG          CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAACGTACGGTGGCC          GCTCCAGCGTGTTTCATCTTCCCCCAGCGACGAGC          AGCTGAAGAGTGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCT          GAACAACCTTCTACCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGG          AAGGTGGACAACGCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGG          AGAGCGTCACCGAGCAGGACAGCAAGGACTCCACCTA          CAGCCTGAGCAGCACCCCTGACCCTGAGCAAGGCCGAC          TACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTGCGAGGTGACCC          ACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAGCTTCAA          CAGGGGCGAGTGC</p>
SEQ NO: 128	ID	Cys-LC-E165C (EU) Fab		<p>DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRASQDISQDLAWYQ          QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT          ISSLQPEDFAVYYCQYYLPLSTFGQGTKVEIKRTVA          APSVFI FPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW          KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD          YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC</p>
SEQ NO: 129	ID	Cys-LC-S114C (EU) Fab		<p>DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRASQDISQDLAWYQ          QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT          ISSLQPEDFAVYYCQYYLPLSTFGQGTKVEIKRTVA          APCVFI FPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW          KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD          YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC</p>
<b>Ab3/Fab3/Fab'3 κ cKIT</b>				

SEQ NO: 1	ID	HCDR1 (Kabat)	SYAIS
SEQ NO: 51	ID	HCDR2 (Kabat)	TIGPFEGQPRYAQKFQG
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (Kabat)	GGYISDFDV
SEQ NO: 4	ID	HCDR1 (Chothia)	GGTFSSY
SEQ NO: 52	ID	HCDR2 (Chothia)	GPFEGQ
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (Chothia)	GGYISDFDV
SEQ NO: 6	ID	HCDR1 (комбинирован ная)	GGTFSSY AIS
SEQ NO: 51	ID	HCDR2 (комбинирован ная)	TIGPFEGQPRYAQKFQG
SEQ NO: 3	ID	HCDR3 (комбинирован ная)	GGYISDFDV
SEQ NO: 7	ID	HCDR1 (IMGT)	GGTFSSYA
SEQ NO: 53	ID	HCDR2 (IMGT)	IGPFEGQP
SEQ NO: 9	ID	HCDR3 (IMGT)	ARGGYISDFDV
SEQ NO: 54	ID	VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKV SCKASGGTFSSY AISWV RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFDVWGQG TLVTVSS
SEQ NO: 55	ID	ДНК VH	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG CGCCAGGCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCA

		<p>CTATCGGTCCGTTTCGAAGGCCAGCCGCGTTACGCCCA  GAAATTTACAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCCGCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC  GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG  TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC  ACCCTGGTGACTGTTAGCTCA</p>
<p>SEQ ID  NO: 56</p>	<p>HC Ab</p>	<p>QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAIISWV  RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE  STSTAYMELSSLRSEDVAVYYCARGGYISDFDVGQG  TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK  DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS  VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCD  KTHHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPE  VTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQ  YNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPI  EKTIKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLV  KGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFL  YSKLTVDKSRWQQGNVFSQVMEALHNHYTQKLSLSL  SPGK</p>
<p>SEQ ID  NO: 57</p>	<p>ДНК HC Ab</p>	<p>CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA  AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC  CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG  CGCCAGGCCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCA  CTATCGGTCCGTTTCGAAGGCCAGCCGCGTTACGCCCA  GAAATTTACAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCCGCTATATGGAAGTGGAGCAGCCTGC  GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG  TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC  ACCCTGGTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCC  CAAGTGTGTTTCCCCTGGCCCCAGCAGCAAGTCTAC  TTCCGGCGGAACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAG  GACTACTTCCCCGAGCCCGTGACAGTGTCTGGAAGT  CTGGGGCTCTGACTTCCGGCGTGACACCTTCCCCGC  CGTGCTGCAGAGCAGCGGCTGTACAGCCTGAGCAGC  GTGGTGACAGTGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGA</p>

		<p>CCTATATCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACAC  CAAGGTGGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGAC  AAGACCCACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAAC  TGCTGGGAGGGCCTTCCGTGTTCTGTCCCCCCAA  GCCCAAGGACACCCTGATGATCAGCAGGACCCCGAG  GTGACCTGCGTGGTGGTGGACGTGTCCCACGAGGACC  CAGAGGTGAAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGA  GGTGCACAACGCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAG  TACAACAGCACCTACAGGGTGGTGTCCGTGCTGACCG  TGCTGCACCAGGACTGGCTGAACGGCAAAGAATACAA  GTGCAAAGTCTCCAACAAGGCCCTGCCAGCCCCAATC  GAAAAGACAATCAGCAAGGCCAAGGGCCAGCCACGGG  AGCCCCAGGTGTACACCCTGCCCCCAGCCGGGAGGA  GATGACCAAGAACCAGGTGTCCCTGACCTGTCTGGTG  AAGGGCTTCTACCCAGCGATATCGCCGTGGAGTGGG  AGAGCAACGGCCAGCCCAGAAACA ACTACAAGACCAC  CCCCCAGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCCTG  TACAGCAAGCTGACCGTGGACAAGTCCAGGTGGCAGC  AGGGCAACGTGTTTCAGCTGCAGCGTGATGCACGAGGC  CCTGCACAACCCTACACCAGAAAGTCCCTGAGCCTG  AGCCCCGGCAAG</p>
SEQ ID NO: 58	HC (EU236) Fab'	<p>QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAI SWV  RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE  STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFD VWGQG  TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK  DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS  VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVEPKSCD  KTHTCPPCPAPELLG</p>
SEQ ID NO: 59	ДHK HC Fab'	<p>CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCCGAAGTGAAAA  AACCGGGCAGCAGCGTGAAAGTTAGCTGCAAAGCATC  CGGAGGGACGTTTAGCAGCTATGCGATTAGCTGGGTG  CGCCAGGCCCCGGGCCAGGGCCTCGAGTGGATGGGCA  CTATCGGTCCGTTTCGAAGGCCAGCCGCTTACGCCCA  GAAATTT CAGGGCCGGGTGACCATTACCGCCGATGAA  AGCACCAGCACCGCCTATATGGA ACTGAGCAGCCTGC</p>

		GCAGCGAAGATACGGCCGTGTATTATTGCGCGCGTGG TGGTTACATCTCTGACTTCGATGTTTGGGGCCAAGGC ACCCCTGGTGACTGTTAGCTCAGCTAGCACCAAGGGCC CAAGTGTGTTTCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTAC TTCCGGCGGAACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAG GACTACTTCCCCGAGCCCGTGACAGTGTCCTGGA ACTCTGGGGCTCTGACTTCCGGCGTGACACACTTCCCCGC CGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGC GTGGTGACAGTGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGA CCTATATCTGCAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACAC CAAGGTGGACAAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGAC AAGACCCACACCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAAC TGCTGGGA
SEQ ID NO: 130	Cys- HC (EU221) -HC- E152C (EU) Fab	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDVAVYYCARGGYISDFDVGQ GQ TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPCPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKEPKSCD
SEQ ID NO: 131	HC (EU230) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDVAVYYCARGGYISDFDVGQ GQ TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVKPKSCD KTHTCPPCP
SEQ ID NO: 132	HC (EU232) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE STSTAYMELSSLRSEDVAVYYCARGGYISDFDVGQ GQ TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVKPKSCD KTHTCPPCPAP
SEQ ID NO: 133	HC (EU236) -Pro Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSSYAISWV RQAPGQGLEWMGTIGPFEGQPRYAQKFQGRVTITADE

		STSTAYMELSSLRSED TAVYYCARGGYISDFDVGQG TLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVK DYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVEPKSCD KTHTCPPCPAPELLGP
SEQ ID NO: 16	LCDR1 (Kabat)	RASQISNYLA
SEQ ID NO: 17	LCDR2 (Kabat)	DASSLQS
SEQ ID NO: 18	LCDR3 (Kabat)	QYYESIT
SEQ ID NO: 19	LCDR1 (Chothia)	SQISNY
SEQ ID NO: 20	LCDR2 (Chothia)	DAS
SEQ ID NO: 21	LCDR3 (Chothia)	YYESI
SEQ ID NO: 16	LCDR1 (комбинирован ная)	RASQISNYLA
SEQ ID NO: 17	LCDR2 (комбинирован ная)	DASSLQS
SEQ ID NO: 18	LCDR3 (комбинирован ная)	QYYESIT
SEQ ID NO: 22	LCDR1 (IMGT)	QISNY
SEQ ID NO: 20	LCDR2 (IMGT)	DAS
SEQ ID NO: 18	LCDR3 (IMGT)	QYYESIT
SEQ ID NO: 23	VL (каппа- цепь)	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISNYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLPEDFATYYCQYYESITFGQGTKVEIK

SEQ ID NO: 24	ДНК VL	GATATCCAGATGACCCAGAGCCCGAGCAGCCTGAGCG CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC CAGCCAGTCTATTTCTAACTACCTGGCTTGGTACCAG CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCCTGACC ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGACCTATT ATTGCCAGCAGTACTACTACGAATCTATCACCTTTGG CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAA
SEQ ID NO: 25	LC (каппа- цепь) Ab/Fab'	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISINYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APSVFI FPPSDEQLKSGTASVVCLLNFPYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSLSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC
SEQ ID NO: 26	ДНК LC Ab/Fab'	GATATCCAGATGACCCAGAGCCCGAGCAGCCTGAGCG CCAGCGTGGGCGATCGCGTGACCATTACCTGCAGAGC CAGCCAGTCTATTTCTAACTACCTGGCTTGGTACCAG CAGAAACCGGGCAAAGCGCCGAACTATTAATCTACG ACGCTTCTTCTCTGCAAAGCGGCGTGCCGAGCCGCTT TAGCGGCAGCGGATCCGGCACCGATTTACCCCTGACC ATTAGCTCTCTGCAACCGGAAGACTTTGCGACCTATT ATTGCCAGCAGTACTACTACGAATCTATCACCTTTGG CCAGGGCACGAAAGTTGAAATTAAACGTACGGTGGCC GCTCCCAGCGTGTTCATCTTCCCCCAGCGACGAGC AGCTGAAGAGTGGCACCGCCAGCGTGGTGTGCCTGCT GAACAACCTTCTACCCCCGGGAGGCCAAGGTGCAGTGG AAGGTGGACAACGCCCTGCAGAGCGGCAACAGCCAGG AGAGCGTCACCGAGCAGGACAGCAAGGACTCCACCTA CAGCCTGAGCAGCACCCCTGACCCTGAGCAAGGCCGAC TACGAGAAGCATAAGGTGTACGCCTGCGAGGTGACCC ACCAGGGCCTGTCCAGCCCCGTGACCAAGAGCTTCAA CAGGGGCGAGTGC
SEQ ID NO: 134	Cys-LC-E165C (EU) Fab	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISINYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT

		ISSLQPEDFATYYCQQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTCQDSKDYSTYLSSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
SEQ ID NO: 135	Cys-LC-S114C (EU) Fab	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISINYLAWYQ QKPGKAPKLLIYDASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLT ISSLQPEDFATYYCQQYYYESITFGQGTKVEIKRTVA APCVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQW KVDNALQSGNSQESVTEQDSKDYSTYLSSTLTLSKAD YEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
<b>Ab4/Fab4/Fab'4 κ cKIT</b>		
SEQ ID NO: 60	HCDR1 (Kabat)	TNSAAWN
SEQ ID NO: 61	HCDR2 (Kabat)	RIYYRSQWLNDYAVSVKS
SEQ ID NO: 62	HCDR3 (Kabat)	QLTYPYTVYHKALDV
SEQ ID NO: 63	HCDR1 (Chothia)	GDSVSTNSA
SEQ ID NO: 64	HCDR2 (Chothia)	YYRSQWL
SEQ ID NO: 62	HCDR3 (Chothia)	QLTYPYTVYHKALDV
SEQ ID NO: 65	HCDR1 (комбинированная)	GDSVSTNSAAWN
SEQ ID NO: 61	HCDR2 (комбинированная)	RIYYRSQWLNDYAVSVKS
SEQ ID NO: 62	HCDR3 (комбинированная)	QLTYPYTVYHKALDV
SEQ ID NO: 66	HCDR1 (IMGT)	GDSVSTNSAA
SEQ ID	HCDR2 (IMGT)	IYYRSQWLN

NO: 67		
SEQ ID NO: 68	HCDR3 (IMGT)	ARQLTYPYTVYHKALDV
SEQ ID NO: 69	VH	QVQLQQSGPGLVKPSQTLISLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLVTVSS
SEQ ID NO: 70	ДНК VH	CAGGTGCAATTGCAGCAGAGCGGTCCGGGCCTGGTGA AACCGAGCCAGACCCTGAGCCTGACCTGCGCGATTTC CGGAGATAGCGTGAGCACTAACTCTGCTGCTTGGAAC TGGATTTCGTCAGAGCCCCGAGCCGTGGCCTCGAGTGGC TGGGCCGTATCTACTACCGTAGCCAGTGGCTGAACGA CTATGCCGTGAGCGTGAAAAGCCGCATTACCATTAAC CCGGATACTTCGAAAAACCAGTTTAGCCTGCAACTGA ACAGCGTGACCCCGGAAGATACGGCCGTGTATTATTG CGCGCGTCAGCTGACTTACCCGTACACTGTTTACCAT AAAGCTCTGGATGTTTGGGGTCAAGGAACCCTGGTCA CCGTCTCCTCG
SEQ ID NO: 71	HC Ab	QVQLQQSGPGLVKPSQTLISLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCDKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKD TLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHN AKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTK NQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPV LDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHN HYTQKSLSLSPGK
SEQ ID NO: 72	ДНК HC Ab	CAGGTGCAATTGCAGCAGAGCGGTCCGGGCCTGGTGA AACCGAGCCAGACCCTGAGCCTGACCTGCGCGATTTC CGGAGATAGCGTGAGCACTAACTCTGCTGCTTGGAAC TGGATTTCGTCAGAGCCCCGAGCCGTGGCCTCGAGTGGC

				<p>TGGGCCGTATCTACTACCGTAGCCAGTGGCTGAACGA  CTATGCCGTGAGCGTGAAAAGCCGCATTACCATTAAC  CCGGATACTTCGAAAAACCAGTTTAGCCTGCAACTGA  ACAGCGTGACCCCGGAAGATACGGCCGTGTATTATTG  CGCGCGTCAGCTGACTTACCCGTACACTGTTTACCAT  AAAGCTCTGGATGTTTGGGGTCAAGGAACCCTGGTCA  CCGTCTCCTCGGCTAGCACCAAGGGCCCCAGCGTGTT  CCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTACTTCCGGCGGA  ACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAGGACTACTTCC  CCGAGCCCGTGACAGTGTCTGGAACCTCTGGGGCTCT  GACTTCCGGCGTGCACACCTTCCCCGCCGTGCTGCAG  AGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGTGGTGACAG  TGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGACCTATATCTG  CAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGAC  AAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGACAAGACCCACA  CCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAACTGCTGGGAGG  GCCTTCCGTGTTTCTGTTCCCCCCAAGCCAAGGAC  ACCCTGATGATCAGCAGGACCCCGAGGTGACCTGCG  TGGTGGTGGACGTGTCCCACGAGGACCCAGAGGTGAA  GTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAGGTGCACAAC  GCCAAGACCAAGCCCAGAGAGGAGCAGTACAACAGCA  CCTACAGGGTGGTGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCA  GGACTGGCTGAACGGCAAAGAATACAAGTGCAAAGTC  TCCAACAAGGCCCTGCCAGCCCCAATCGAAAAGACAA  TCAGCAAGGCCAAGGGCCAGCCACGGGAGCCCCAGGT  GTACACCCTGCCCCCAGCCGGGAGGAGATGACCAAG  AACCAGGTGTCCCTGACCTGTCTGGTGAAGGGCTTCT  ACCCAGCGATATCGCCGTGGAGTGGGAGAGCAACGG  CCAGCCCAGAACTACAAGACCACCCCCCAGTG  CTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTCTGTACAGCAAGC  TGACCGTGGACAAGTCCAGGTGGCAGCAGGGCAACGT  GTTTCACTGCAGCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAAC  CACTACACCAGAAGTCCCTGAGCCTGAGCCCCGGCA  AG</p>
SEQ	ID	HC	(EU236)	QVQLQQSGPGLVKPSQTLISLTCAISGDSVSTNSAAWN

NO: 73	Fab'	WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLG
SEQ ID NO: 74	ДНК HC Fab'	CAGGTGCAATTGCAGCAGAGCGGTCCGGGCCTGGTGA AACCGAGCCAGACCCTGAGCCTGACCTGCGCGATTTC CGGAGATAGCGTGAGCACTAACTCTGCTGCTTGGAAC TGGATTTCGTCAGAGCCCCGAGCCGTGGCCTCGAGTGGC TGGGCCGTATCTACTACCGTAGCCAGTGGCTGAACGA CTATGCCGTGAGCGTGAAAAGCCGCATTACCATTAAC CCGGATACTTCGAAAAACCAGTTTAGCCTGCAACTGA ACAGCGTGACCCCGGAAGATACGGCCGTGTATTATTG CGCGCGTCAGCTGACTTACCCGTACACTGTTTACCAT AAAGCTCTGGATGTTTGGGGTCAAGGAACCCTGGTCA CCGTCTCCTCGGCTAGCACCAAGGGCCCCAGCGTGTT CCCCCTGGCCCCCAGCAGCAAGTCTACTTCCGGCGGA ACTGCTGCCCTGGGTTGCCTGGTGAAGGACTACTTCC CCGAGCCCGTGACAGTGTCTGGAACCTCTGGGGCTCT GACTTCCGGCGTGCACACCTTCCCCGCCGTGCTGCAG AGCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGTGGTGACAG TGCCCTCCAGCTCTCTGGGAACCCAGACCTATATCTG CAACGTGAACCACAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGAC AAGAGAGTGGAGCCCAAGAGCTGCGACAAGACCCACA CCTGCCCCCCTGCCAGCTCCAGAACTGCTGGGA
SEQ ID NO: 136	Cys- HC (EU221) -HC- E152C (EU) Fab	QVQLQQSGPGLVKPSQTLTSLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPCPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCD
SEQ ID NO: 137	HC (EU230) Fab'	QVQLQQSGPGLVKPSQTLTSLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN

		PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCDKTHTCPPCP
SEQ ID NO: 138	HC (EU232) Fab'	QVQLQQSGPGLVKPSQTLTSLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCDKTHTCPPCPAP
SEQ ID NO: 139	HC (EU236) -Pro Fab'	QVQLQQSGPGLVKPSQTLTSLTCAISGDSVSTNSAAWN WIRQSPSRGLEWLGRIYYRSQWLNDYAVSVKSRITIN PDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCARQLTYPYTVYH KALDVWGQGLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGG TAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQ SSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVD KRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGP
SEQ ID NO: 75	LCDR1 (Kabat)	SGDNLGDQYVS
SEQ ID NO: 76	LCDR2 (Kabat)	DDTDRPS
SEQ ID NO: 77	LCDR3 (Kabat)	QSTD SKSVV
SEQ ID NO: 78	LCDR1 (Chothia)	DNLGDQY
SEQ ID NO: 79	LCDR2 (Chothia)	DDT
SEQ ID NO: 80	LCDR3 (Chothia)	TDSKSV
SEQ ID NO: 75	LCDR1 (комбинирован ная)	SGDNLGDQYVS
SEQ ID	LCDR2	DDTDRPS

NO: 76		(комбинированная)	
SEQ NO: 77	ID	LCDR3 (комбинированная)	QSTDSKSVV
SEQ NO: 81	ID	LCDR1 (IMGT)	NLGDQY
SEQ NO: 79	ID	LCDR2 (IMGT)	DDT
SEQ NO: 77	ID	LCDR3 (IMGT)	QSTDSKSVV
SEQ NO: 82	ID	VL (лямбда-цепь)	DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNLGDQYVSWYQQ KPGQAPVLVIYDDTDRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCQSTDSKSVVFGGGTKLTVL
SEQ NO: 83	ID	ДНК VL	GATATCGAACTGACCCAGCCGCCGAGCGTGAGCGTGA GCCCCGGGCCAGACCGCGAGCATTACCTGTAGCGGCCGA TAACCTGGGTGACCAATACGTTTCTTGGTACCAGCAG AAACCGGGCCAGGCGCCGGTGCTGGTGATCTACGACG ACACTGACCGTCCGAGCGGCATCCCGGAACGTTTTAG CGGATCCAACAGCGGCAACACCGCGACCCTGACCATT AGCGGCACCCAGGCGGAAGACGAAGCGGATTATTACT GCCAGTCTACTGACTCTAAATCTGTTGTGTTTGGCGG CGGCACGAAGTTAACCGTCCTA
SEQ NO: 84	ID	LC (лямбда-цепь) Ab/Fab'	DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNLGDQYVSWYQQ KPGQAPVLVIYDDTDRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCQSTDSKSVVFGGGTKLTVLGQPKA APSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAW KADSSPVKAGVETTTPSKQSNKYAASSYLSLTPEQW KSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
SEQ NO: 85	ID	ДНК Ab/Fab' LC	GATATCGAACTGACCCAGCCGCCGAGCGTGAGCGTGA GCCCCGGGCCAGACCGCGAGCATTACCTGTAGCGGCCGA TAACCTGGGTGACCAATACGTTTCTTGGTACCAGCAG AAACCGGGCCAGGCGCCGGTGCTGGTGATCTACGACG ACACTGACCGTCCGAGCGGCATCCCGGAACGTTTTAG CGGATCCAACAGCGGCAACACCGCGACCCTGACCATT

		AGCGGCACCCAGGCGGAAGACGAAGCGGATTATTACT GCCAGTCTACTGACTCTAAATCTGTTGTGTTTGGCGG CGGCACGAAGTTAACCGTCCTAGGCCAGCCTAAGGCC GCTCCCTCCGTGACCCTGTTCCCCCCCAGCTCCGAGG AACTGCAGGCCAACAAGGCCACCCTGGTGTGCCTGAT CAGCGACTTCTACCCTGGCGCCGTGACCGTGGCCTGG AAGGCCGACAGCAGCCCCGTGAAGGCCGGCGTGGAGA CAACCACCCCCAGCAAGCAGAGCAACAACAAGTACGC CGCCAGCAGCTACCTGAGCCTGACCCCCGAGCAGTGG AAGAGCCACAGAAGCTACAGCTGCCAGGTCACCCACG AGGGCAGCACCGTGGAGAAAACCGTGGCCCCCACCGA GTGCAGC
SEQ ID NO: 140	Cys-LC (лямбда- цепь)-A143C (EU) Fab	DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNLGDQYVSWYQQ KPGQAPVVLVIYDDTDRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCQSTDSKSVVFGGGTKLTVLGQPKA APSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGCVTVAW KADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQW KSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
<b>Ab5/Fab5/Fab'5 к cKIT</b>		
SEQ ID NO: 86	HCDR1 (Kabat)	NYWIA
SEQ ID NO: 87	HCDR2 (Kabat)	IIYPSNSYTLYSPSFQG
SEQ ID NO: 88	HCDR3 (Kabat)	VPPGGSISYPAFDH
SEQ ID NO: 89	HCDR1 (Chothia)	GYSFTNY
SEQ ID NO: 90	HCDR2 (Chothia)	YPSNSY
SEQ ID NO: 88	HCDR3 (Chothia)	VPPGGSISYPAFDH
SEQ ID NO: 91	HCDR1 (комбинирован ная)	GYSFTNYWIA
SEQ ID	HCDR2	IIYPSNSYTLYSPSFQG

NO: 87	(комбинированная)	
SEQ ID NO: 88	HCDR3 (комбинированная)	VPPGGSISYPAFDH
SEQ ID NO: 92	HCDR1 (IMGT)	GYSFTNYW
SEQ ID NO: 93	HCDR2 (IMGT)	IYPSNSYT
SEQ ID NO: 94	HCDR3 (IMGT)	ARVPPGGSISYPAFDH
SEQ ID NO: 95	VH	QVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGI IYPSNSYTLYSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMYYCARVPPGGSISYPAFD HWGQGTLVTVSS
SEQ ID NO: 96	ДНК VH	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCGGAAGTGAAAA AACCGGGCGAAAGCCTGAAAATTAGCTGCAAAGGCTC CGGATATAGCTTCACTAACTACTGGATCGCTTGGGTG CGCCAGATGCCGGGCAAAGGTCTCGAGTGGATGGGCA TCATCTACCCGTCTAACAGCTACACCCTGTATAGCCC GAGCTTTCAGGGCCAGGTGACCATTAGCGCGGATAAA AGCATCAGCACCCGCGTATCTGCAATGGAGCAGCCTGA AAGCGAGCGATAACCGCGATGTATTATTGCGCGCGTGT TCCGCCGGGTGGTCTATCTCTTACCCGGCTTTCGAT CATTGGGGCCAAGGCACCCTGGTGA CTGTTAGCTCA
SEQ ID NO: 97	HC Ab	QVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGI IYPSNSYTLYSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMYYCARVPPGGSISYPAFD HWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCDKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTK PREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKA LPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVS

		LTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSD GSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQ KSLSLSPGK
SEQ NO: 98	ID ДНК HC Ab	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCGGAAGTGAAAA AACCGGGCGAAAGCCTGAAAATTAGCTGCAAAGGCTC CGGATATAGCTTCACTAACTACTGGATCGCTTGGGTG CGCCAGATGCCGGGCAAAGGTCTCGAGTGGATGGGCA TCATCTACCCGTCTAACAGCTACACCCTGTATAGCCC GAGCTTTCAGGGCCAGGTGACCATTAGCGCGGATAAA AGCATCAGCACCCGCGTATCTGCAATGGAGCAGCCTGA AAGCGAGCGATACCGCGATGTATTATTGCGCGCGTGT TCCGCCGGGTGGTTCTATCTCTTACCCGGCTTTCGAT CATTGGGGCCAAGGCACCCTGGTGACTGTTAGCTCAG CTAGCACCAAGGGCCCCAGCGTGTTCGCCCTGGCCCC CAGCAGCAAGTCTACTTCCGGCGGAACTGCTGCCCTG GGTTGCCTGGTGAAGGACTACTTCCCCGAGCCCGTGA CAGTGTCTTGGAACTCTGGGGCTCTGACTTCCGGCGT GCACACCTTCCCCGCCGTGCTGCAGAGCAGCGGCCTG TACAGCCTGAGCAGCGTGGTGACAGTGCCCTCCAGCT CTCTGGGAACCCAGACCTATATCTGCAACGTGAACCA CAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGACAAGAGAGTGGAG CCCAAGAGCTGCGACAAGACCCACACCTGCCCCCCT GCCCAGCTCCAGAACTGCTGGGAGGGCCTTCCGTGTT CCTGTTCCCCCACAAGCCCAAGGACACCCTGATGATC AGCAGGACCCCCGAGGTGACCTGCGTGGTGGTGGACG TGTCCCACGAGGACCCAGAGGTGAAGTTCAACTGGTA CGTGGACGGCGTGGAGGTGCACAACGCCAAGACCAAG CCCAGAGAGGAGCAGTACAACAGCACCTACAGGGTGG TGTCCGTGCTGACCGTGCTGCACCAGGACTGGCTGAA CGGCAAAGAATACAAGTGCAAAGTCTCCAACAAGGCC CTGCCAGCCCCAATCGAAAAGACAATCAGCAAGGCCA AGGGCCAGCCACGGGAGCCCCAGGTGTACACCCTGCC CCCCAGCCGGGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTGTCC CTGACCTGTCTGGTGAAGGGCTTCTACCCAGCGATA TCGCCGTGGAGTGGGAGAGCAACGGCCAGCCCCGAGAA

		CAACTACAAGACCACCCCCCAGTGCTGGACAGCGAC GGCAGCTTCTTCTGTACAGCAAGCTGACCGTGGACA AGTCCAGGTGGCAGCAGGGCAACGTGTTCAGCTGCAG CGTGATGCACGAGGCCCTGCACAACCACTACACCCAG AAGTCCCTGAGCCTGAGCCCCGGCAAG
SEQ ID NO: 99	HC (EU236) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGESLKI SCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGII YPSNSYTL YSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMY YCARVPPGGSISYP AFD HWGQGLTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPEPVT VSWNSGAL TSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYI CNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCDKTHTCPPCPAPELLG
SEQ ID NO: 100	ДНК HC Fab'	CAGGTGCAATTGGTGCAGAGCGGTGCGGAAGTGAAAA AACCGGGCGAAAGCCTGAAAATTAGCTGCAAAGGCTC CGGATATAGCTTCACTAACTACTGGATCGCTTGGGTG CGCCAGATGCCGGGCAAAGGTCTCGAGTGGATGGGCA TCATCTACCCGTCTAACAGCTACACCCTGTATAGCCC GAGCTTTCAGGGCCAGGTGACCATTAGCGCGGATAAAA AGCATCAGCACCCGCGTATCTGCAATGGAGCAGCCTGA AAGCGAGCGATACCGCGATGTATTATTGCGCGCGTGT TCCGCCGGGTGGTTCTATCTCTTACCCGGCTTTCGAT CATTGGGGCCAAGGCACCCTGGTGACTGTTAGCTCAG CTAGCACCAAGGGCCCCAGCGTGTTCGCCCTGGCCCC CAGCAGCAAGTCTACTTCCGGCGGAACTGCTGCCCTG GGTTGCCTGGTGAAGGACTACTTCCCCGAGCCCGTGA CAGTGTCTTGGAACTCTGGGGCTCTGACTTCCGGCGT GCACACCTTCCCCGCCGTGCTGCAGAGCAGCGGCCCTG TACAGCCTGAGCAGCGTGGTGACAGTGCCCTCCAGCT CTCTGGGAACCCAGACCTATATCTGCAACGTGAACCA CAAGCCCAGCAACACCAAGGTGGACAAGAGAGTGGAG CCCAAGAGCTGCGACAAGACCCACACCTGCCCCCCT GCCAGCTCCAGAACTGCTGGGA
SEQ ID NO: 141	Cys- HC (EU221) -HC- E152C (EU)	QVQLVQSGAEVKKPGESLKI SCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGII YPSNSYTL YSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMY YCARVPPGGSISYP AFD

	Fab	HWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPCPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCD
SEQ ID NO: 142	HC (EU230) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGIIYPSNSYTLYSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMYYCARVPPGGSISYPAFD HWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCDKTHTCPPCP
SEQ ID NO: 143	HC (EU232) Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGIIYPSNSYTLYSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMYYCARVPPGGSISYPAFD HWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCDKTHTCPPCPAP
SEQ ID NO: 144	HC (EU236) -Pro Fab'	QVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKGSGYSFTNYWIAWV RQMPGKGLEWMGIIYPSNSYTLYSPSFQGQVTISADK SISTAYLQWSSLKASDTAMYYCARVPPGGSISYPAFD HWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAL GCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVKDRVE PKSCDKTHTCPPCPAPELLGP
SEQ ID NO: 101	LCDR1 (Kabat)	SGDNIGSIYAS
SEQ ID NO: 102	LCDR2 (Kabat)	RDNKRPS
SEQ ID NO: 103	LCDR3 (Kabat)	SVTDMEQHSV
SEQ ID NO: 104	LCDR1 (Chothia)	DNIGSIY
SEQ ID NO: 105	LCDR2 (Chothia)	RDN

SEQ ID NO: 106	LCDR3 (Chothia)	TDMEQHS
SEQ ID NO: 101	LCDR1 (комбинированная)	SGDNIGSIYAS
SEQ ID NO: 102	LCDR2 (комбинированная)	RDNKRPS
SEQ ID NO: 103	LCDR3 (комбинированная)	SVTDMEQHSV
SEQ ID NO: 107	LCDR1 (IMGT)	NIGSIY
SEQ ID NO: 105	LCDR2 (IMGT)	RDN
SEQ ID NO: 103	LCDR3 (IMGT)	SVTDMEQHSV
SEQ ID NO: 108	VL (лямбда-цепь)	DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNIGSIYASWYQQ KPGQAPVLVIYRDNKRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCSVTDMEQHSVFGGGTKLTVL
SEQ ID NO: 109	ДНК VL	GATATCGAACTGACCCAGCCGCCGAGCGTGAGCGTGA GCCCCGGGCCAGACCGCGAGCATTACCTGTAGCGGCCGA TAACATCGGTTCTATCTACGCTTCTTGGTACCAGCAG AAACCGGGCCAGGCGCCGGTGCTGGTGATCTACCGTG ACAACAACGTCCGAGCGGCATCCCGGAACGTTTTAG CGGATCCAACAGCGGCAACACCGCGACCCTGACCATT AGCGGCACCCAGGCGGAAGACGAAGCGGATTATTACT GCTCCGTTACTGACATGGAACAGCATTCTGTGTTTGG CGGCGGCACGAAGTTAACCGTCCTA
SEQ ID NO: 110	LC (лямбда-цепь) Ab/Fab'	DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNIGSIYASWYQQ KPGQAPVLVIYRDNKRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCSVTDMEQHSVFGGGTKLTVLGQPK AAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVA WKADSSPVKAGVETTTPSKQSNKYAASSYLSTPEQ WKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS

SEQ ID NO: 111	ДНК Ab/Fab'	LC	GATATCGAACTGACCCAGCCGCCGAGCGTGAGCGTGA GCCCCGGGCCAGACCGCGAGCATTACCTGTAGCGGCGA TAACATCGGTTCTATCTACGCTTCTTGGTACCAGCAG AAACCGGGCCAGGCGCCGGTGCTGGTGATCTACCGTG ACAACAAACGTCCGAGCGGCATCCCGGAACGTTTTAG CGGATCCAACAGCGGCAACACCGCGACCCTGACCATT AGCGGCACCCAGGCGGAAGACGAAGCGGATTATTACT GCTCCGTTACTGACATGGAACAGCATTCTGTGTTTGG CGGCGGCACGAAGTTAACCGTCCTAGGCCAGCCTAAG GCCGCTCCCTCCGTGACCCTGTCCCCCCCAGCTCCG AGGAACTGCAGGCCAACAAGGCCACCCTGGTGTGCCT GATCAGCGACTTCTACCCTGGCGCCGTGACCGTGGCC TGGAAGGCCGACAGCAGCCCCGTGAAGGCCGGCGTGG AGACAACCACCCCCAGCAAGCAGAGCAACAACAAGTA CGCCGCCAGCAGCTACCTGAGCCTGACCCCCGAGCAG TGGAAGAGCCACAGAAGCTACAGCTGCCAGGTCACCC ACGAGGGCAGCACCGTGGAGAAAACCGTGGCCCCCAC CGAGTGCAGC
SEQ ID NO: 145	Cys-LC (лямбда- цепь)-A144C (EU) Fab		DIELTQPPSVSVSPGQTASITCSGDNIGSIYASWYQQ KPGQAPVVLVIYRDNRPSGIPERFSGSNSGNTATLTI SGTQAEDEADYYCSVTDMEQHSVFGGGTKLTVLGQPK AAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGCVTVVA WKADSSPVKAGVETTTPSKQSNKYAASSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS

Другие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к cKIT, раскрытые в данном документе, включают такие, в которых аминокислоты или нуклеиновые кислоты, кодирующие аминокислоты, были подвергнуты мутации, но при этом они все еще характеризуются по меньшей мере 60, 70, 80, 90 или 95 процентной идентичностью с последовательностями, описанными в таблице 1. В некоторых аспектах они охватывают мутантные аминокислотные последовательности, в которых не более 1, 2, 3, 4 или 5 аминокислот были подвергнуты мутации в переменных областях в сравнении с переменными областями CDR, отраженными в последовательности, описанной в таблице 1, при этом они сохраняют практически такую же терапевтическую активность.

Поскольку каждое из таких антитела или фрагмента антитела

(например, Fab или Fab') может связываться с cKIT, последовательности VH, VL, тяжелой цепи и легкой цепи (аминокислотные последовательности и нуклеотидные последовательности, кодирующие аминокислотные последовательности) можно подвергать "смешиванию и подбору" для создания других антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), связывающих cKIT. Такие подвергнутые "смешиванию и подбору" антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), связывающие cKIT, можно тестировать с применением анализов связывания, известных из уровня техники (например, разновидностей ELISA и других анализов, описанных в разделе Примеры). Когда такие цепи подвергаются смешиванию и подбору, последовательность VH из конкретной пары VH/VL следует заменить структурно подобной последовательностью VH. Аналогичным образом, последовательность тяжелой цепи из конкретной пары тяжелая цепь/легкая цепь следует заменить структурно подобной последовательностью тяжелой цепи. Аналогичным образом, последовательность VL из конкретной пары VH/VL следует заменить структурно подобной последовательностью VL. Аналогичным образом, последовательность легкой цепи из конкретной пары тяжелая цепь/легкая цепь следует заменить структурно подобной последовательностью легкой цепи.

Соответственно, в одном аспекте настоящего изобретения предусмотрены выделенное антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), имеющие переменную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 10, 36, 54, 69 и 95 (таблица 1); и переменную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 23, 47, 82 и 108 (таблица 1); где антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') специфически связываются с cKIT человека.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрено выделенное антитело, имеющее тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 12, 38, 56, 71 и 97; и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 25, 49, 84 и 110.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрен выделенный фрагмент антитела (например, Fab'), имеющий тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, 40, 58, 73 и 99; и легкую цепь,

содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 25, 49, 84 и 110.

В другом аспекте настоящего изобретения предусмотрены антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), связывающие сКИТ, которые содержат CDR1, CDR2 и CDR3 тяжелой цепи и легкой цепи, описанные в таблице 1, или их комбинации. Аминокислотные последовательности CDR1 VH (или HCDR1) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') показаны под SEQ ID NO: 1, 4, 6, 7, 27, 30, 32, 33, 60, 63, 65, 66, 86, 89, 91 и 92. Аминокислотные последовательности CDR2 VH (или HCDR2) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') и показаны под SEQ ID NO: 2, 5, 8, 28, 31, 34, 51, 52, 53, 61, 64, 67, 87, 90 и 93. Аминокислотные последовательности CDR3 VH (или HCDR3) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') показаны под SEQ ID NO: 3, 9, 29, 35, 62, 68, 88 и 94. Аминокислотные последовательности CDR1 VL (или LCDR1) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') показаны под SEQ ID NO: 16, 19, 22, 42, 44, 46, 75, 78, 81, 101, 104 и 107. Аминокислотные последовательности CDR2 VL (или LCDR2) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') показаны под SEQ ID NO: 17, 20, 76, 79, 102 и 105. Аминокислотные последовательности CDR3 VL (или LCDR3) антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') показаны под SEQ ID NO: 18, 21, 43, 45, 77, 80, 103 и 106.

С учетом того, что каждое из таких антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab') может связываться с сКИТ человека, и что специфичность связывания с антигеном обеспечивается, в первую очередь, областями CDR1, 2 и 3, последовательности CDR1, 2 и 3 VH (или HCDR1, 2, 3) и последовательности CDR1, 2 и 3 VL (или LCDR1, 2, 3) можно подвергать "смешиванию и подбору" (т. е. CDR из различных антител можно подвергать смешиванию и подбору, хотя каждое антитело должно содержать CDR1, 2 и 3 VH и CDR1, 2 и 3 VL для создания антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), связывающих сКИТ. Такие подвергнутые "смешиванию и подбору" антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), связывающие сКИТ, можно тестировать с применением анализов связывания, известных из уровня техники. Когда последовательности CDR VH подвергаются смешиванию и подбору, последовательность CDR1, CDR2 и/или CDR3 из конкретной последовательности VH следует заменить структурно подобной(-ыми) последовательность(-ями) CDR. Аналогичным образом, когда последовательности CDR VL подвергаются

смешиванию и подбору, последовательность CDR1, CDR2 и/или CDR3 из конкретной последовательности VL следует заменить структурно подобной(-ыми) последовательностью(-ями) CDR. Рядовому специалисту в данной области техники будет совершенно очевидно, что новые последовательности VH и VL можно создавать путем замены одной или нескольких последовательностей областей CDR VH и/или VL структурно подобными последовательностями из последовательностей CDR, показанных в данном документе.

Соответственно в настоящем изобретении предусмотрены выделенные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), содержащие CDR1 тяжелой цепи (HCDR1), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, 4, 6, 7, 27, 30, 32, 33, 60, 63, 65, 66, 86, 89, 91 и 92; CDR2 тяжелой цепи (HCDR2), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 2, 5, 8, 28, 31, 34, 51, 52, 53, 61, 64, 67, 87, 90 и 93; CDR3 тяжелой цепи (HCDR3), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 3, 9, 29, 35, 62, 68, 88 и 94; CDR1 легкой цепи (LCDR1), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 16, 19, 22, 42, 44, 46, 75, 78, 81, 101, 104 и 107; CDR2 легкой цепи (LCDR2), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 17, 20, 76, 79, 102 и 105; и CDR3 легкой цепи (LCDR3), содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 18, 21, 43, 45, 77, 80, 103 и 106; где антитело специфически связывает сKIT.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 1, HCDR2 под SEQ ID NO: 2; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 4, HCDR2 под SEQ ID NO: 5; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO: 19; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 21.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с сKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 6, HCDR2

под SEQ ID NO: 2; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO:16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 7, HCDR2 под SEQ ID NO: 8; HCDR3 под SEQ ID NO: 9; LCDR1 под SEQ ID NO: 22; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 27, HCDR2 под SEQ ID NO: 28; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ ID NO: 42; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 30, HCDR2 под SEQ ID NO: 31; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ ID NO: 44; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 45.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 32, HCDR2 под SEQ ID NO: 28; HCDR3 под SEQ ID NO: 29; LCDR1 под SEQ ID NO: 42; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 33, HCDR2 под SEQ ID NO: 34; HCDR3 под SEQ ID NO: 35; LCDR1 под SEQ ID NO: 46; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 43.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 1, HCDR2 под SEQ ID NO: 51; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO:16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 4, HCDR2 под SEQ ID NO: 52; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO:19; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 21.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 6, HCDR2

под SEQ ID NO: 51; HCDR3 под SEQ ID NO: 3; LCDR1 под SEQ ID NO:16; LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 7, HCDR2 под SEQ ID NO: 53; HCDR3 под SEQ ID NO: 9; LCDR1 под SEQ ID NO: 22; LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и LCDR3 под SEQ ID NO: 18.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 60, HCDR2 под SEQ ID NO: 61; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ ID NO: 75; LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 63, HCDR2 под SEQ ID NO: 64; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ ID NO: 78; LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и LCDR3 под SEQ ID NO: 80.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 65, HCDR2 под SEQ ID NO: 61; HCDR3 под SEQ ID NO: 62; LCDR1 под SEQ ID NO:75; LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 66, HCDR2 под SEQ ID NO: 67; HCDR3 под SEQ ID NO: 68; LCDR1 под SEQ ID NO: 81; LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и LCDR3 под SEQ ID NO: 77.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 86, HCDR2 под SEQ ID NO: 87; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 101; LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 89, HCDR2 под SEQ ID NO: 90; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 104; LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и LCDR3 под SEQ ID NO: 106.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 91,

HCDR2 под SEQ ID NO: 87; HCDR3 под SEQ ID NO: 88; LCDR1 под SEQ ID NO: 101; LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат HCDR1 под SEQ ID NO: 92, HCDR2 под SEQ ID NO: 93; HCDR3 под SEQ ID NO: 94; LCDR1 под SEQ ID NO: 107; LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и LCDR3 под SEQ ID NO: 103.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат вариабельную область тяжелой цепи (VH), содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 10, и вариабельную область легкой цепи (VL), содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 23.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 36, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 47.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 54, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 23.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 69, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 82.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, содержат VH, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 95, и VL, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 108.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 14, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT

человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 40, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 58, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 73, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 99, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 119, 120 или 121, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 125, 126 или 127, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 131, 132 или 133, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 137, 138 или 139, и

легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления фрагмент антитела (например, Fab'), который специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 142, 143 или 144, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 12, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 38, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 56, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 71, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84.

В некоторых вариантах осуществления антитело, которое специфически связывается с cKIT человека, содержит тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 97, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

В определенных аспектах антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически связываются с cKIT человека, представляют собой антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), описанные в таблице 1.

**1. Антитела, которые связываются с одним и тем же эпитопом**

В настоящем изобретении предусмотрены антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые специфически

связываются с эпитопом в пределах внеклеточного домена рецепторной сКІТ человека. В определенных аспектах антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут связываться с эпитопом в пределах доменов 1-3 внеклеточного домена сКІТ человека.

В настоящем изобретении также предусмотрены антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые связываются с тем же эпитопом, что и антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к сКІТ, описанные в таблице 1. Следовательно, дополнительные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') можно идентифицировать на основании их способности к перекрестной конкуренции (например, к конкурентному ингибированию связывания, статистически значимым образом) с другим антителом или фрагментом антитела (например, Fab или Fab') в анализах связывания сКІТ. Высокопроизводительный способ "сортировки" антител на основании их перекрестной конкуренции описан в международной заявке на патент № WO 2003/48731. Способность тестируемых антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') ингибировать связывание антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), раскрытых в данном документе, с белком сКІТ (например, сКІТ человека) демонстрирует, что тестируемые антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут конкурировать с данными антителом или фрагментом антитела (например, Fab или Fab') за связывание с сКІТ; при этом, согласно неограничивающей теории, такие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут связываться с одним и тем же или родственным (например, структурно подобным или пространственно близким) эпитопом на белке сКІТ, что и антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), с которыми они конкурируют. В определенном аспекте антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), которые связываются с тем же эпитопом на сКІТ, что и антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), раскрытые в данном документе, представляют собой человеческие или гуманизированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'). Такие человеческие или гуманизированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') могут быть получены и выделены, как описано в данном документе.

## **2. Модификация каркасной области**

Конъюгаты антитела и лекарственного средства, раскрытые в данном документе, могут содержать модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), связывающие сКІТ,

которые содержат модификации каркасных остатков в пределах VH и/или VL, например, для улучшения свойств конъюгата антитела и лекарственного средства.

В некоторых вариантах осуществления модификации каркасной области осуществляют для снижения иммуногенности антитела или конъюгата антитела и лекарственного средства. Например, один подход заключается в том, что один или несколько каркасных остатков "мутируют к первоначальному виду" в направлении соответствующей последовательности зародышевой линии. Такие остатки могут быть идентифицированы посредством сравнения каркасных последовательностей антитела с последовательностями зародышевой линии, из которых происходит антитело. Чтобы последовательности каркасной области "соответствовали" требуемой конфигурации зародышевой линии, остатки могут быть "мутированы к первоначальному виду" в направлении соответствующей последовательности зародышевой линии, например, посредством сайт-направленного мутагенеза. Подразумевается, что такие подвергнутые "мутации к первоначальному виду" антитела или конъюгаты антитела и лекарственного средства также охватываются настоящим изобретением.

Другой тип модификации каркасной области предусматривает мутацию одного или нескольких остатков в пределах каркасной области или даже в пределах одной или нескольких областей CDR, чтобы удалить Т-клеточные эпитопы, со снижением тем самым потенциальной иммуногенности антитела или конъюгата антитела и лекарственного средства. Данный подход также называют "деиммунизацией", и он более подробно описан в публикации заявки на патент США № 2003/0153043 от Carr *et al.*

В качестве дополнения или альтернативы модификациям, осуществляемым в пределах каркасных областей или областей CDR, антитела можно конструировать таким образом, чтобы изменить одно или несколько функциональных свойств антитела, таких как период полувыведения из сыворотки крови, фиксация комплемента. Кроме того, антитело может быть модифицировано химически (например, к антителу можно присоединять один или несколько химических фрагментов), или оно может быть модифицировано для изменения характера его гликозилирования, чтобы, опять-таки, изменить одно или несколько функциональных свойств антитела. Каждый из таких аспектов более подробно описан ниже.

В одном аспекте шарнирную область CH1 модифицируют таким

образом, что меняется количество цистеиновых остатков в шарнирной области, например, увеличивается или уменьшается. Данный подход дополнительно описан в патенте США № 5677425 от *Bodmer et al.* Количество цистеиновых остатков шарнирной области CN1 изменяют, например, чтобы облегчить сборку легкой и тяжелой цепей, чтобы увеличить или уменьшить стабильность антитела, или чтобы обеспечить возможность конъюгации с другой молекулой.

В некоторых вариантах осуществления антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), раскрытые в данном документе, содержат модифицированные или введенные путем конструирования аминокислотные остатки, например, один или несколько цистеиновых остатков, в качестве сайтов для конъюгации с фрагментом, представляющим собой лекарственное средство (*Junutula JR, et al.: Nat Biotechnol 2008, 26:925-932*). В одном варианте осуществления настоящего изобретения предусмотрены модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), содержащие замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в положениях, описанных в данном документе. Сайты для цистеиновой замены расположены в константных областях антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') и, таким образом, применимы к множеству антител или фрагментов антител (например, Fab или Fab'), и сайты выбирают для обеспечения устойчивых и однородных конъюгатов. Модифицированные антитело или фрагмент могут иметь одну, две или более цистеиновых замен, и такие замены могут применяться в комбинации с другими способами модификации и конъюгации, описанными в данном документе. Способы для вставки цистеина в специфические местоположения антитела известны из уровня техники, см., например, *Lyons et al, (1990) Protein Eng., 3:703-708, WO 2011/005481, WO2014/124316, WO 2015/138615*. В некоторых вариантах осуществления модифицированное антитело содержит замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 117, 119, 121, 124, 139, 152, 153, 155, 157, 164, 169, 171, 174, 189, 191, 195, 197, 205, 207, 246, 258, 269, 274, 286, 288, 290, 292, 293, 320, 322, 326, 333, 334, 335, 337, 344, 355, 360, 375, 382, 390, 392, 398, 400 и 422 тяжелой цепи антитела, и где нумерация положений соответствует системе EU. В некоторых вариантах осуществления модифицированный фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержит замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 121, 124, 152, 153, 155, 157, 164, 169,

171, 174, 189 и 207 тяжелой цепи фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), и где нумерация положений соответствует системе EU. В некоторых вариантах осуществления модифицированный фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержит замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 124, 152, 153, 155, 157, 164, 174, 189 и 207 тяжелой цепи фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), и где нумерация положений соответствует системе EU.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 107, 108, 109, 114, 126, 127, 129, 142, 143, 145, 152, 154, 156, 157, 159, 161, 165, 168, 169, 170, 182, 183, 188, 197, 199, и 203 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 107, 108, 114, 126, 127, 129, 142, 159, 161, 165, 183 и 203 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. . В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 114, 129, 142, 145, 152, 159, 161, 165 и 197 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 107, 108, 109, 126, 143, 145, 152, 154, 156, 157, 159, 182, 183, 188, 197, 199 и 203 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела

(например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 145, 152 и 197 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 114 и 165 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат замену одной или нескольких аминокислот на цистеин в своей константной области в положении, выбранном из 143, 145, 147, 156, 159, 163, 168 легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой человеческую легкую каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 143 (согласно нумерации EU) легкой цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'), где легкая цепь представляет собой человеческую легкую лямбда-цепь.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат комбинацию из замен двух или более аминокислот на цистеин в своих константных областях, и комбинация положений может быть выбрана из любого из положений, перечисленных выше.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в одном или нескольких из следующих положений: положение 124 тяжелой цепи, положение 152 тяжелой цепи, положение 153 тяжелой цепи, положение 155 тяжелой цепи, положение 157 тяжелой цепи, положение 164 тяжелой цепи, положение 174 тяжелой цепи, положение 114 легкой цепи, положение 129 легкой цепи, положение 142 легкой цепи, положение 159 легкой цепи, положение 161 легкой цепи или положение 165 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых

вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в четырех из следующих положений: положение 124 тяжелой цепи, положение 152 тяжелой цепи, положение 153 тяжелой цепи, положение 155 тяжелой цепи, положение 157 тяжелой цепи, положение 164 тяжелой цепи, положение 174 тяжелой цепи, положение 114 легкой цепи, положение 129 легкой цепи, положение 142 легкой цепи, положение 159 легкой цепи, положение 161 легкой цепи или положение 165 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 152 тяжелой цепи, где нумерация положений соответствует системе EU. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 124 тяжелой цепи, где нумерация положений соответствует системе EU. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 165 легкой цепи, где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 114 легкой цепи, где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в положении 143 легкой цепи, где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой лямбда-цепь.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеины в положении 152 тяжелой цепи и положении 165 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеины в положении 152 тяжелой цепи и положении 114 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеины в положении

152 тяжелой цепи и положении 143 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой лямбда-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеины в положении 124 и положении 152 тяжелой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в одном или нескольких из следующих положений: положение 155 тяжелой цепи, положение 189 тяжелой цепи, положение 207 тяжелой цепи, положение 145 легкой цепи, положение 152 легкой цепи или положение 197 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в двух или более (например, 2, 3, 4) из следующих положений: положение 155 тяжелой цепи, положение 189 тяжелой цепи, положение 207 тяжелой цепи, положение 145 легкой цепи, положение 152 легкой цепи или положение 197 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь.

В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в одном или нескольких из следующих положений: положение 124 тяжелой цепи, положение 152 тяжелой цепи, положение 153 тяжелой цепи, положение 155 тяжелой цепи, положение 157 тяжелой цепи, положение 164 тяжелой цепи, положение 174 тяжелой цепи, положение 114 легкой цепи, положение 129 легкой цепи, положение 142 легкой цепи, положение 159 легкой цепи, положение 161 легкой цепи или положение 165 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь. В некоторых вариантах осуществления модифицированные антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') содержат цистеин в двух или более (например, 2, 3, 4) из следующих положений: положение 124 тяжелой цепи, положение 152 тяжелой цепи, положение 153 тяжелой цепи, положение 155 тяжелой цепи, положение 157 тяжелой цепи, положение 164 тяжелой цепи, положение 174 тяжелой цепи, положение 114 легкой цепи, положение 129 легкой цепи, положение 142 легкой цепи, положение 159 легкой цепи, положение 161 легкой цепи или положение 165 легкой цепи, и где нумерация положений соответствует системе EU, и где легкая цепь представляет собой каппа-цепь.



### **3. Получение антител или фрагментов антител к cKIT**

Антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к cKIT можно получать с помощью любых средств, известных из уровня техники, в том числе без ограничения рекомбинантной экспрессии, химического синтеза или ферментативного расщепления полноразмерных моноклональных антител, которые могут быть получены например, с помощью гибридомы или рекомбинантного получения. Рекомбинантная экспрессия может происходить в любых подходящих клетках-хозяевах, известных из уровня техники, например, клетках-хозяевах, представляющих собой клетки млекопитающих, бактериальных клетках-хозяевах, дрожжевых клетках-хозяевах, клетках-хозяевах, представляющих собой клетки насекомых, или выполняться в бесклеточной системе (например, платформа Sutro's Xpress CF™, <http://www.sutro.bio.com/technology/>).

В настоящем изобретении дополнительно предусмотрены полинуклеотиды, кодирующие антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab'), описанные в данном документе, например, полинуклеотиды, кодирующие переменные области или сегменты тяжелой или легкой цепей, содержащие определяющие комплементарность области, описанные в данном документе. В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий переменные области тяжелой цепи (VH), характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом, выбранным из группы, состоящей из SEQ ID NO: 11, 37, 55, 70 и 96. В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий переменные области легкой цепи (VL), характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, или 100% идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом, выбранным из группы, состоящей из SEQ ID NO: 24, 48, 83 и 109.

В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий тяжелую цепь антитела, характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, или 100% идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом под SEQ ID NO: 13, 39, 57, 72 и 98. В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий легкую цепь антитела, характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, или 100% идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом под SEQ ID NO: 26, 50, 85 и 111.

В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий тяжелую цепь Fab', характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% или 100% идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом под SEQ ID NO: 15, 41, 59, 74 и 100. В некоторых аспектах полинуклеотид, кодирующий легкую цепь Fab', характеризуется по меньшей мере 85%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, или 100% идентичностью последовательности нуклеиновой кислоты с полинуклеотидом под SEQ ID NO: 26, 50, 85 и 111.

Полинуклеотиды по настоящему изобретению могут кодировать только последовательность вариабельной области антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к скИТ. Они также могут кодировать как вариабельную область, так и константную область антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab'). Некоторые из полинуклеотидных последовательностей кодируют полипептид, который содержит вариабельные области как тяжелой цепи, так и легкой цепи одного из иллюстративных антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к скИТ.

Полинуклеотидные последовательности можно получать с помощью твердофазного синтеза ДНК *de novo* или с помощью ПЦР-мутагенеза существующей последовательности (например, последовательностей, которые описаны в Примерах ниже), кодирующей антитело к скИТ или его связывающий фрагмент. Прямой химический синтез нуклеиновых кислот можно осуществлять с помощью способов, известных из уровня техники, таких как фосфотриэфирный способ из Narang *et al.*, *Meth. Enzymol.* 68:90, 1979; фосфодиэфирный способ из Brown *et al.*, *Meth. Enzymol.* 68:109, 1979; диэтилфосфорамидитный способ из Beaucage *et al.*, *Tetra Lett.*, 22:1859, 1981; и способ с использованием твердой подложки из патента США № 4458066. Введение мутаций в полинуклеотидную последовательность с помощью ПЦР можно осуществлять, как описано, например, в *PCR Technology: Principles and Applications for DNA Amplification*, H.A. Erlich (Ed.), Freeman Press, NY, NY, 1992; *PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications*, Innis *et al.* (Ed.), Academic Press, San Diego, CA, 1990; Mattila *et al.*, *Nucleic Acids Res.* 19:967, 1991; и Eckert *et al.*, *PCR Methods and Applications* 1:17, 1991.

Также в настоящем изобретении предусмотрены векторы экспрессии и клетки-хозяева для получения антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к скИТ, описанных выше. Различные векторы экспрессии могут использоваться для экспрессии

полинуклеотидов, кодирующих антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к cKIT. Как вирусные, так и невирусные векторы экспрессии можно применять для получения антител в клетке-хозяине, представляющей собой клетку млекопитающего. Невирусные векторы и системы включают плазмиды, эписомные векторы, как правило, с кассетой экспрессии для экспрессии белка или РНК, а также искусственные человеческие хромосомы (см., например, Harrington *et al.*, *Nat Genet.* 15:345, 1997). Например, невирусные векторы, применимые для экспрессии полинуклеотидов и полипептидов, связывающих cKIT, в клетках млекопитающих (например, человеческих), включают pThioHis A, B и C, pcDNA3.1/His, pEBVHis A, B и C (Invitrogen, Сан-Диего, Калифорния), векторы MPSV и многочисленные другие векторы, известные из уровня техники для экспрессии других белков. Применимые вирусные векторы включают векторы на основе ретровирусов, аденовирусов, аденоассоциированных вирусов, вирусов герпеса, векторы на основе SV40, папилломавируса, вируса Эпштейна-Барр НВР, векторы на основе вируса коровьей оспы и вируса леса Семлики (SFV). См., Brent *et al.*, выше; Smith, *Annu. Rev. Microbiol.* 49:807, 1995; и Rosenfeld *et al.*, *Cell* 68:143, 1992.

Выбор вектора экспрессии зависит от предполагаемых клеток-хозяев, в которых следует экспрессировать вектор. Как правило, векторы экспрессии содержат промотор и другие регуляторные последовательности (например, энхансеры), которые функционально связаны с полинуклеотидами, кодирующими антитело или фрагмент антитела (например, Fab или Fab') к cKIT. В некоторых аспектах индуцируемый промотор используют для предотвращения экспрессии встроенных последовательностей в условиях, отличающихся от индуцирующих. Индуцируемые промоторы включают, например, арабинозный, lacZ, металлотioneиновый промотор или промотор белка теплового шока. Культуры трансформированных организмов можно размножать в неиндуцирующих условиях без смещения популяции в направлении кодирующих последовательностей, продукты экспрессии которых лучше переносятся клетками-хозяевами. Для эффективной экспрессии антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT кроме промоторов также могут быть необходимы или требоваться другие регуляторные элементы. Такие элементы, как правило, включают кодон инициации трансляции ATG и смежный сайт связывания рибосомы или другие последовательности. Кроме того, эффективность экспрессии можно повысить за счет включения

энхансеров, соответствующих применяемой клеточной системе (см., например, Scharf et al., Results Probl. Cell Differ. 20:125, 1994; и Bittner et al., Meth. Enzymol., 153:516, 1987). Например, для повышения экспрессии в клетках-хозяевах, представляющих собой клетки млекопитающих, можно применять энхансер SV40 или энхансер CMV.

В векторах экспрессии также может быть предусмотрено положение сигнальной последовательности секреции для образования слитого белка с полипептидами, кодируемыми вставленными последовательностями антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT. Чаще встраиваемые последовательности антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT связывают с сигнальными последовательностями перед включением в вектор. Векторы, подлежащие применению для получения последовательностей, кодирующих переменные домены легкой и тяжелой цепей антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT, иногда также кодируют константные области или их части. Такие векторы обеспечивают возможность экспрессии переменных областей в виде слитых белков с константными областями, приводя тем самым к получению интактных антител или их фрагментов.

Клетки-хозяева, несущие и экспрессирующие цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT, могут быть или прокариотическими, или эукариотическими. *E. coli* является одним прокариотическим хозяином, применимым для клонирования и экспрессии полинуклеотидов по настоящему изобретению. Другие подходящие для применения микробные хозяева включают бацилл, таких как *Bacillus subtilis*, и других энтеробактерий, таких как *Salmonella*, *Serratia* и различные виды *Pseudomonas*. Для этих прокариотических хозяев также можно создать векторы экспрессии, которые, как правило, содержат последовательности для управления экспрессией, совместимые с клеткой-хозяином (например, точку начала репликации). Кроме того, будет присутствовать любое количество разнообразных хорошо известных промоторов, как, например, лактозная промоторная система, триптофановая (*trp*) промоторная система, бета-лактамазная промоторная система или промоторная система из фага лямбда. Как правило, промоторы управляют экспрессией, необязательно с помощью операторной последовательности, и имеют последовательности сайта связывания рибосомы и т. п. для инициации и завершения транскрипции и

трансляции. Другие микроорганизмы, такие как дрожжи, также можно использовать для экспрессии полипептидов антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT. Также можно применять клетки насекомых в сочетании с бакуловирусными векторами.

В других аспектах для экспрессии и получения полипептидов антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT по настоящему изобретению применяют клетки-хозяева, представляющие собой клетки млекопитающих. Например, они могут представлять собой либо линию клеток гибридомы, экспрессирующих эндогенные гены иммуноглобулинов (например, клоны гибридомы из клеток миеломы, как описано в Примерах), либо линию клеток млекопитающих, несущих экзогенный вектор экспрессии (например, клетки миеломы SP2/0, приведенные в качестве примера ниже). Они охватывают любые нормальные мортальные или нормальные или аномальные иммортальные клетки животных или человека. Например, был разработан ряд подходящих линий клеток-хозяев, способных секретировать интактные иммуноглобулины, в том числе линии клеток CHO, различные линии клеток COS, клетки HeLa, линии клеток миеломы, трансформированные В-клетки и гибридомы. Применение тканевой культуры клеток млекопитающих для экспрессии полипептидов в общих чертах обсуждается, например, в Winnacker, *From Genes to Clones*, VCH Publishers, N.Y., N.Y., 1987. Векторы экспрессии для клеток-хозяев, представляющих собой клетки млекопитающих, могут включать последовательности для управления экспрессией, такие как точка начала репликации, промотор и энхансер (см., например, Queen *et al.*, *Immunol. Rev.* 89:49-68, 1986), и необходимые сайты, несущие информацию для процессинга, такие как сайты связывания рибосом, сайты сплайсинга РНК, сайты полиаденилирования и последовательности терминатора транскрипции. Такие векторы экспрессии обычно содержат промоторы, происходящие из генов млекопитающих или из вирусов млекопитающих. Подходящие промоторы могут быть конститутивными, специфическими в отношении типа клеток, специфическими в отношении стадии развития и/или модулируемыми или регулируемыми. Применимые промоторы включают без ограничения металлотионеиновый промотор, конститутивный большой поздний промотор аденовируса, индуцируемый дексаметазоном промотор MMTV, промотор SV40, промотор polIII MRP, конститутивный промотор MPSV, индуцируемый тетрациклином промотор CMV (такой как немедленно-ранний промотор CMV человека), конститутивный промотор CMV и комбинации промотор-энхансер, известные из уровня техники.

Способы введения векторов экспрессии, содержащих представляющие интерес полинуклеотидные последовательности, варьируют в зависимости от типа клетки-хозяина. Например, трансфекцию с использованием хлорида кальция обычно используют для прокариотических клеток, тогда как обработку фосфатом кальция или электропорацию можно применять для других клеток-хозяев (см. в общих чертах Sambrook *et al.*, выше). Другие способы включают, например, электропорацию, обработку фосфатом кальция, трансформацию, опосредованную липосомами, инъекцию и микроинъекцию, баллистические способы, виросомы, иммунолипосомы, конъюгаты поликатион:нуклеиновая кислота, депротенинизированную ДНК, искусственные вирионы, слияние со структурным белком VP22 вируса герпеса (Elliot and O'Hare, *Cell* 88:223, 1997), усиленное средством поглощение ДНК и трансдукцию *ex vivo*. Чтобы обеспечить длительное получение рекомбинантных белков с высоким выходом, зачастую будет требоваться стабильная экспрессия. Например, линии клеток, которые стабильно экспрессируют цепи антитела или фрагмента антитела (например, Fab или Fab') к cKIT, могут быть получены с применением векторов экспрессии, которые содержат вирусные точки начала репликации или эндогенные элементы экспрессии и ген селективируемого маркера. После введения вектора клетки можно оставить расти в течение 1–2 дней в обогащенной среде перед их переносом на селективную среду. Задачей селективируемого маркера является придание устойчивости к факторам отбора, и его присутствие обеспечивает возможность роста клеток, которые успешно экспрессируют введенные последовательности, в селективных средах. Пролиферацию устойчивых стабильно трансфицированных клеток можно обеспечивать с применением методик тканевой культуры, соответствующих типу клеток.

Фрагменты антитела, такие как Fab или Fab', можно получать за счет протеолитического расщепления молекул иммуноглобулина с применением ферментов, таких как папаин (для получения фрагментов Fab) или пепсин (для получения фрагменты Fab') и т. д. В сравнении с фрагментами Fab фрагменты Fab' также содержат шарнирную область, которая содержит два природных цистеина, образующих дисульфидные связи между двумя тяжелыми цепями молекулы иммуноглобулина.

#### Пути терапевтического применения

Конъюгаты по настоящему изобретению применимы при целом ряде применений, в том числе без ограничения для разрушения гемопозитических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом,

например, реципиента трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Соответственно, в данном документе предусмотрены способы разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, посредством введения пациенту эффективного количества любого из конъюгатов, описанных в данном документе. В данном документе также предусмотрены способы кондиционирования пациента, подлежащего трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (например, реципиента трансплантации), посредством введения пациенту эффективного количества любого из конъюгатов, описанных в данном документе, и обеспечения достаточного периода времени, чтобы конъюгаты вывелись из кровяного русла пациента перед проведением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту. Конъюгаты можно вводить пациенту внутривенно. Также предусмотрено применение любых из конъюгатов или фармацевтических композиций, описанных в данном документе, для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом. Дополнительно предусмотрено применение любых из конъюгатов или фармацевтических композиций, описанных в данном документе, при изготовлении лекарственного препарата для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом.

Эндогенные гемопоэтические стволовые клетки обычно постоянно находятся внутри синусов костного мозга. Данное физическое окружение, в котором постоянно находятся стволовые клетки, называют микроокружением стволовых клеток или нишей стволовых клеток. Клетки стромы и другие клетки, входящие в состав данной ниши, обеспечивают растворимые и связанные факторы, которые оказывают множество эффектов. Были высказаны предположения о различных моделях взаимодействия гемопоэтических стволовых клеток и их ниши. Например, была предложена модель, согласно которой во время деления стволовой клетки только одна дочерняя клетка остается в нише, а другая дочерняя клетка покидает нишу для дифференцировки. Было высказано предположение, что эффективность приживления можно увеличивать при селективном разрушении эндогенных гемопоэтических стволовых клеток, открывая тем самым ниши стволовых клеток для приживления донорских стволовых клеток (см., например, WO 2008/067115).

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (HSC) или трансплантация костного мозга (как она называлась раньше) представляет собой общепринятый вид лечения целого ряда заболеваний, поражающих кроветворные стволовые клетки организма,

таких как виды лейкоза, виды тяжелой анемии, дефекты иммунной защиты и некоторые заболевания дефицита ферментов. Такие заболевания зачастую приводят к тому, что пациент нуждается в замене своего костного мозга на новые здоровые клетки крови.

Трансплантация HSC зачастую является аллогенной, это означает, что пациент получает стволовые клетки от другого индивидуума того же вида, кого-нибудь одного из сиблинга, совместимого родственного, идентичного по гаплотипу родственного или неродственного донора-добровольца. По оценкам у приблизительно 30% пациентов, нуждающихся в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, имеется в распоряжении сиблинг, чей тип ткани является подходящим. Остальные 70% пациентов должны полагаться на совместимость с неродственным донором-добровольцем или доступность идентичного по гаплотипу родственного донора. Важно, чтобы характеристики клеток донора и пациента были сопоставимыми. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток также может быть аутогенной, при которой трансплантируемые клетки получены от самого субъекта, т. е. донор и реципиент являются одним и тем же индивидуумом. Кроме того, трансплантации могут быть сингенными, т. е. от генетически идентичного индивидуума, такого как близнец. В дополнительном аспекте трансплантации могут быть ксеногенными, т. е. трансплантат получен от другого вида, что представляет интерес при отсутствии достаточного числа доноров того же вида, например, как в случае трансплантаций органов.

Перед трансплантацией HSC пациенты обычно подвергаются способу предварительной обработки или кондиционирования. Цель данных предварительной обработки или кондиционирования заключается в удалении как можно большего числа нежелательных клеток (например, злокачественных/раковых клеток) в организме, сведении к минимуму отторжения и/или открытия ниши стволовых клеток путем разрушения эндогенных HSC для эффективного приживания донорских стволовых клеток в данные ниши. После этого здоровые HSC донора вводят пациенту внутривенно или, в некоторых случаях, внутрикостно. Однако с трансплантацией HSC ассоциировано множество рисков, в том числе плохое приживание, иммунологическое отторжение, реакция "трансплантат против хозяина" (GVHD) или инфекция. Хотя клетки донора и пациента выглядят одинаковыми в контексте типа ткани, например, совпадают (или идентичны по гаплотипу) молекулы MHC; между такими индивидуумами имеются небольшие отличия, которые иммунные клетки могут воспринимать как

опасные. Это означает, что новая иммунная система (белые кровяные клетки из новых стволовых клеток) воспринимает новое тело как "чужеродное", что провоцирует иммунную атаку. Данная реакция, называемая реакцией "трансплантат против хозяина" (GVHD), может представлять угрозу для жизни пациента. Для пациентов после трансплантации HSC также характерен повышенный риск инфекций вследствие отсутствия белых кровяных клеток до того, как новый костный мозг начнет функционировать. В некоторых случаях этот период может продолжаться много месяцев до тех пор, пока новая иммунная система не созреет. Некоторые из таких оппортунистических инфекций могут представлять угрозу для жизни.

Таким образом, существует необходимость в улучшении способов кондиционирования и трансплантации, а также уменьшении рисков, ассоциированных с трансплантацией HSC и повышении ее эффективности при различных нарушениях. В данном документе предусмотрены новые конъюгаты антитела и лекарственного средства, которые, за счет специфического цитолиза эндогенных HSC реципиента, а не всех остальных иммунных клеток, перед трансплантацией, поддерживают частично активную иммунную защиту для борьбы с инфекциями сразу после трансплантации, но в то же время обеспечивают не прямой иммуносупрессорный эффект вследствие неспособности субъекта формировать новые иммунные клетки из своих собственных HSC. Поскольку предварительная обработка может быть более слабой, чем химиотерапия или облучение, и приводить к менее серьезным побочным эффектам, она может индуцировать меньше GVHD у пациентов, подвергнутых трансплантации.

Конъюгаты антитела и лекарственного средства, описанные в данном документе, можно было бы применять для разрушения эндогенной гемопоэтической стволовой клетки, например, в способе предварительной обработки/кондиционирования перед трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Например, конъюгаты по настоящему изобретению можно было бы применять для лечения любого злокачественного состояния/нарушения, при котором могла бы принести пользу трансплантация стволовых клеток, такого как тяжелая апластическая анемия (SAA), синдром Вискотта-Олдрича, синдром Гурлера, наследственный гематофагоцитарный лимфогистиоцитоз (FHL), хронический гранулематоз (CGD), синдром Костмана, тяжелый иммунодефицитный синдром (SCID), другие аутоиммунные нарушения, такие как SLE, рассеянный склероз, IBD, болезнь Крона, язвенный колит, синдром Шегрена, васкулит,

волчанка, миастения гравис, болезнь Вегенера, врожденные нарушения обмена веществ и/или другие иммунодефициты.

Кроме того, конъюгаты по настоящему изобретению можно было бы применять для лечения любого злокачественного состояния/нарушения, при котором могла бы принести пользу трансплантация стволовых клеток, такого как гематологические заболевания, гематологические злокачественные опухоли или солидные опухоли (например, рак почки, рак печени, рак поджелудочной железы). Распространенные типы гематологических заболеваний/злокачественных опухолей, которые можно было бы лечить с помощью заявленных способов и антител, представляют собой лейкозы, лимфомы и миелодиспластические синдромы. Лейкоз представляет собой тип рака крови или костного мозга, который характеризуется аномальным увеличением числа незрелых белых кровяных клеток, называемых бластные клетки, и термин лейкоз охватывает острый лимфобластный лейкоз (ALL), острый миелогенный лейкоз (AML), острый моноцитарный лейкоз (AMoL), хронический лимфоцитарный лейкоз (CLL), хронический миелогенный лейкоз (CML) и другие лейкозы, такие как волосатоклеточный лейкоз (HCL), Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз (Т-PLL), лейкоз из больших зернистых лимфоцитов и Т-клеточный лейкоз взрослых. В одном аспекте настоящего изобретения подвергаемый лечению лейкоз представляет собой острый лейкоз. В дополнительном аспекте лейкоз представляет собой ALL, AML или AMoL. Лимфомы охватывают лейкоз/лимфому из предшественников Т-клеток, лимфому Беркитта, фолликулярную лимфому, диффузную В-крупноклеточную лимфому, лимфому из клеток мантийной зоны, В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфому, лимфому MALT, фунгоидный микоз, неутонченную периферическую Т-клеточную лимфому, форму ходжкинской лимфомы с нодулярным склерозом, смешанноклеточный подтип ходжкинской лимфомы. Миелодиспластический синдром (MDS) – это название группы состояний, которые наблюдаются при повреждении кроветворных клеток в костном мозге. Такое повреждение приводит к низким количествам одного или нескольких типов клеток крови. MDS подразделяется на 7 категорий: рефрактерная цитопения с однолинейной дисплазией (RCUD), рефрактерная анемия с кольцевидными сидеробластами (RARS), рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией (RCMD), рефрактерная анемия с избытком бластов-1 (RAEB-1), рефрактерная анемия с избытком бластов-2 (RAEB-2), неклассифицированный миелодиспластический синдром (MDS-U) и миелодиспластический синдром, ассоциированный с выделенной

del (5q).

В некоторых вариантах осуществления пациент, нуждающийся в разрушении гемопоэтических стволовых клеток (например, реципиент трансплантации гемопоэтических стволовых клеток), может иметь наследственное иммунодефицитное заболевание, аутоиммунное нарушение, нарушение гемопоэза или врожденные нарушения обмена веществ.

В некоторых вариантах осуществления нарушение гемопоэза может быть выбрано из любого из следующих: острого миелоидного лейкоза (AML), острого лимфобластного лейкоза (ALL), острого моноцитарного лейкоза (AMoL), хронического миелоидного лейкоза (CML), хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL), миелопролиферативных нарушений, миелодиспластических синдромов, множественной миеломы, неходжкинской лимфомы, болезни Ходжкина, апластической анемии, истинной эритроцитарной аплазии, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, анемии Фанкони, большой талассемии, серповидноклеточной анемии, тяжелого комбинированного иммунодефицита, синдрома Вискотта-Олдрича, гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза.

Врожденные нарушения обмена веществ, также известные как наследственные метаболические заболевания (IMB) или присутствующие при рождении метаболические заболевания, которые представляют собой класс генетических заболеваний, охватывают присутствующие при рождении нарушения углеводного метаболизма, метаболизма аминокислот, метаболизма органических кислот или болезни лизосомного накопления. В некоторых вариантах осуществления врожденные нарушения обмена веществ выбраны из мукополисахаридоза, болезни Гоше, метахроматических лейкоцистозов или адренолейкоцистозов.

Кроме того, конъюгаты по настоящему изобретению можно было бы применять для лечения гастроинтестинальной стромальной опухоли (GIST), такой как GIST, которая является положительной по cKIT. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты по настоящему изобретению можно было бы применять для лечения GIST, которая экспрессирует cKIT дикого типа. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты по настоящему изобретению можно было бы применять для лечения GIST, которая является резистентной к средству лечения, например, иматинибу (Glivec®/Gleevec®).

#### **Комбинированная терапия**

В некоторых случаях конъюгат антитела и лекарственного

средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с другой схемой кондиционирования, такой как лучевая терапия или химиотерапия.

В некоторых случаях конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с другим терапевтическим средством, таким как противораковое средство, средство против тошноты (или противорвотное средство), обезболивающее, мобилизирующее средство или их комбинации.

Распространенные химиотерапевтические средства, рассматриваемые для применения в видах комбинированной терапии, включают анастрозол (Arimidex®), бикалутамид (Casodex®), блеомицина сульфат (Blenoxane®), бусульфан (Myleran®), бусульфан в виде инъекции (Busulfex®), капецитабин (Xeloda®), N4-пентоксикарбонил-5-дезоксидеозид-5-фторцитидин, карбоплатин (Paraplatin®), кармустин (BiCNU®), хлорамбуцил (Leukeran®), цисплатин (Platinol®), кладрибин (Leustatin®), циклоспорин (Sandimmune®, Neoral® или Restasis®), циклофосфамид (Cytosan® или Neosar®), цитарабин, цитозина арабинозид (Cytosar-U®), цитарабин в виде липосомной инъекции (DepoCyt®), дакарбазин (DTIC-Dome®), дактиномицин (актиномицин D, Cosmegen), даунорубицина гидрохлорид (Cerubidine®), даунорубицина цитрат в виде липосомной инъекции (DaunoXome®), дексаметазон, доцетаксел (Taxotere®), доксорубицина гидрохлорид (Adriamycin®, Rubex®), этопозид (Vepesid®), флударабина фосфат (Fludara®), 5-фторурацил (Adrucil®, Efudex®), флутамид (Eulexin®), тезацитибин, гемцитабин (дифтордезоксидеозид), гидроксимочевину (Hydrea®), идарубицин (Idamycin®), ифосфамид (IFEX®), иринотекан (Camptosar®), L-аспарагиназу (ELSPAR®), лейковорин кальция, мелфалан (Alkeran®), 6-меркаптопурин (Purinethol®), метотрексат (Folex®), митоксантрон (Novantrone®), милотарг, паклитаксел (Taxol®), феникс (иттрий 90/MX-DTPA), пентостатин, полифероспан 20 с имплантатом кармустина (Gliadel®), тамоксифена цитрат (Nolvadex®), тенипозид (Vumon®), 6-тиогуанин, тиотепу, тирапазамин (Tirazone®), топотекана гидрохлорид для инъекции (Nусамptin®), винбластин (Velban®), винкристин (Oncovin®) и винорелбин (Navelbine®).

В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с блокатором CD47, например, антителом к CD47 или его фрагментом. Сообщалось, что микротело к CD47, которое блокирует взаимодействие между CD47 и сигнальным регуляторным

белком альфа (SIRP $\alpha$ ), может повышать разрушение эндогенных HSC под действием "голого" антитела к c-Kit (Chhabra et al., *Science Translational Medicine* **8** (351), 351ra105).

В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с другим антителом или его фрагментом, которые специфически связываются с гемопозитическими стволовыми клетками или гемопозитическими клетками-предшественниками, например, антителом к CD45 или его фрагментом, антителом к CD34 или его фрагментом, антителом к CD133 или его фрагментом, антителом к CD59 или его фрагментом или антителом к CD90 или его фрагментом. В некоторых вариантах осуществления конъюгаты антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению могут применяться в комбинации с ингибитором Dyrk1a, таким как Harmine, INDY, ML315 гидрохлорид, ProINDY, Tocris™ TC-S 7044, Tocris™ TG 003, FINDY, TBB, DMAT, CaNDY и т. д.

В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с одним или несколькими иммуносупрессорами, такими как глюкокортикоиды, например, преднизон, дексаметазон и гидрокортизон; цитостатиками, например, алкилирующими средствами, антимаетаболитами, метотрексатом, азатиоприном, меркаптопурином, дактиномицином и т. д.; лекарственными средствами, действующими на иммунофилины, например, такролимусом (Prograf®, Astograf XL® или Envarsus XR®), сиролимусом (рапамацин или Rapamune®) и эверолимусом; интерферонами; опиоидами; TNF-связывающими белками; микофенолатом; финголимодом; мириоцином и т. д. В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может применяться в комбинации с одним или несколькими средствами, которые специфически истощают Т клетки, такими как флударабин, циклоспорин, антитело к CD52, например, алемтузумаб, антитимоцитарный глобулин (ATG), антитело к CD3 или его фрагмент, антитело к CD4 или его фрагмент, антитело к CD8 или его фрагмент или антитело к TCR  $\alpha/\beta$  человека или его фрагмент. Виды терапии, направленные на истощение Т-клеток, могут снижать реакцию "хозяин против трансплантата", которая могла бы приводить к отторжению трансплантата.

В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению может

применяться в комбинации с одним или несколькими средствами, выбранными из плериксафора (также известного как AMD3100, Mozobil®), гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), например, сарграмостима (Leukine®), или гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF), например, филграстима или пегфилграстима (Zarzio®, Zarxio®, Neupogen®, Neulasta®, Nufil®, Religrast®, Emgrast®, Neukine®, Grafeel®, Imumax®, Filcad®).

В одном аспекте конъюгат антитела и лекарственного средства по настоящему изобретению объединен в фармацевтическом комбинированном составе со вторым соединением, характеризующимся противораковыми свойствами, или схема введения доз предусматривает комбинированную терапию с ним. Второе соединение фармацевтического комбинированного состава или схемы введения доз может характеризоваться видами активности, которые взаимно дополняют конъюгат из комбинации, вследствие чего они не оказывают неблагоприятного эффекта друг на друга.

Используемый в данном документе термин "фармацевтическая комбинация" относится либо к фиксированной комбинации в форме единицы дозирования, либо к нефиксированной комбинации или набору из частей для комбинированного введения, где два или более терапевтических средств могут вводиться независимо в одно и то же время или по отдельности в пределах временных интервалов, в частности, когда такие временные интервалы обеспечивают возможность демонстрации кооперативного, например синергетического, эффекта партнеров по комбинации.

Термин "комбинированная терапия" относится к введению двух или более терапевтических средств для лечения терапевтического состояния или нарушения, описанного в настоящем изобретении. Такое введение охватывает совместное введение этих терапевтических средств практически одновременно, например, в одной капсуле, имеющей фиксированное отношение активных ингредиентов. В качестве альтернативы такое введение охватывает совместное введение в виде нескольких или отдельных контейнеров (например, капсулы, порошки и жидкости) для каждого активного ингредиента. Порошки и/или жидкости могут быть восстановлены или разбавлены до требуемой дозы перед введением. Кроме того, такое введение также охватывает применение каждого типа терапевтического средства последовательным образом, либо приблизительно в одно и то же время, либо в разное время. В любом случае схема лечения будет обеспечивать приносящие

пользу эффекты комбинации лекарственных средств при лечении состояний или нарушений, описанных в данном документе.

Комбинированная терапия может обеспечивать "синергию" и оказаться "синергетической", т. е. эффект, достигаемый, когда активные ингредиенты применяются вместе, превышает сумму эффектов, которые являются результатом применения соединений по отдельности. Синергетический эффект может быть достигнут, когда активные ингредиенты: (1) составлены вместе и вводятся или доставляются одновременно в виде комбинированного состава с однократной дозой; (2) доставляются по очереди или параллельно как отдельные составы или (3) применяется какая-либо другая схема. При доставке в виде терапии с чередованием синергетический эффект может достигаться, когда соединения вводят или доставляют одно за другим, например, посредством различных инъекций в отдельных шприцах. В целом, во время терапии с чередованием эффективную дозу каждого активного ингредиента вводят одну за другой, т. е. сериями, в то время как при комбинированной терапии эффективную дозу двух или более активных ингредиентов вводят вместе.

#### Фармацевтические композиции

Чтобы приготовить фармацевтические или стерильные композиции, содержащие один или несколько конъюгатов антитела и лекарственного средства, описанных в данном документе, предусмотренный(-ые) конъюгат(-ы) может(могут) смешиваться с фармацевтически приемлемым носителем или вспомогательным веществом.

Составы терапевтических и диагностических средств могут быть получены путем смешивания с физиологически приемлемыми носителями, вспомогательными веществами или стабилизаторами в форме, например, лиофилизированных порошков, взвесей, водных растворов, лосьонов или суспензий (см., например, Hardman et al., Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, New York, N.Y., 2001; Gennaro, Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott, Williams, and Wilkins, New York, N.Y., 2000; Avis, et al. (eds.), Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications, Marcel Dekker, NY, 1993; Lieberman, et al. (eds.), Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Marcel Dekker, NY, 1990; Lieberman, et al. (eds.) Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse Systems, Marcel Dekker, NY, 1990; Weiner and Kotkoskie, Excipient Toxicity and Safety, Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., 2000).

В некоторых вариантах осуществления фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат антитела по настоящему

изобретению, представляет собой лиофилизированный препарат. В некоторых вариантах осуществления фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат антитела, представляет собой лиофилизат во флаконе, содержащем конъюгат антитела, гистидин, сахарозу и полисорбат 20. В некоторых вариантах осуществления фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат антитела, представляет собой лиофилизат во флаконе, содержащем конъюгат антитела, сукцинат натрия и полисорбат 20. В некоторых вариантах осуществления фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат антитела, представляет собой лиофилизат во флаконе, содержащем конъюгат антитела, трегалозу, цитрат и полисорбат 8. Лيوфилизат может быть восстановлен, например, с помощью воды, солевого раствора для инъекции. В конкретном варианте осуществления раствор содержит конъюгат антитела, гистидин, сахарозу и полисорбат 20 при pH, составляющем приблизительно 5,0. В другом специфическом варианте осуществления раствор содержит конъюгат антитела, сукцинат натрия и полисорбат 20. В другом специфическом варианте осуществления раствор содержит конъюгат антитела, дегидрат трегалозы, дегидрат цитрата, лимонную кислоту и полисорбат 8 при pH, составляющем приблизительно 6,6. Для внутривенного введения полученный раствор обычно будут дополнительно разбавлять в растворе носителя.

Выбор схемы введения для терапевтического средства зависит от нескольких факторов, в том числе интенсивности метаболизма сыворотки или ткани для объекта, уровня симптомов, иммуногенности объекта и доступности клеток-мишеней в биологической матрице. В некоторых вариантах осуществления схема введения максимизирует количество терапевтического средства, доставляемого пациенту, в соответствии с приемлемым уровнем побочных эффектов. Соответственно, количество доставляемого биологического средства частично зависит от конкретного объекта и тяжести состояния, подлежащего лечению. Руководства по подбору подходящих доз антител, цитокинов и малых молекул являются доступными (см., например, Wawrzynczak, *Antibody Therapy*, Bios Scientific Pub. Ltd, Oxfordshire, UK, 1996; Kresina (ed.), *Monoclonal Antibodies, Cytokines and Arthritis*, Marcel Dekker, New York, N.Y., 1991; Bach (ed.), *Monoclonal Antibodies and Peptide Therapy in Autoimmune Diseases*, Marcel Dekker, New York, N.Y., 1993; Baert et al., *New Engl. J. Med.* 348:601-608, 2003; Milgrom et al., *New Engl. J. Med.* 341:1966-1973, 1999; Slamon et al., *New Engl. J. Med.* 344:783-792,

2001; Beniaminovitz et al., New Engl. J. Med. 342:613–619, 2000; Ghosh et al., New Engl. J. Med. 348:24–32, 2003; Lipsky et al., New Engl. J. Med. 343:1594–1602, 2000).

Определение подходящей дозы выполняет лечащий врач, например, с применением параметров или факторов, которые, как известно или ожидаемо из уровня техники, воздействуют на лечение или, как прогнозируют, воздействуют на лечение. Обычно начинают дозирование с количества, несколько меньшего, чем оптимальная доза, и после этого ее повышают небольшими шагами до тех пор, пока не достигается требуемый или оптимальный эффект по сравнению с любыми отрицательными побочными эффектами. Важные диагностические показатели включают, например, показатели, являющиеся симптомами воспаления или уровень продуцируемых воспалительных цитокинов.

Фактические уровни дозы активных ингредиентов в фармацевтических композициях по настоящему изобретению могут варьироваться для того, чтобы получить количество активного ингредиента, которое является эффективным для достижения требуемого терапевтического ответа у конкретного пациента, эффективным в отношении композиции и способа введения, при этом не токсично для пациента. Выбранный уровень дозы будет зависеть от ряда фармакокинетических факторов, в том числе активности конкретных используемых композиций по настоящему изобретению, пути введения, времени введения, скорости выведения конкретного используемого соединения, длительности лечения, других лекарственных средств, соединений и/или материалов, применяемых в комбинации с конкретными используемыми композициями, возраста, пола, массы тела, состояния, общего состояния здоровья и анамнеза пациента, подлежащего лечению, и аналогичных факторов, известных в области техники медицины.

Композиции, содержащие конъюгат антитела по настоящему изобретению, могут вводиться в помощь непрерывной инфузии или с помощью доз с интервалами, составляющими, например, один день, одну неделю, или вводиться 1–7 раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели, раз в четыре недели, раз в пять недель, раз в шесть недель, раз в семь недель или раз в восемь недель. Дозы могут вводиться внутривенно, подкожно или внутрикостно. Специфический протокол введения доз является таким, который предусматривает максимальную дозу или частоту введения доз, которые позволяют избежать значительных нежелательных побочных эффектов.

Для конъюгатов антитела по настоящему изобретению доза,

вводимая пациенту, может составлять от 0,0001 мг/кг до 100 мг/кг массы тела пациента. Доза может составлять от 0,001 мг/кг до 50 мг/кг, от 0,005 мг/кг до 20 мг/кг, от 0,01 мг/кг до 20 мг/кг, от 0,02 мг/кг до 10 мг/кг, от 0,05 до 5 мг/кг, от 0,1 мг/кг до 10 мг/кг, от 0,1 мг/кг до 8 мг/кг, от 0,1 мг/кг до 5 мг/кг, от 0,1 мг/кг до 2 мг/кг, от 0,1 мг/кг до 1 мг/кг массы тела пациента. Доза конъюгата антитела может быть рассчитана с применением массы пациента в килограммах (кг), умноженной на подлежащую введению дозу в мг/кг.

Дозы конъюгатов антитела по настоящему изобретению могут быть повторными, а введения могут быть разделены менее чем 1 днем, по меньшей мере 1 днем, 2 днями, 3 днями, 5 днями, 10 днями, 15 днями, 30 днями, 45 днями, 2 месяцами, 75 днями, 3 месяцами, 4 месяцами, 5 месяцами или по меньшей мере 6 месяцами. В некоторых вариантах осуществления конъюгат антитела по настоящему изобретению вводят два раза в неделю, раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели, раз в четыре недели или менее часто.

Эффективное количество для конкретного пациента может варьироваться в зависимости от таких факторов, как подлежащее лечению состояние, общее состояние здоровья пациента, способ, путь и доза введения и тяжесть побочных эффектов (см., например, *Maynard et al., A Handbook of SOPs for Good Clinical Practice, Interpharm Press, Boca Raton, Fla., 1996; Dent, Good Laboratory and Good Clinical Practice, Urch Publ., London, UK, 2001*).

Путем введение может быть, например, местное нанесение или нанесение на кожу, инъекция или инфузия посредством подкожного, внутривенного, внутрибрюшинного, внутримозгового, внутримышечного, внутриглазного, внутриартериального, внутриспинального, внутриочагового введения, или системы замедленного высвобождения или имплантат (см., например, *Sidman et al., Biopolymers 22:547-556, 1983; Langer et al., J. Biomed. Mater. Res. 15:167-277, 1981; Langer, Chem. Tech. 12:98-105, 1982; Epstein et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82:3688-3692, 1985; Hwang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:4030-4034, 1980; патенты США № 6350466 и 6316024*). При необходимости композиция может также содержать солюбилизующее средство и местный анестетик, такой как лидокаин, для облегчения боли в месте инъекции, или их оба. Кроме того, также можно использовать ингаляционное введение, например, за счет применения ингалятора или распылителя и состава со средством в виде аэрозоля. См.,

например, патенты США №№ 6019968, 5985320, 5985309, 5934272, 5874064, 5855913, 5290540 и 4880078; и публикации согласно РСТ №№ WO 92/19244, WO 97/32572, WO 97/44013, WO 98/31346 и WO 99/66903, каждая из которых включена в данный документ посредством ссылки во всей своей полноте.

Способы совместного введения или лечения с применением второго терапевтического средства, например, цитокина, стероида, химиотерапевтического средства, антибиотика, или облучения (такого как тотальное облучение тела (TBI)), известны из уровня техники (см., например, Hardman et al., (eds.) (2001) Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10.sup.th ed., McGraw-Hill, New York, N.Y.; Poole and Peterson (eds.) (2001) Pharmacotherapeutics for Advanced Practice: A Practical Approach, Lippincott, Williams & Wilkins, Phila., Pa.; Chabner and Longo (eds.) (2001) Cancer Chemotherapy and Biotherapy, Lippincott, Williams & Wilkins, Phila., Pa.). Эффективное количество терапевтического средства может снижать симптомы на по меньшей мере 10%; по меньшей мере 20%; по меньшей мере приблизительно 30%; по меньшей мере 40% или по меньшей мере 50%.

Дополнительные виды терапии, которые можно применять в комбинации с конъюгатами антитела по настоящему изобретению, можно применять с интервалом менее 5 минут, с интервалом менее 30 минут, с интервалом 1 час, с интервалом приблизительно 1 час, с интервалом от приблизительно 1 до приблизительно 2 часов, с интервалом от приблизительно 2 часов до приблизительно 3 часов, с интервалом от приблизительно 3 часов до приблизительно 4 часов, с интервалом от приблизительно 4 часов до приблизительно 5 часов, с интервалом от приблизительно 5 часов до приблизительно 6 часов, с интервалом от приблизительно 6 часов до приблизительно 7 часов, с интервалом от приблизительно 7 часов до приблизительно 8 часов, с интервалом от приблизительно 8 часов до приблизительно 9 часов, с интервалом от приблизительно 9 часов до приблизительно 10 часов, с интервалом от приблизительно 10 часов до приблизительно 11 часов, с интервалом от приблизительно 11 часов до приблизительно 12 часов, с интервалом от приблизительно 12 часов до 18 часов, с интервалом от 18 часов до 24 часов, с интервалом от 24 часов до 36 часов, с интервалом от 36 часов до 48 часов, с интервалом от 48 часов до 52 часов, с интервалом от 52 часов до 60 часов, с интервалом от 60 часов до 72 часов, с интервалом от 72 часов до 84 часов, с интервалом от 84 часов до 96 часов или с интервалом от 96 часов до 120 часов от

введения конъюгатов антитела по настоящему изобретению. Два или более видов терапии могут применяться во время одного и того же визита пациента.

В настоящем изобретении предусмотрены протоколы для введения субъекту, нуждающемуся в этом, фармацевтической композиции, содержащей конъюгаты антитела по настоящему изобретению, отдельно или в комбинации с другими видами терапии. Виды терапии из видов комбинированной терапии по настоящему изобретению могут применяться в отношении субъекта одновременно или последовательно. Терапию из видов комбинированной терапии по настоящему изобретению также можно применять циклически. Циклическая терапия предусматривает введение первого средства терапии в течение некоторого периода времени, а затем введения второго средства терапии в течение некоторого периода времени и повторения такого последовательного введения, т. е. цикла, с целью снижения развития устойчивости к одному из видов терапии (например, средствам), для недопущения или снижения побочных эффектов одного из видов терапии (например, средств) и/или для улучшения эффективности видов терапии.

Виды терапии из видов комбинированной терапии по настоящему изобретению можно применять в отношении субъекта одновременно.

Термин "одновременно" не ограничивается применением видов терапии точно в одно и то же время, а скорее означает, что фармацевтическую композицию, содержащую антитела или их фрагменты по настоящему изобретению, вводят субъекту последовательно и в течение временного интервала таким образом, чтобы антитела или конъюгаты антитела по настоящему изобретению могли действовать вместе с другим(-и) видом(-ами) терапии для обеспечения большей пользы, чем если бы их вводили иным способом. Например, каждый вид терапии может применяться в отношении субъекта в одно и то же время или последовательно в любом порядке в различные моменты времени; однако, если их не применяют в одно и то же время, их следует применять достаточно близко по времени, чтобы обеспечить требуемый терапевтический эффект. Каждый вид терапии можно применять в отношении субъекта по отдельности, в любой подходящей форме и с помощью любого подходящего пути. В различных вариантах осуществления виды терапии применяют в отношении субъекта с интервалом менее 5 минут, с интервалом менее 15 минут, с интервалом менее 30 минут, с интервалом менее 1 часа, с интервалом приблизительно 1 час, с интервалом от приблизительно 1 часа до

приблизительно 2 часов, с интервалом от приблизительно 2 часов до приблизительно 3 часов, с интервалом от приблизительно 3 часов до приблизительно 4 часов, с интервалом от приблизительно 4 часов до приблизительно 5 часов, с интервалом от приблизительно 5 часов до приблизительно 6 часов, с интервалом от приблизительно 6 часов до приблизительно 7 часов, с интервалом от приблизительно 7 часов до приблизительно 8 часов, с интервалом от приблизительно 8 часов до приблизительно 9 часов, с интервалом от приблизительно 9 часов до приблизительно 10 часов, с интервалом от приблизительно 10 часов до приблизительно 11 часов, с интервалом от приблизительно 11 часов до приблизительно 12 часов, с интервалом 24 часа, с интервалом 48 часов, с интервалом 72 часа или с интервалом 1 неделя. В других вариантах осуществления два или более видов терапии применяются во время одного и того же визита пациента.

Виды комбинированной терапии могут вводиться субъекту в одной фармацевтической композиции. В качестве альтернативы терапевтические средства из видов комбинированной терапии могут вводиться субъекту одновременно в отдельных фармацевтических композициях. Терапевтические средства могут вводиться субъекту с помощью одного и того же или различных путей введения.

Следует понимать, что примеры и варианты осуществления, описанные в данном документе, предназначены только для иллюстративных целей, и что различные модификации или изменения в их свете будут предложены специалистам в данной области техники и должны быть включены в сущность и область действия настоящей заявки и объем прилагаемой формулы изобретения.

#### ПРИМЕРЫ

Пример 1. Получение ADC к cKIT

**Получение антител и фрагментов антител к cKIT, содержащих сайт-специфические цистеиновые мутации, или без них**

Человеческие антитела и фрагменты антител к cKIT получали, как описано ранее в WO2014150937 и WO2016020791.

ДНК, кодирующую переменные области тяжелой и легкой цепей антитела к cKIT, амплифицировали из вектора, выделенного в скрининге на основе фагового дисплея, и клонировали в векторы экспрессии для клеток млекопитающих, которые содержат константные области тяжелой цепи человеческого IgG1 и человеческой легкой каппа-цепи или легкой лямбда-цепи. Векторы содержат промотор CMV и сигнальный пептид (MPLLLLLLPLWAGALA (SEQ ID NO: 151) для тяжелой цепи и MSVLTQVLALLLWLTGTRC (SEQ ID NO: 152) для легкой цепи, а

также соответствующие сигнальную последовательность и последовательность отбора для амплификации ДНК в бактериальном хозяине, например, клетках DH5альфа *E. coli*, временной экспрессии в клетках млекопитающих, например, клетках HEK293, или стабильной трансфекции в клетки млекопитающих, например, клетки CHO. Для введения Cys-мутаций ПЦР с сайт-направленным мутагенезом проводили с применением олигонуклеотидов, разработанных для замены одиночных Cys-остатков в определенном сайте в константных областях кодирующих последовательностей тяжелой цепи или легкой цепи. Примерами мутаций с Cys-заменой являются E152C или S375C в тяжелой цепи; E165C или S114C в легкой каппа-цепи или A143C в легкой лямбда-цепи (все нумерация EU). В некоторых случаях две или более Cys-мутаций объединяли, чтобы получить антитело с несколькими Cys-заменами, например, HC-E152C-S375C, лямбда-LC-A143C-HC-E152C, каппа-LC-E165C-HC-E152C или каппа-LC-S114C-HC-E152C (все нумерация EU). Для получения плазмид, кодирующих фрагменты антител, ПЦР с мутагенезом проводили с олигонуклеотидами, разработанными для удаления или модификации части константной области тяжелой цепи. Например, осуществляли ПЦР с удалением остатков 222-447 (нумерация EU) константной области тяжелой цепи, чтобы непосредственно после остатка 221 (нумерация EU) был закодирован стоп-кодон, с целью осуществления экспрессии конструкции с получением фрагмента Fab. Например, осуществляли ПЦР с удалением остатков 233-447 (нумерация EU) константной области тяжелой цепи, чтобы непосредственно после остатка 232 (нумерация EU) был закодирован стоп-кодон, с целью осуществления экспрессии конструкции с получением фрагмента Fab', содержащего два Cys-остатка шарнирной области IgG1.

Антитела, фрагменты антител и Cys-мутантные антитела или фрагменты антител к sKIT экспрессировали в клетках 293 Freestyle™ за счет совместной трансфекции плазмид для тяжелой цепи и легкой цепи с применением способов временной трансфекции, описанных ранее (Meissner, *et al.*, *Biotechnol Bioeng.* 75:197-203 (2001)). Экспрессированные антитела очищали из клеточных супернатантов с помощью стандартных способов аффинной хроматографии с применением подходящей смолы, такой как смолы с белком A, белком G, Capto-L или LambdaFabSelect. В качестве альтернативы антитела, фрагменты антител и Cys-мутантные антитела или фрагменты антител к sKIT экспрессировали в клетках CHO за счет совместной трансфекции вектора для тяжелой цепи и вектора для легкой цепи в клетки CHO.

Клетки проходили отбор, а затем стабильно трансфицированные клетки культивировали в условиях, оптимизированных для выработки антител. Антитела очищали из клеточных супернатантов, как указано выше.

#### **Восстановление, повторное окисление и конъюгация антител и фрагментов антител к sK1T с токсинами**

Соединения, содержащие реакционноспособный фрагмент, например малеимидную группу, вступающий в реакцию с тиольной группой (боковая цепь Cys) на антителе или фрагменте антитела, описанный линкер и функциональный фрагмент, такой как ауристин или другой токсин, конъюгировали с Cys-остатками, нативными или введенными путем конструирования в антитело, с применением способов, описанных ранее (например, в WO2014124316, WO2015138615, Junutula JR, et al., Nature Biotechnology 26:925-932 (2008)).

Поскольку введенные путем конструирования Cys-остатки в антителах, экспрессируемых в клетках млекопитающих, во время биосинтеза модифицируются за счет аддуктов (дисульфидов), таких как глутатион (GSH) и/или цистеин (Chen et al. 2009), изначально экспрессированный модифицированный Cys не реагирует с реагентами, вступающими в реакцию с тиолами, такими как малеими́до- или бромацетамидная или йодацетамидная группы. Для осуществления конъюгации по введенным путем конструирования Cys-остаткам глутатионовый или цистеиновый аддукты должны быть удалены путем восстановления дисульфидов, что обычно вызывает восстановление всех дисульфидов в экспрессированном антителе. Поскольку нативные Cys-остатки в антителах и фрагментах антител обычно образуют дисульфидные связи с другими Cys-остатками в антителе или фрагменте антитела, они также не реагируют с реагентами, вступающими в реакцию с тиолами, пока дисульфиды не восстановлены. Восстановление дисульфидов можно осуществлять вначале путем воздействия на антитело восстановителем, таким как дитиотреитол (DTT), цистеин или трис(2-карбоксиэтил)фосфина гидрохлорид (TCEP-HCl). Необязательно восстановитель можно удалять, чтобы обеспечить возможность повторного окисления всех нативных дисульфидных связей антитела или фрагмента антитела для возобновления и/или стабилизации функциональной структуры антитела.

В случаях, когда антитело или фрагмент антитела конъюгировали только по введенным путем конструирования Cys-остаткам, для восстановления нативных дисульфидных связей и дисульфидной связи между цистеиновым или GSH аддуктами у введенного(-ых) путем конструирования Cys-остатка(-ов) к очищенным антителам с Cys-

мутацией добавляли свежеполученный DTT до конечной концентрации, составляющей 10 мМ или 20 мМ. После инкубации антитела с DTT при 37°C в течение 1 часа смеси диализировали против PBS в течение трех дней с ежедневной заменой буфера для удаления DTT и повторного окисления нативных дисульфидных связей. Процесс повторного окисления отслеживали с помощью HPLC с обращенной фазой, которая позволяла разделять тетрамеры антитела и отдельные молекулы тяжелой и легкой цепи. Реакционные смеси анализировали на колонке PRLP-S 4000A (50 мм x 2,1 мм, Agilent), нагретой до 80°C, и элюирование в колонке проводили с помощью линейного градиента 30–60% ацетонитрила в воде, содержащей 0,1% TFA, при расходе 1,5 мл/мин. Элюирование белков из колонки отслеживали при 280 нм. Обеспечивали продолжения диализа до тех пор, пока не завершалось повторное окисление. Повторное окисление возобновляет внутрицепочечные и межцепочечные дисульфиды, при этом диализ обеспечивает возможность того, что цистеины и глутатионы, присоединенные к вновь введенному (-ым) Cys-остатку (-ам), вымываются при диализе. После повторного окисления к повторно окисленным антителам или фрагментам антител в PBS-буфере (pH 7,2) добавляли малеимидсодержащие соединения, как правило, при отношениях 1,5:1, 2:1 или 5:1 к введенному путем конструирования Cys, и инкубации проводили в течение 1 часа. Как правило, избыток свободного соединения удаляли очисткой с пропусканием через белок А или другую подходящую смолу с помощью стандартных способов, а затем заменой буфера на PBS.

В качестве альтернативы, антитела или фрагменты антител с сайтами введенного путем конструирования Cys восстанавливали и повторно окисляли с применением способа "на смоле". Сефарозные гранулы с белком А (1 мл на 10 мг антитела) уравнивали в PBS (не содержащем солей кальция или магния) и затем добавляли в образец антитела партиями. Исходный 0,5 М раствор цистеина получали путем растворения 850 мг цистеина-HCl в 10 мл раствора, полученного добавлением 3,4 г NaOH к 250 мл 0,5 М фосфата натрия, pH 8,0, а затем 20 мМ цистеина добавляли к взвеси антитело/гранулы и аккуратно смешивали при комнатной температуре в течение 30–60 минут. Гранулы загружали на колонку с гравитационным элюированием и промывали с помощью 50 объемов слоя PBS за менее чем 30 минут. Затем колонку уплотняли гранулами, ресуспендированными в одном объеме слоя PBS. Для модуляции степени повторного окисления необязательно добавляли от 50 нМ до 1 мкМ хлорида меди. Прогресс

повторного окисления отслеживали путем изъятия небольшого тестируемого образца из смолы, элюирования в буфере для элюирования IgG (Thermo) и анализа с помощью RP-HPLC, как описано выше. Как только повторное окисление продвигалось до требуемой полноты, можно было инициировать конъюгацию путем непосредственного добавления 2–3 молярного избытка соединения относительно введенных путем конструирования цистеинов и обеспечения возможности прохождения реакции в смеси в течение 5–10 минут при комнатной температуре перед промывкой колонки с помощью по меньшей мере 20 объемов колонки PBS. Конъюгаты антитела элюировали с помощью буфера для элюирования IgG и нейтрализовали с помощью 0,1 объема 0,5 М фосфата натрия, pH 8,0, и проводили замену буфера на PBS. В некоторых случаях, вместо инициирования конъюгации с антителом на смоле колонку промывали с помощью по меньшей мере 20 объемов колонки PBS, и антитело элюировали с помощью буфера для элюирования IgG и нейтрализовали с помощью буфера с pH 8,0. Затем антитела либо применяли для реакций конъюгации, либо подвергали мгновенному замораживанию для будущего применения.

В некоторых случаях требовалась конъюгация по нативным Cys-остаткам, таким как остатки, которые обычно образуют межцепочечную дисульфидную связь между тяжелой цепью и легкой цепью, и Cys-остатки в шарнирной области антитела, которые обычно образуют межцепочечные дисульфидные связи между тяжелой цепью и тяжелой цепью, в отсутствие введенных путем конструирования Cys-остатков или одновременно с конъюгацией, также направленной на введенные путем конструирования Cys-остатки. В таких случаях антитело или фрагмент антитела восстанавливали путем добавления 5-кратного избытка TCEP относительно дисульфидных связей и инкубации образца при 37°C в течение 1 часа. Затем образцы непосредственно подвергали конъюгации или замораживали при  $< -60^{\circ}\text{C}$  для будущей конъюгации. К антителам или фрагментам антител в PBS-буфере (pH 7,2) добавляли малеимидсодержащие соединения, как правило, при отношениях 2:1 к Cys-остаткам, применяемым для конъюгации, и инкубации проводили в течение 1 часа. Как правило, избыток свободного соединения удаляли с помощью обессоливающей колонки, а затем более интенсивной заменой буфера на PBS.

Конъюгация по лизиновым остаткам может проводиться за счет осуществления реакции антител или фрагментов антитела с соединением линкер-лекарственное средство, которое содержит

группу, реагирующую с аминной группой, такую как NHS-сложноэфирная или тетрафторфенилсложноэфирная (например, соединение (7), SMCC-DM1, сульфо-SPDB-DM4 или SPDB-DM4). В качестве примера соединение (7) конъюгировали по лизиновым остаткам на Fab к HER2-НС-E152С. Конкретно, Fab к HER2-НС-E152С экспрессировали с помощью временной трансфекции в клетках HEK293. Fab захватывали из среды с помощью аффинной очистки с capto-L (GE Healthcare), элюировали в буфер для элюирования IgG (Pierce) и проводили замену буфера на PBS с помощью ультрацентрифужного концентратора (Amicon). К раствору Fab (5,8 мг/мл) добавляли 2-кратный молярный избыток соединения (7). Смесь инкубировали при комнатной температуре в течение 30 минут и затем смесь гасили с помощью 50 мМ Tris, pH 8. Затем полученный конъюгат очищали с помощью препаративной SEC в PBS.

#### **Получение фрагментов антител из полноразмерных антител**

В некоторых случаях фрагменты антител получали путем генетической манипуляции с кодирующей последовательностью тяжелой цепи антитела, как описано выше, вследствие чего продуктом экспрессии был фрагмент антитела. В других случаях антитела получали путем ферментативного расщепления полноразмерных антител.

Для получения фрагментов Fab, содержащих остатки 1-222 (нумерация EU) исходного антитела, полноразмерное антитело обрабатывали смолой с иммобилизованным папаином (ThermoFisher Scientific) в соответствии с протоколом производителя. Вкратце, смолу с иммобилизованным папаином готовят путем уравнивания в буфере для расщепления из свежерастворенного 20 мМ цистеина-HCl, доведенного до pH 7,0. Содержание антитела доводят до примерно 10 мг/мл и проводят замену буфера на буфер для расщепления и добавляют к смоле при отношении, составляющем 4 мг IgG на мл смолы, и инкубируют при 37°C в течение 5-7 часов. Затем смолу удаляют и фрагмент антитела очищают с помощью любой из подходящих аффинных смол, например, интактный IgG и фрагмент Fc отделяют от фрагмента Fab за счет связывания со смолой с белком А, или разделение проводят с помощью эксклюзионной хроматографии.

Для получения фрагментов F(ab')<sub>2</sub>, содержащих остатки 1-236 (нумерация EU) исходного антитела, полноразмерное антитело обрабатывали с помощью протеолитического фермента. Вкратце, антитело готовят в PBS из расчета примерно 10 мг/мл. Фермент добавляют при отношении 1:100 вес/вес и инкубируют в течение 2 часов при 37°C. Фрагмент антитела очищают с помощью любой из подходящих аффинных смол, например, интактный IgG и фрагмент Fc

отделяют от фрагмента Fab за счет связывания со смолой с белком А, или разделение проводят с помощью эксклюзионной хроматографии.

#### **Свойства конъюгатов токсина и антитела и фрагмента антитела к cKIT**

Конъюгаты антитела и фрагмента антитела анализировали для определения степени конъюгации. Отношение соединения-к-антителу экстраполировали на основании данных LC-MS для восстановленных и дегликозилированных образцов (в соответствующих случаях). LC/MS обеспечивает возможность получения количественной оценки среднего количества молекул линкер-полезная нагрузка (соединение), присоединенных к антителу в образце конъюгата. Жидкостная хроматография при высоких давлениях (HPLC) разделяет антитело на легкую и тяжелую цепи, а при восстанавливающих условиях разделяет тяжелую цепь (HC) и легкую цепь (LC) в соответствии с количеством групп линкер-полезная нагрузка на цепь. Данные масс-спектров позволяют идентифицировать разновидности компонентов в смеси, например, LC, LC+1, LC+2, HC, HC+1, HC+2 и т. д. На основании средней нагрузки на цепях LC и HC для конъюгата антитела можно рассчитать среднее отношение соединения к антителу. Отношение соединения-к-антителу для указанного образца конъюгата представляет собой среднее количество молекул соединения (линкер-полезная нагрузка), присоединенных к тетрамерному антителу, содержащему две легкие цепи и две тяжелые цепи.

Профиль конъюгатов определяли с применением аналитической эксклюзионной хроматографии (AnSEC) на колонках Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare) и/или Protein KW-803 5 мкм 300×8 мм (Shodex); агрегацию анализировали на основании аналитической эксклюзионной хроматографии.

#### **Получение иллюстративных конъюгатов Fab cKIT и токсина**

Для получения конъюгатов Fab' к cKIT и токсина DAR4 или контрольного конъюгата Fab к Her2 и токсина DAR4, 50 мкг полноразмерного IgG (WT, без введенных цистеинов) расщепляли с помощью протеолитического фермента. Фрагмент F(ab')<sub>2</sub> очищали посредством SEC на колонке Superdex-S200 (GE Healthcare). В качестве альтернативы для получения контрольных конъюгатов, связывающихся с HER2, или конъюгатов Fab' к cKIT и токсина DAR4 вектор, кодирующий HC Fab', трансфицировали в клетки CHO совместно с вектором, кодирующим LC Fab'. Экспрессированный Fab' очищали посредством захвата на смоле с белком G. F(ab')<sub>2</sub> или Fab' восстанавливали путем добавления TCEP (5x избыток относительно

числа межцепочечных дисульфидов) и проводили непосредственную реакцию с соединением по настоящему изобретению (2,5х избыток относительно числа свободных Cys-остатков). Протекание реакции отслеживали с помощью RP-HPLC, и дополнительные 1х эквиваленты соединения добавляли до завершения реакции. Свободное соединение удаляли с помощью обессоливающей колонки PD10 (GE Healthcare). Экспериментально определили, что DAR составляло  $\geq 3,9$ . Специфические конъюгаты, исследованные дополнительно в предусмотренных примерах, перечислены в таблице 2.

Для получения конъюгатов Fab к cKIT и токсина DAR2 вектор, кодирующий HC Fab с введенным Cys-остатком (HC 1-221 с E152C согласно нумерации EU) трансфицировали в клетки HEK293 совместно с вектором, кодирующим LC Fab с введенным Cys-остатком (каппа-LC K107C, каппа-LC S114C или каппа-LC E165C согласно нумерации EU). Для получения контрольных конъюгатов Fab к Her2 и токсина DAR2 вектор, кодирующий HC Fab с введенным Cys-остатком (HC 1-222 с E152C согласно нумерации EU и C-концевая His<sub>6</sub>-метка (SEQ ID NO: 162)) трансфицировали в клетки HEK293 совместно с вектором, кодирующим LC Fab с введенным Cys-остатком (каппа-LC K107C, каппа-LC S114C или каппа-LC E165C согласно нумерации EU). Экспрессированные Fab очищали посредством захвата на смоле с Capto-L (GE Healthcare) и элюирования с помощью стандартного буфера для элюирования IgG (Thermo). Для Fab проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon ultra. Fab восстанавливали с помощью DTT и обеспечивали возможность повторного окисления при комнатной температуре. После повторного образования межцепочечной дисульфидной связи Fab конъюгировали с соединением 6 (3х избыток относительно числа свободных Cys-остатков). Обеспечивали возможность протекания реакции в течение 30 мин при комнатной температуре и ее отслеживали с помощью RP-HPLC с обнаружением при 310 нм. Конъюгированные Fab очищали пропусканием через смолы с белком A (связывает her2) или capto-L (связывает cKIT) и промывали с помощью PBS+1% Triton X-100 и промывали с помощью большого количества PBS перед проведением элюирования в буфере для элюирования IgG. Затем для Fab проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon Ultra. Специфические конъюгаты, исследованные дополнительно в предусмотренных примерах, перечислены в таблице 2 ниже с экспериментально определенными значениями DAR.

Для получения конъюгатов F(ab')<sub>2</sub> к cKIT и токсина DAR2 вектор,

кодирующий НС с введенными Cys-остатками (E152C и S375C согласно нумерации EU), трансфицировали в клетки CHO совместно с вектором, кодирующим LC Fab. Для получения контрольных конъюгатов F(ab')<sub>2</sub> к Her2 и токсина DAR2 вектор, кодирующий НС с введенными Cys-остатками (E152C и S375C согласно нумерации EU), трансфицировали в клетки HEK293 совместно с вектором, кодирующим LC Fab. Экспрессированные IgG очищали посредством захвата на смоле с белком А или смоле MabSelectSure (GE Healthcare) и элюирования с помощью стандартного буфера для элюирования IgG (Thermo). Полноразмерные IgG восстанавливали с помощью DTT при комнатной температуре и повторно окисляли после удаления DTT, что отслеживали с помощью RP-HPLC. Затем повторно окисленные IgG расщепляли с помощью протеолитического фермента для получения фрагментов F(ab')<sub>2</sub>. В случае фрагментов, связывающих cKIT, для F(ab')<sub>2</sub> проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon ultra. В случае фрагментов, связывающих HER2, фракцию F(ab')<sub>2</sub> обогащали с помощью препаративной HIC, а затем проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon ultra. F(ab')<sub>2</sub> конъюгировали с соединением 4 или соединением 5 (4x избыток относительно числа свободных Cys-остатков). Обеспечивали возможность протекания реакции в течение 30 мин при комнатной температуре и ее отслеживали с помощью RP-HPLC с обнаружением при 310 нм. Конъюгированные F(ab')<sub>2</sub> очищали пропусканием через смолы с capto-L (Ab3 к cKIT), и промывали с помощью PBS+1% Triton X-100, и промывали с помощью большого количества PBS перед элюированием в буфере для элюирования IgG или с помощью препаративной SEC (антитело к her2 и Ab4 к cKIT). Затем F(ab')<sub>2</sub> концентрировали и проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon Ultra. Специфические конъюгаты, исследованные дополнительно в предусмотренных примерах, перечислены в таблице 2 ниже с экспериментально определенными значениями DAR.

Для получения конъюгатов Fab к cKIT и токсина DAR1 вектор, кодирующий НС с введенными Cys-остатками (E152C согласно нумерации EU), трансфицировали в клетки HEK293 совместно с вектором, кодирующим LC Fab. Экспрессированные IgG очищали посредством захвата на смоле с белком А (GE Healthcare) и элюирования с помощью стандартного буфера для элюирования IgG (Thermo). Полноразмерные IgG восстанавливали с помощью DTT при комнатной температуре и повторно окисляли после удаления DTT, что отслеживали с помощью RP-HPLC. IgG расщепляли с помощью иммобилизованного папаина

(Thermo) для получения фрагмента Fab. Для Fab проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon ultra. Fab конъюгировали с соединением 4 (4х избыток относительно числа свободных Cys-остатков). Обеспечивали возможность протекания реакции в течение 30 мин при комнатной температуре и ее отслеживали с помощью RP-HPLC с обнаружением при 310 нм. Конъюгированные Fab очищали посредством препаративной SEC в PBS.

Для получения контрольных конъюгатов Fab к Her2 и токсина DAR1 вектор, кодирующий HC Fab с введенными Cys-остатками (E152C согласно нумерации EU), трансфицировали в клетки HEK293 совместно с вектором, кодирующим LC Fab. Экспрессированные Fab очищали посредством захвата на смоле с Capto-L (GE Healthcare) и элюирования с помощью стандартного буфера для элюирования IgG (Thermo). Для Fab проводили замену буфера на PBS с применением устройства Amicon ultra. Fab конъюгировали с соединением 7 (2х молярный избыток относительно числа Fab). Обеспечивали возможность протекания реакции в течение 30 мин при комнатной температуре и ее отслеживали с помощью RP-HPLC с обнаружением при 310 нм. Конъюгацию останавливали с помощью 50 mM Tris, pH 8,0. Конъюгированные Fab очищали посредством препаративной SEC в PBS.

**Таблица 2.** Иллюстративные конъюгаты, связывающие cKIT, или контрольные конъюгаты

№ конъюгата	Фрагмент антитела	Способ конъюгации	Последовательность HC фрагмента антитела	Последовательность LC фрагмента антитела	Полезная нагрузка	DAR
J1	Fab'1 к cKIT	Конъюгация по нативному цистеину*	SEQ ID NO: 14	SEQ ID NO: 25	Соединение (1)	4
J2	Fab'2 к cKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 40	SEQ ID NO: 49	Соединение (1)	4
J3	Fab'3 к cKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 58	SEQ ID NO: 25	Соединение (1)	4
J4	Fab'4 к cKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 73	SEQ ID NO: 84	Соединение (1)	4
J5	Fab'5 к cKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 99	SEQ ID NO: 110	Соединение (1)	4

J6	Fab ' Her2	к	Конъюгация по нативному цистеину	EVQLVESGGGLV QPGGSLRLSCAA SGFNICKDTYIHW VRQAPGKGLEWV ARIYPTNGYTRY ADSVKGRFTISA DTSKNTAYLQMN SLRAEDTAVYYC SRWGGDGFYAMD YWGQGLVTVSS ASTKGPSVFPLA PSSKSTSGGTAA LGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTS GVHTFPAVLQSS GLYSLSSVTVTP SSSLGTQTYICN VNHKPSNTKVDK KVEPKSCDKTHT CPPCPAPELLG (SEQ ID NO: 146)	DIQMTQSPSSL SASVGDRTIT CRASQDVNTAV AWYQQKPGKAP KLLIYSASFLY SGVPSRFSGSR SGTDFTLTISS LQPEDFATYYC QQHYTTPPTFG QGTKVEIKRTV AAPSVFIFPPS DEQLKSGTASV VCLLNNFYPRE AKVQWKVDNAL QSGNSQESVTE QDSKDYSTYLS STLTLSKADYE KHKVYACEVTH QGLSSPVTKSF NRGEC (SEQ ID NO: 147)	Соединение (1)	4
J7	Fab3 сKIT	к	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C и LC-E165C (EU)	SEQ ID NO: 130	SEQ ID NO: 134	Соединение (6)	1, 7
J8	Fab Her2	к	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C и LC-K107C (EU)	EVQLVESGGGLV QPGGSLRLSCAA SGFNICKDTYIHW VRQAPGKGLEWV ARIYPTNGYTRY ADSVKGRFTISA DTSKNTAYLQMN SLRAEDTAVYYC SRWGGDGFYAMD YWGQGLVTVSS ASTKGPSVFPLA PSSKSTSGGTAA LGCLVKDYFPCP	DIQMTQSPSSL SASVGDRTIT CRASQDVNTAV AWYQQKPGKAP KLLIYSASFLY SGVPSRFSGSR SGTDFTLTISS LQPEDFATYYC QQHYTTPPTFG QGTKVEICRTV AAPSVFIFPPS DEQLKSGTASV VCLLNNFYPRE	Соединение (6)	1, 8

			<p>VTVSWNSGALTS  GVHTFPAVLQSS  GLYSLSSVVTVP  SSSLGTQTYICN  VNHKPSNTKVDK  KVEPKSCDKHHH  HHH  (SEQ ID NO:  148)</p>	<p>AKVQWKVDNAL  QSGNSQESVTE  QDSKDSTYSLS  STLTLSKADYE  KHKVYACEVTH  QGLSSPVTKSF  NRGEC (SEQ  ID NO: 149)</p>		
J9	F(ab'4) <sub>2</sub> к cKIT	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C (EU)	<p>QVQLQQSGPGLV  KPSQTLSTCAI  SGDSVSTNSAAW  NWIRQSPSRGLE  WLGRIYYRSQWL  NDYAVSVKSRIT  INPDTSKNQFSL  QLNSVTPEDTAV  YYCARQLTYPYT  VYHKALDVWGQG  TLVTVSSastkg  psvfplapssks  tsggtaalglclv  kdyfpCpvtvsw  nsgaltsgvhtf  pavlgssglysl  ssvvtvpssslg  tqtyicnvnhkp  sntkvdkrvepk  scdkthtcppcp  apellg  (SEQ ID NO:  153)</p>	<p>SEQ ID NO:  84</p>	Соединение (4)	1,9
J10	F(ab'3) <sub>2</sub> к cKIT	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C (EU)	<p>QVQLVQSGAEVK  KPGSSVKVSCKA  SGGTFSSYAISW  VRQAPGQGLEWM  GTIGPFEGQPRY  AOKFQGRVTITA  DESTSTAYMELS  SLRSEDVAVYYC  ARGGYISDFDVW  GQGTLVTVSSas</p>	<p>SEQ ID NO:  25</p>	Соединение (5)	2

			tkgpsvfplaps skstsggtaalg clvkdyfpCpvt vswngaltsgv htfpavllqssgl yslssvvtvpss slgtqtyicnvn hkpsntkvdkrv epkscdkthtcp pcpapellg (SEQ ID NO: 154)			
J11	Fab3 к сKIT	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C (EU)	QVQLVQSGAEVK KPGSSVKVSCKA SGGTFSSYAISW VRQAPGQGLEWM GTIGPFEGQPRY AQKFQGRVTITA DESTSTAYMELS SLRSEDТАVYYC ARGGYISDFD VW GQGTLVTVSSAS TKGPSVFPLAPS SKSTSGGTAALG CLVKDYFPcPVT VSWNSGALTSGV HTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSS SLGTQTYICNVN HKPSNTKVDDKV EPKSCDKTH (SEQ ID NO: 155)	SEQ ID NO: 25	Соединение (4)	0,9
J12	F(ab') <sub>2</sub> к Her2	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C (EU)	EVQLVESGGGLV QPGGSLRLSCAA SGFNICKDTYIHW VRQAPGKGLEWV ARIYPTNGYTRY ADSVKGRFTISA DTSKNTAYLQMN SLRAEDТАVYYC SRWGDDGFYAMD	SEQ ID NO: 147	Соединение (4)	1,7

			YWQQTLLVTVSS ASTKGPSVFPFLA PSSKSTSGGTAA LGCLVKDYFPCP VTVSWNSGALTS GVHTFPAVLQSS GLYSLSSVVTVP SSSLGTQTYICN VNHKPSNTKVDK KVEPKSCDKTHT CPPCPAPELLG (SEQ ID NO: 156)				
J13	Fab Her2	к	По введенным путем конструирован ия цистеинам в положении HC-E152C (EU)	EVQLVESGGGLV QPGGSLRLSCAA SGFNIKDTYIHW VRQAPGKGLEWV ARIYPTNGYTRY ADSVKGRFTISA DTSKNTAYLQMN SLRAEDTAVYYC SRWGGDGFYAMD YWQQTLLVTVSS ASTKGPSVFPFLA PSSKSTSGGTAA LGCLVKDYFPCP VTVSWNSGALTS GVHTFPAVLQSS GLYSLSSVVTVP SSSLGTQTYICN VNHKPSNTKVDK KVEPKSCDK (SEQ ID NO: 157)	SEQ ID NO: 147	Соединение (7)	0,9
J14	Fab'1 сKIT	к	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 14	SEQ ID NO: 25	mc-MMAF	4
J15	Fab'1 сKIT	к	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 14	SEQ ID NO: 25	Соединение (5)	4
J16	Fab'1 сKIT	к	Конъюгация по нативному	SEQ ID NO: 14	SEQ ID NO: 25	Соединение (2)	4

		цистеину				
J17	Fab'2 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 40	SEQ ID NO: 49	mc-MMAF	4
J18	Fab'2 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 40	SEQ ID NO: 49	Соединение (5)	4
J19	Fab'2 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 40	SEQ ID NO: 49	Соединение (2)	4
J20	Fab'3 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 132	SEQ ID NO: 25	mc-MMAF	4
J21	Fab'3 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 58	SEQ ID NO: 25	Соединение (5)	4
J22	Fab'3 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 132	SEQ ID NO: 25	Соединение (2)	4
	Fab4 к сKIT	HC-E152C (EU)	QVQLQQSGPGLV KPSQTLSTCAI SGDSVSTNSAAW NWIRQSPSRGLE WLGRIYYRSQWL NDYAVSVKSRIT INPDTSKNQFSL QLNSVTPEDTAV YYCARQLTYPYT VYHKALDVWGQG TLVTVSSastkg psvfplapssks tsggtaalgclv kdyfpCpvtvsw nsgaltsgvhtf pavlgssglysl ssvvtvpssslg tqtyicnvnhkp sntkvdkrvepk scdk (SEQ ID NO: 158)	SEQ ID NO: 84	Отсутствует	
	Fab1 к сKIT	HC-E152C (EU)	QVQLVQSGAEVK KPGSSVKVSCKA	SEQ ID NO: 25	Отсутствует	

			<p>SGGTFSSYAISW  VRQAPGQGLEWM  GVIFPAEGAPGY  AQKFQGRVTITA  DESTSTAYMELS  SLRSEDТАVYYC  ARGGYISDFDVW  GQGLVTVSSas  tkgpsvfplaps  skstsggtaalg  clvkdyfpCpvt  vswngaltsgv  htfpavlgssgl  yslssvvtvpss  slgtqtyicnvn  hkpsntkvdkrv  epkscdk (SEQ  ID NO: 159)</p>			
	Fab2 cKIT	κ HC-E152C (EU)	<p>QVQLVQSGAEVK  KPGSSVKVSCKA  SGGTFSSHALSW  VRQAPGQGLEWM  GGIIPSFGTADY  AQKFQGRVTITA  DESTSTAYMELS  SLRSEDТАVYYC  ARGLYDFDYWGQ  GTLVTVSSastk  gpsvfplapssk  stsggtaalgcl  vkdyfpCpvtvs  wmsgaltsgvht  fpavlgssglys  lssvvtvpsssl  gtqtyicnvhk  psntkvdkrvep  kscdk (SEQ  ID NO: 160)</p>	SEQ ID NO: 49	Отсутствует	
	Fab3 cKIT	κ HC-E152C (EU)	<p>QVQLVQSGAEVK  KPGSSVKVSCKA  SGGTFSSYAISW  VRQAPGQGLEWM</p>	SEQ ID NO: 25	Отсутствует	

			GTIGPFEGQPRY AQKFQGRVTITA DESTSTAYMELS SLRSEDTAVYYC ARGGYISDFDVW GQGTLLVTVSSAS TKGPSVFPLAPS SKSTSGGTAALG CLVKDYFPCPVT VSWNSGALTSGV HTFPAVLQSSGL YSLSSVVTVPSS SLGTQTYICNVN HKPSNTKVDKVV EPKSCDK (SEQ ID NO: 161)			
	Fab к Her2	HC-E152C (EU)	SEQ ID NO: 157	SEQ ID NO: 147	Отсутствует	
	Fab'5 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 143	SEQ ID NO: 110	Соединение (1)	3,9
	Fab'5 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 143	SEQ ID NO: 110	Соединение (1)	3,7
	Fab'5 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 143	SEQ ID NO: 110	mc-MMAF	4
JW	Fab'2 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 126	SEQ ID NO: 49	Соединение (1)	3,9
JX	Fab'2 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 126	SEQ ID NO: 49	mc-MMAF	3,9
JY	Fab'3 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 132	SEQ ID NO: 25	Соединение (1)	3,9
JZ	Fab'3 к сKIT	Конъюгация по нативному цистеину	SEQ ID NO: 132	SEQ ID NO: 25	mc-MMAF	3,9
* Конъюгация по нативному Cys означает, что лекарственное средство присоединено к фрагменту антитела в положении одного или нескольких нативных цистеиновых остатков, выбранных из LC-214C и HC-220C-226C-229C (нумерация						

всех положений согласно EU).

Пример 2. Получение белков внеклеточного домена cKIT человека, яванского макака, мыши и крысы, а также субдоменов 1–3 и 4–5 cKIT для анализов связывания

Гены внеклеточных доменов (ECD) cKIT человека, мыши и крысы синтезировали на основании аминокислотных последовательностей из баз данных GenBank или Uniprot (см. таблицу 3 ниже). Ген на основе кДНК-шаблона для cKIT и 1 ECD яванского макака синтезировали на основании информации об аминокислотных последовательностях, полученной с применением мРНК из различных тканей яванского макака (например, полученных из Zyagen Laboratories; таблица 4 ниже). Все синтезированные фрагменты ДНК клонировали в подходящие векторы экспрессии, например, вектор на основе hEF1-HTLV (pFUSE-mIgG2A-Fc2) с С-концевыми метками для обеспечения возможности очистки.

**Таблица 3.** Последовательности конструкций на основе cKIT человека, мыши, крысы

Название	Описание	Номер доступа	SEQ ID NO:
D1-5 (внеклеточный домен) cKIT человека	<p>Вариант 2 транскрипта cKIT человека, остатки 26–520–МЕТКА</p> <p>QPSVSPGEPSPPSIHPGKSDLIVRVGDEIR LLCTDPGFVKWTFEILDET NENKQNEWITE KAEATNTGKYTCTNKHGLS NSIYVFVRDPA KLFLVDRSLYGKEDNDTLVRCPLTDPEVTN YSLKGCQ GKPLPKDLRFIPDPKAGIMIKSV KRAYHRLCLHCSVDQEGKSVLSEKFILKVR PAFKAVPVVSVKASYLLREGEEFTVTCTI KDVSSSVYSTWKRENSQTKLQEKYNSWHHG DFNYERQATLT ISSARVNDSGVFM CYANNT FGSANVTTTTLEVVDKGF INIFPМИНУТЫТТ V FVNDGENVDLIVEYEAFPKPEHQQWIYMN RTFTDKWEDYPKSENESNIRYVSELHLTRL KGTEGGTYTFLVSNSDVNA AIAFNVYVNTK PEILTYDRLVNGMLQCVAAGFP EPTIDWYF CPGTEQRCSASVLPVDVQTLNSSGPPFGKL VVQSSIDSSAFKHNGTVECKAYNDVGK TSA</p>	NM_001093772	112

	YFNFAFKEQIHPHTLFTPRSHHHHHH		
D1-3 cKIT человека	<p>Вариант 1 транскрипта cKIT человека остатки 26-311-МЕТКА</p> <p>QPSVSPGEPSPPSIHPGKSDLIVRVGDEIR LLCTDPGFVKWTFEILDETENKQNEWITE KAEATNTGKYTCTNKHGLSNSIYVFVR<b>DPA</b> <b>KL</b>FLVDRSLYGKEDNDTLVRCPLTDPEVTN YSLKGCQGKPLPKDLRFIPDPKAGIMIKSV KRAYHRLCLHCSVD<b>QEGKSVLSE</b>KFILKVR PAFKAVPVVSVSKASYLLREGEEFTVTCTI KDVSSSVYSTWKRENSQTKLQEKYNSWHHG DFNYERQATLTISSARVNDSGVFMCYANNT FGSANVTTTTLEVVDKGRSHHHHHH</p>	NM_000222	113
D4-5 cKIT человека	<p>Вариант 1 транскрипта cKIT человека, остатки 311-524-МЕТКА</p> <p>GFINIFPMИНУТЫТТVFVNDGENVDLIVEY EAFPKPEHQQWIYMNRTFTDKWEDYPKSEN ESNIRYVSELHLTRLKGTGGTYTFLVSNS DVNAAI AFNVYVNTKPEILTYDRLVNGMLQ CVAAGFPEPTIDWYFCPGTEQRCSASVLPV DVQTLNSSGPPFGKLVVQSSIDSSAFKHNG TVECKAYNDVGKTSAYFNFAFKGNNKEQIH PHTLFTPRSHHHHHH</p>	NM_000222	114
D1-5 cKIT МЫШИ	<p>Вариант 1 транскрипта cKIT МЫШИ, остатки 26-527-МЕТКА</p> <p>SQPSASPGEPSPPSIHPAQSELIVEAGDTL SLTCIDPDFVRWTFKTYFNEMVENKKNEWI QEKAEATRTGTYTCSNSNGLTSSIYVFVRD PAKLFLVGLPLFGKEDSDALVRCPLTDPQV SNYSLIECDGKSLPTDLTFVPNPKAGITIK NVKRAYHRLCVRCAAQRDGTWLHSDKFTLK VRAAIKAI PVVSVPETSHLLKKGDTFTVVC TIKDVSTSVNSMWLKMNPQPQHIAQVKHNS WHRGDFNYERQETLTISSARVDDSGVFMCY ANNTFGSANVTTTTLKVVEKGFINISPVKNT</p>	NM_001122733	115

	<p>TVFVTDGENVDLVVEYEAYPKPEHQQWIYM  NRTSANKGKDYVKSDNKSNI RYVNQLRLTR  LKGTEGGTYTFLVSNSDASASVT FNVYVNT  KPEILTYDRLINGMLQCVAEGFPEPTIDWY  FCTGAEQRCTTPVSPVDVQVQNVSVSPFGK  LVVQSSIDSSVFRHNGTVECKASNDVGKSS  AFFNF AFKEQIQAHTLFTPLEVLFQGPRSP  RGPTIKPCPPCKCPAPNLLGGPSVFI FPPK  IKDVLMI SLSPIVTCVVVDVSEDDPDVQIS  WVFVNNVEVHTAQ TQTHREDYNSTLRVVSAL  PIQH QDWMSGKEFKCKVNNKDL PAPIERTI  SKPKGSVRAPQVYVLPPEEEMTKKQVTLT  CMVTD FMPEDIYVEWTNNGKTELNYKNTEP  VLDS DGSYFMYSKLRVEKKNWVERN SYSCS  VVHEGLHNHHTTKSFSRTPGK</p>		
D1-5 крысы	<p>сКИТ крысы, остатки 25-526-  МЕТКА</p> <p>SQPSASPGEPSPPSIQPAQSELIVEAGDTI  RLTCTDPAFVKWTFEILDVRIENKQSEWIR  EKAEATH TGKYTCVSGSGLRSSIYVFVRDP  AVLFLVGLPLFGKEDNDALVRCPLTDPQVS  NYSLIECDGKSLPTDLKFVPNPKAGITIKN  VKRAYHRLCIRCAAQREGKWMRS DKFTLKV  RAAIKAI PVVSVPETSHLLKEGDTFTVICT  IKDVSTSVDSMWIKLNPQPQSKAQVKRNSW  HQGDFNYERQETLT ISSARVNDSGVFMCYA  NNTFGSANVT TTKVVEKGFINI FPKNTT  VFVTDGENVDLVVEFEAYPKPEHQQWIYMN  RTPTNRGEDYVKSDNQSNIRYVNELRLTRL  KGTEGGTYTFLVSNSDVSASVTFDVYVNTK  PEILTYDRLMNGRLQCVAAGFPEPTIDWYF  CTGAEQRCTVPVPPVDVQIQNASVSPFGKL  VVQSSIDSSVFRHNGTVECKASNAVGKSSA  FFNF AFKGN SKEQIQPHTLFTPRSLEVLFQ  GPGSPPLKECPPCAAPDLLGGPSVFI FPPK</p>	NM_022264	116

<p>IKDVLMIISLSPMVTCVVVDVSEDDPDVQIS  WfVNNVEVHTAQTQTHREDYNSTLRVVSAL  PIQHQDWMSGKEFKCKVNNRALPSPIEKTI  SKPRGPVVRAPQVYVLPPEEMTKKEFSLT  CMITGFLPAEIAVDWTSNGRTEQNYKNTAT  VLDSGYSYFMYSKLRVQKSTWERGSLFACS  VVHEGLHNHLTTKTISRSLGK</p>		
--	--	--

**Таблица 4.** Последовательности белка cKIT яванского макака

Конструкция	Аминокислотная последовательность в формате однобуквенного кода, сигнальный пептид подчеркнут cKIT яванского макака, остатки 25–520–МЕТКА	SEQ ID NO
D1–5 cKIT яванского макака	<p>MYRMQLLSCIALSLALVTNSQPSVSPGEPSPPSIHPAKSELI  VRVGNEIRLLCIDPGFVKWTFEILDENENKQNEWITEKAEA  TNTGKYTCTNKHGLSSSIYVFVRDPAKFLVDRSLYGKEDND  TLVRCPLTDPEVTSYSLKGCQGKPLPKDLRFVDPKAGITIK  SVKRAYHRLCLHCSADQEGKSVLSDKFILKVRPAFKAVPVVS  VSKASYLLREGEEFTVTCTIKDVSSSVYSTWKRENSQTKLQE  KYNSWHHGDFNYERQATLTISSARVNDSGVFMCIYANNTFGSA  NVTTLLEVVDKGFINI FPMИНУТЫТТTFVNDGENVDLIVEYE  AFPKEHQQWIYMNRTFTDKWEDYPKSENESNIRYVSELHLLT  RLKGTEGGTYTFLVSNSDVNASIAFNVYVNTKPEILTYDRLV  NGMLQCVAAGFPEPTIDWYFCPGTEQRCSASVLPVDVQTLNA  SGPPFGKLVVQSSIDSSAFKHNGTVECKAYNDVGKTSAYFNF  AFKGNKEQIHPHTLFTPRSHNNNNH</p>	117

*Экспрессия рекомбинантных белков ECD cKIT*

Требуемые рекомбинантные белки cKIT экспрессировали в линиях клеток, происходящих от клеток HEK293 (293FS), предварительно адаптированных для суспензионного культивирования и выращиваемых в бессывороточной среде FreeStyle-293 (Gibco, № по каталогу 12338018). Получение белка как в малом масштабе, так и в большом масштабе осуществляли посредством временной трансфекции и проводили в нескольких смесительных колбах (Nalgene), объемом не более 1 л каждая, с 293Fectin® (Life Technologies, № по каталогу 12347019) в качестве переносчика плазмид. Общую ДНК и 293Fectin применяли при отношении 1:1,5 (вес:объем). Отношение ДНК к культуре составляло 1 мг/л. Супернатанты культуры клеток собирали

через 3–4 дня после трансфекции, центрифугировали и стерилизовали фильтрацией до очистки.

#### *Очистка меченых белков ECD*

Рекомбинантные белки внеклеточного домена cKIT с Fc-меткой (например, ECD-Fc cKIT человека, cKIT человека (субдомены 1–3, 4–5 ECD)-Fc, cKIT яванского макака-mFc, cKIT крысы-mFc, cKIT мыши-mFc) очищали из супернатанта культуры клеток. Просветленный супернатант пропускали через колонку Sepharose® с белком А, которая была уравновешена с помощью PBS. После промывки до исходного уровня связанный материал элюировали с помощью буфера для элюирования Pierce Immunopure® с низким pH или 100 мМ глицина (pH 2,7) и сразу нейтрализовали с помощью 1/8 объема элюирования 1 М Tris, pH 9,0. Объединенный белок концентрировали при необходимости с применением 15-мл центрифужных концентраторов Amicon® Ultra с отсечением по номинальной молекулярной массе 10 кДа или 30 кДа. Затем пулы очищали с помощью SEC с применением колонки Superdex® 200 26/60 для удаления агрегатов. Затем характеристики очищенного белка определяли с помощью SDS-PAGE и SEC-MALLS (многоугловое лазерное светорассеяние). Концентрацию определяли по поглощению при 280 нм с применением теоретических коэффициентов поглощения, рассчитанных на основании последовательности с помощью Vector NTI.

#### *Пример 3. Связывание Fab к cKIT с субдоменами ECD cKIT*

Чтобы улучшить определение сайтов связывания Ab к cKIT, ECD cKIT человека разделяли на субдомены 1–3 (домен связывания лиганда) и субдомены 4–5 (домен димеризации). Чтобы определить, какие субдомены связывались, использовали анализ сэндвич-ELISA. 1 мкг/мл ECD, разбавленных в 1X забуференным фосфатом солевом растворе, соответствующих субдоменам 1–3, субдоменам 4–5 cKIT или полноразмерному ECD cKIT, покрывали 96-луночные планшеты Immulon® 4-NBX (Thermo Scientific, № по каталогу 3855, Рокфорд, Иллинойс) и инкубировали в течение ночи при 4°C. Планшеты промывали трижды с помощью буфера для промывки (1X забуференный фосфатом солевой раствор (PBS) с 0,01% Tween-20 (Bio-Rad 101-0781)). Планшеты блокировали с помощью 280 мкл/луночка 3% бычьего сывороточного альбумина, разбавленного в 1X PBS, в течение 2 часов при комнатной температуре. Планшеты промывали трижды с помощью буфера для промывки. Антитела готовили из расчета 2 мкг/мл в буфере для промывки с 5-кратными разбавлениями для получения 8 точек и добавляли в планшеты для ELISA из расчета 100 мкл/луночка в трех

повторностях. Планшеты инкубировали на орбитальном шейкере со встряхиванием при 200 об/мин в течение 1 часа при комнатной температуре. Планшеты для анализа промывали трижды с помощью буфера для промывки. Вторичное антитело, фрагмент козьего антитела  $F(ab')_2$  к человеческому IgG (H+L) (Jackson ImmunoResearch, № по каталогу 109-036-088, Вест-Грув, Пенсильвания), готовили при отношении 1:10000 в буфере для промывки и добавляли в планшеты для ELISA из расчета 100 мкл/лунка. Планшеты инкубировали с вторичным антителом в течение 1 часа при комнатной температуре со встряхиванием при 200 об/мин на орбитальном шейкере. Планшеты для анализа промывали трижды с помощью буфера для промывки. Для проявления сигнала ELISA в планшеты добавляли по 100 мкл/лунка TMB-субстрата Sure blue® (KPL, № по каталогу 52-00-03, Гейтерсбург, Мэриленд) и обеспечивали возможность инкубации в течение 10 минут при комнатной температуре. Для остановки реакции в каждую лунку добавляли по 50 мкл 1 н. хлористоводородной кислоты. Поглощение измеряли при 450 нм с применением планшет-ридера SpectraMax® M5 от Molecular Devices. Чтобы определить ответ на связывание для каждого антитела, показатели оптической плотности усредняли, получали стандартное отклонение значений и наносили на график с применением Excel. Характеристики связывания с cKIT для индивидуальных антител к cKIT можно найти в таблице 5.

Пример 4. Показатели аффинности антител к cKIT

Аффинность антител в отношении ортологов cKIT разных видов, а также в отношении cKIT человека определяли с применением технологии SPR с применением устройства Biacore® 2000 (GE Healthcare, Питтсбург, Пенсильвания) и сенсорных чипов CM5.

Вкратце, в качестве подвижного буфера для всех экспериментов применяли HBS-P (0,01 М HEPES, pH 7,4, 0,15 М NaCl, 0,005% Surfactant P20), дополненный 2% блокирующего буфера Odyssey® (Licor Biosciences, Линкольн, Невада). Уровень иммобилизации и взаимодействий аналитов измеряли по единицам ответа (RU). Пилотные эксперименты осуществляли для тестирования и подтверждения применимости иммобилизации антитела к человеческой Fc-области (номер по каталогу BR100839, GE Healthcare, Питтсбург, Пенсильвания) и захвата тестируемых антител.

Для измерения кинетических показателей осуществляли эксперименты, в которых антитела захватывали на поверхности сенсорного чипа посредством иммобилизованного антитела к человеческой Fc-области, и определяли способность связывания

белков cKIT в свободном растворе. Вкратце, 25 мкг/мл антитела к человеческой Fc-области, pH 5, иммобилизовали на сенсорном чипе CM5 за счет иммобилизации по аминной группе, при расходе, составляющем 5 мкл/мин, в обеих проточных ячейках до достижения 10500 RU. Затем инъецировали 0,1–1 мкг/мл тестируемых антител при расходе 10 мкл/мин в течение 1 минуты. Уровни захваченных антител обычно поддерживали ниже 200 RU. Впоследствии внеклеточные домены (ECD) рецептора cKIT разбавляли в виде серии 2-кратных разведений с концентрацией 3,125–50 нМ и инъецировали при расходе, составляющем 40 мкл/мин, в течение 3 мин через обе эталонную и тестируемую проточные ячейки. Протестированные ECD перечислены в таблице ниже (таблица 5). Диссоциацию связывания ECD отслеживали в течение 10 мин. После каждого цикла впрыскиваний поверхность чипа регенерировали с помощью 3 М MgCl<sub>2</sub> при расходе 10 мкл/мин в течение 30 секунд. Все эксперименты осуществляли при 25°C и данные ответа глобально аппроксимировали с простой моделью взаимодействия 1:1 (с применением программного обеспечения Scrubber 2®, версия 2.0b (BioLogic Software), для получения оценок константы ассоциации (k<sub>a</sub>), константы диссоциации (k<sub>d</sub>) и аффинности (K<sub>D</sub>). В таблице 6 перечислены связывание доменов и аффинность для выбранных антител к cKIT.

**Таблица 5.** Изотип и источник ECD cKIT

Изотип ECD	Метка	Источник
Человек	C-концевая 6x His (SEQ ID NO: 162)	Конструкция Novartis
Яванский макак	C-концевая 6x His (SEQ ID NO: 162)	Конструкция Novartis
Мышь	C-концевая 6x His (SEQ ID NO: 162)	Sino Biological Inc (номер по каталогу 50530-M08H)
Крыса	C-концевая mFc	Конструкция Novartis

**Таблица 6.** Аффинность и перекрестная реактивность антител

Ab	Связывание домена cKIT	KD (пМ) с ECD cKIT человека в SET	KD (пМ) с ECD cKIT яванского макака в SET	Реактивность в отношении cKIT мыши	Реактивность в отношении cKIT крысы
Ab1 к cKIT	D1-3	94	170	Не реагирует	Не реагирует

Ab2 к cKIT	D1-3	7	10	Не реагирует	Не реагирует
Ab3 к cKIT	D1-3	160	52	Не реагирует	Не реагирует
Ab4 к cKIT	D4-5	2400	140	Да	Да
Ab5 к cKIT	D1-3	110	180	Да	Да

Пример 5. *In vitro* анализы цитолиза человеческих и мышинных клеток под действием ADC, связывающих cKIT

***In vitro* анализы жизнеспособности HSC**

Человеческие мобилизованные гемопоэтические стволовые клетки (HSC) периферической крови получали из NemaCare (номер по каталогу M001F-GCSF-3). Каждый флакон, содержащий ~1 миллион клеток, оттаивали и разбавляли в 10 мл 1X HBSS и центрифугировали в течение 7 минут при 1200 об/мин. Клеточный осадок ресуспендировали в 18 мл ростовой среды, содержащей три фактора роста (StemSpan SFEM (StemCell Technologies, номер по каталогу 09650) с 50 нг/мл каждого из TPO (R&D Systems, номер по каталогу 288-TP) лиганда Flt3 (Life Technologies, номер по каталогу PNC9413) и IL-6 (Life Technologies, номер по каталогу PNC0063), дополненная аминокислотами (Gibco, номер по каталогу 10378-016)).

Клетки костного мозга от мышей C57BL/6J собирали из бедренных и большеберцовых костей, ресуспендировали в IMDM (HyClone, номер по каталогу SH30228.01) и объединяли. Клетки центрифугировали в течение 10 минут при 300 g. Клеточный осадок ресуспендировали в буфере AutoMACS (1X PBS+0,5% BSA+2 mM EDTA) при концентрации 100 миллионов клеток в 40 мкл. Смесь антител для истощения по линии дифференцировки (Miltenyi, номер по каталогу 130-090-858) добавляли при концентрации 10 мкл на 100 миллионов клеток. Клетки инкубировали в течение 10 минут в холодной комнате перед добавлением 30 мкл буфера AutoMACS и 20 мкл биотинилированных магнитных гранул на 100 миллионов клеток. Данную новую суспензию инкубировали в холодной комнате в течение 15 минут. Клетки центрифугировали в течение 10 минут при 300 g. Осадок ресуспендировали в 2 мл буфера AutoMACS и пропускали через фильтр для клеток. Клетки отбирали на AutoMACS с применением протокола "истощения". Отрицательную фракцию из сортера центрифугировали в течение 10 минут при 300 g и ресуспендировали в 1 мл HBSS. Ресуспендированные клетки окрашивали с помощью антитела к CD45-

PerCP-Cy5.5 (Becton Dickinson, номер по каталогу 550994), антитела к CD48-FITC (eBioscience, номер по каталогу 11-0481-82), антитела к CD150-PE (BioLegend, номер по каталогу 115904) и антитела к Sca-1 (Becton Dickinson, номер по каталогу 560653). Клетки инкубировали при комнатной температуре в течение 30 минут, центрифугировали в течение 5 минут при 300 g и ресуспендировали в 700 мкл буфера FACS для сортировки. Sca-1+ клетки были положительными при сортировке на FACS Aria. После сортировки клетки помещали в ростовые среды, содержащие три фактора роста (StemSpan SFEM с 50 нг/мл TPO (R&D Systems, номер по каталогу 288-TP), лиганда Flt3 (Life Technologies, номер по каталогу PHC9413) и IL-6 (Life Technologies, номер по каталогу PHC0063), дополненная аминокислотами (Gibco, номер по каталогу 10378-016)).

Тестируемые средства разбавляли в двух повторностях в 384-луночном черном планшете для анализа при конечном объеме, составляющем 5 мкл, начиная с 10 мкг/мл и последовательно разводя 1:3. Клетки, полученные выше, добавляли в каждую лунку при конечном объеме, составляющем 45 мкл. Клетки инкубировали при 37°C и 5% кислорода в течение 7 дней. В конце культивирования клетки собирали для окрашивания путем центрифугирования планшета для анализа в течение 4 минут при 1200 об/мин. Затем супернатанты аспирировали, а клетки промывали и переносили в другой 384-луночный планшет (Greiner Bio-One, обработанный для ТС, с черными прозрачными лунками с плоским дном, номер по каталогу 781092).

В случае анализов с человеческими клетками каждую лунку окрашивали с помощью антитела к CD34-PerCP (Becton Dickinson, номер по каталогу 340666) и антитела к CD90-APC (Becton Dickinson, номер по каталогу 559869), промывали и ресуспендировали в буфере FACS до конечного объема, составляющего 50 мкл. В случае анализов с мышиными клетками каждую лунку окрашивали с помощью антитела к CD45-PerCP-Cy5.5 (Becton Dickinson, номер по каталогу 550994), антитела к CD48-FITC (eBioscience, номер по каталогу 11-0481-82), антитела к CD150-PE (BioLegend, номер по каталогу 115904), антитела к cKIT-APC (Becton Dickinson, номер по каталогу 553356) и антитела к Sca-1 (Becton Dickinson, номер по каталогу 560653), промывали и ресуспендировали в буфере FACS до конечного объема, составляющего 50 мкл. Затем клетки анализировали на проточном цитометре Becton Dickinson Fortessa и проводили количественную оценку анализа.

Конъюгаты токсина с антителами и фрагментами антител,

распознающими сКІТ, приводили к цитолизу НСC, как определено в данном анализе. Количественная оценка клеток с помощью FACS показала меньшее число жизнеспособных клеток в лунках, обработанных с помощью конъюгатов токсина, связывающих сКІТ, чем в контрольных лунках, обработанных с помощью PBS или конъюгатов токсина с антителами и фрагментами антител изотипического контроля. Данные показаны на ФИГ. 1, ФИГ. 2 и ФИГ. 9 и обобщены в таблице 7. Используемое в данном документе условное название JN<sup>o</sup> соответствует специфическому № конъюгата, описанному в таблице 2.

Таблица 7. Жизнеспособность клеток после обработки конъюгатами Fab к сКІТ и токсина

Протестированный конъюгат	Популяция клеток	EC50 (нГ/мл)
J3	Человеческие общие ядерные клетки	45
	Человеческие CD34+ клетки	8
	Человеческие CD90+ клетки	12
J2	Человеческие общие ядерные клетки	58
	Человеческие CD34+ клетки	11
	Человеческие CD90+ клетки	16
J1	Человеческие общие ядерные клетки	48
	Человеческие CD34+ клетки	11
	Человеческие CD90+ клетки	13
J4	Мышиные общие ядерные клетки	3800
	Мышиные CD45+ клетки	3800
	Мышиные сКІТ+ клетки	8
J5	Мышиные общие ядерные клетки	210
	Мышиные CD45+ клетки	210
	Мышиные сКІТ+ клетки	120
J14	Человеческие общие ядерные клетки	7
	Человеческие CD34+ клетки	10
	Человеческие CD90+ клетки	11
J15	Человеческие общие ядерные клетки	6
	Человеческие CD34+ клетки	5
	Человеческие CD90+ клетки	1
J16	Человеческие общие ядерные клетки	6
	Человеческие CD34+ клетки	7

	Человеческие CD90+ клетки	9
J17	Человеческие общие ядерные клетки	12
	Человеческие CD34+ клетки	16
	Человеческие CD90+ клетки	37
J18	Человеческие общие ядерные клетки	15
	Человеческие CD34+ клетки	11
	Человеческие CD90+ клетки	3
J19	Человеческие общие ядерные клетки	14
	Человеческие CD34+ клетки	16
	Человеческие CD90+ клетки	23
J20	Человеческие общие ядерные клетки	20
	Человеческие CD34+ клетки	25
	Человеческие CD90+ клетки	72
J21	Человеческие общие ядерные клетки	154
	Человеческие CD34+ клетки	88
	Человеческие CD90+ клетки	22
J22	Человеческие общие ядерные клетки	8
	Человеческие CD34+ клетки	10
	Человеческие CD90+ клетки	17

Пример 6. In vitro анализ дегрануляции человеческих мастоцитов

Зрелые мастоциты получали с применением CD34+ предшественников из мобилизированной периферической крови. CD34+ клетки культивировали в StemSpan SFEM (StemCell Technologies), дополненной рекомбинантным человеческим фактором роста стволовых клеток (rhSCF, 50 нг/мл, Gibco), рекомбинантным человеческим интерлейкином 6 (rhIL-6, 50 нг/мл, Gibco), рекомбинантным человеческим IL-3 (30 нг/мл, Peprotech), GlutaMAX (2 нМ, Gibco), пенициллином (100 Ед/мл, Hyclone) и стрептомицином (100 мкг/мл, Hyclone). Рекомбинантный hIL-3 добавляли только во время первой недели культивирования. После третьей недели половину среды заменяли еженедельно свежей средой, содержащей rhIL-6 (50 нг/мл) и rhSCF (50 нг/мл). Чистоту зрелых мастоцитов оценивали по окрашиванию на поверхности клеток высокоаффинного рецептора IgE (FcεRI, eBioscience) и CD117 (BD). Применяли клетки на 8–12 неделе культивирования.

Полученные мастоциты промывали один раз для удаления SCF и

требуемое количество клеток инкубировали в течение ночи в среде для мастоцитов, содержащей rhIL-6 (50 нг/мл) с rhSCF (50 нг/мл) или без него. В качестве положительного контроля дегрануляции мастоцитов порцию клеток сенсibilизировали с помощью человеческого IgE миеломы (100 нг/мл, EMD Millipore). На следующий день готовили разбавления антитела или фрагментов антител к cKIT или их конъюгатов с токсином, мышиноного моноклонального антитела к человеческому IgG1 (Fab-специфическое, Sigma), козьего антитела к человеческому IgE (Abcam) и соединения 48/80 (Sigma) в буфере HEPES для дегрануляции (10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 0,4 mM двухосновного фосфата натрия, 5,6 mM глюкозы, pH доведен до 7,4, и смешанный с 1,8 mM хлорида кальция и 1,3 mM сульфата магния), дополненном 0,04% бычьего сывороточного альбумина (BSA, Sigma). Тестируемые средства и антитела к IgG1 смешивали вместе в 384-луночном планшете для анализа с лунками с V-образным дном, при этом антитела к IgE и соединение 48/80 тестировали отдельно. Планшет для анализа инкубировали 30 мин при 37°C. Во время инкубации клетки промывали 3 раза с помощью буфера HEPES для дегрануляции+0,04% BSA для удаления среды и несвязанного IgE. Клетки ресуспендировали в буфере HEPES для дегрануляции+0,04% BSA и высевали из расчета 3000 клеток на лунку в планшет для анализа при конечном объеме реакционной смеси, составляющем 50 мкл. Клетки, которые сенсibilизировали с помощью IgE, применяли только с антителом к IgE в качестве положительного контроля дегрануляции. Чтобы произошла дегрануляция, планшет для анализа инкубировали 30 мин при 37°C. Во время данной инкубации буфер p-нитро-N-ацетил-β-D-глюкозамина (pNAG, Sigma) готовили путем обработки ультразвуком 3,5 мг/мл pNAG в цитратном буфере (40 mM лимонной кислоты, 20 mM двухосновного фосфата натрия, pH 4,5). Высвобождение β-гексозаминидазы измеряли путем смешивания 20 мл супернатанта клеток с 40 мкл раствора pNAG в 384-луночном планшете с лунками с плоским дном. Данный планшет инкубировали в течение 1,5 часа при 37°C и реакцию останавливали добавлением 40 мкл стоп-раствора (400 mM глицин, pH 10,7). Поглощение считывали с применением планшет-ридера при λ=405 нм с эталонным фильтром при λ=620 нм.

Контроли в виде полноразмерных IgG, применяемые в анализах дегрануляции мастоцитов, описаны в таблице 8.

Таблица 8. Контроли в виде полноразмерных IgG, применяемые в анализах дегрануляции мастоцитов

	Название	Последовательность HC	Последовате
--	----------	-----------------------	-------------

			<b>ЛЬНОСТЬ LC</b>
Контрольный IgG для J1	Ab1 к сKIT	SEQ ID NO: 12	SEQ ID NO: 25
Контрольный IgG для J2	Ab2 к сKIT	SEQ ID NO: 38	SEQ ID NO: 49
Контрольный IgG для J3	Ab3 к сKIT	SEQ ID NO: 56	SEQ ID NO: 25
Контрольный IgG для J4	Ab4 к сKIT	SEQ ID NO: 71	SEQ ID NO: 84
Контрольный IgG для J6	Антитело к Her2	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFN IKDTYIHWVRQAPGKGLEWVARIYPTNG YTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMN SLRAEDTAVYYCSRWGGDGFYAMDYWGQ GTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSG GTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTS GVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSL GTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCD KTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKD TLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSV LTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIE KTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKN QVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPEN NYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSP GK (SEQ ID NO: 150)	SEQ ID NO: 147

Как показано на ФИГ. 3А, некоторые клоны класса антагонистических антител к сKIT с меньшей вероятностью вызывают дегрануляцию мастоцитов. Можно дополнительно предположить, что фрагмент Fab или Fab' не может вызывать дегрануляцию мастоцитов. После шивания с Fab-специфическим антителом (ФИГ. 3С-3J) полноразмерный IgG, в отличие от формата Fab' к сKIT-токсин DAR4, демонстрирует усиление дегрануляции. Это позволяет предположить, что фрагмент Fab' не вызывает дегрануляцию мастоцитов, даже будучи шитым и мультимеризованным в более крупные комплексы, которые

можно было бы наблюдать в случае, когда у пациента выработались или имелись предсуществующие антитела к лекарственному средству, распознающие фрагменты Fab или Fab'.

Пример 7. *In vivo* разрушение человеческих HSC из хозяина-мыши

Чтобы оценить эффективность тестируемых средств в отношении человеческих HSC *in vivo*, мышам, имеющим тяжелую иммунную недостаточность (NOD.Cg-Prkdc<sup>scid</sup> IL2rg<sup>tm1Wjl</sup>/SzJ, Jackson Laboratory, номер артикула 005557, также известные как NSG), трансплантировали человеческие HSC после проведения сублетального облучения (250 рад в виде гамма-облучения <sup>137</sup>Cs). CD34+ гемопоэтические стволовые клетки (HSC) получали от AllCells (номер по каталогу CB008F-S). Каждый флакон, содержащий ~1 миллион клеток, оттаивали, разбавляли в 10 мл 1X HBSS и центрифугировали в течение 7 минут при 1200 об/мин. Клеточный осадок ресуспендировали в HBSS из расчета 100000 клеток/мл. Через 24 часа после облучения всего 20000 клеток на мышь трансплантировали путем инъекции в ретро-орбитальный синус. Человеческим HSC обеспечивали возможность приживания у мышей NSG в течение по меньшей мере 4 недель. Процент химеризма человеческих клеток определяли с помощью проточной цитометрии образцов крови. Для этого кровь окрашивали с помощью следующих антител: антитела к CD45 человека-e450 (eBioscience, № по каталогу 48-0459-42), антитела к CD45 мыши-APC (Becton Dickinson, № по каталогу 559864), антитела к CD33 человека-Per (Becton Dickinson, № по каталогу 347787), антитела к CD19 человека-FITC (Becton Dickinson, № по каталогу 555422) и антитела к CD3 человека-PerCy7 (Becton Dickinson, № по каталогу 557851). Как только химеризм человеческих клеток был подтвержден, гуманизированным мышам NSG вводили дозу тестируемого средства внутрибрюшинно, b.i.d. Степень химеризма человеческих клеток повторно оценивали после введения дозы. Чтобы оценить присутствие или отсутствие человеческих HSC, мышей умерщвляли и костный мозг выделяли и окрашивали с помощью следующих антител: антитела к CD45 человека-e450 (eBioscience, № по каталогу 48-0459-42), антитела к CD45 мыши-APC (Becton Dickinson, № по каталогу 559864), антитела к CD34 человека-PE (Becton Dickinson, № по каталогу 348057), антитела к CD38 человека-FITC (Becton Dickinson, № по каталогу 340926), антитела к CD11b человека-PE (Becton Dickinson, № по каталогу 555388), антитела к CD33 человека-PerCy7 (Becton Dickinson, № по каталогу 333946), антитела к CD19 человека-FITC (Becton Dickinson, № по каталогу 555412) и антитела к CD3 человека-

РeCy7 (Becton Dickinson, № по каталогу 557851). Популяции клеток оценивали посредством проточной цитометрии и анализировали с помощью FlowJo.

В одном конкретном эксперименте мышам вводили дозу 10 мг/кг конъюгата J7 (описанного в таблице 2) дважды в день в течение 1, 2 или 4 дней или конъюгата антитела изотипического контроля J8 дважды в день в течение 4 дней. Мышей умерщвляли в день 21 и их костный мозг анализировали. Как показано на ФИГ. 4, у мышей, обработанных с помощью конъюгата J7 в течение даже 1 дня, показано разрушение человеческих HSC (человеческие CD45+ клетки, человеческие CD34+ клетки, человеческие CD38- клетки), при этом у мышей, обработанных с помощью конъюгата с антителом изотипического контроля, J8, показан неоднородный химеризм, по-видимому, обусловленный неоднородностью при проведении гуманизации перед обработкой, на основании сравнения с группой, обработанной средой-носителем (PBS).

В одном конкретном эксперименте мышам вводили дозу 10 мг/кг конъюгата, связывающего сКIT, J1, J2 или J3, или конъюгата антитела изотипического контроля J6 в течение 2 дней. Мышей умерщвляли в день 21 и их костный мозг анализировали. Как показано на ФИГ. 5, у мышей, обработанных с помощью конъюгата, связывающего сКIT, J1, J2, или J3, показано снижение числа человеческих HSC (человеческие CD45+ клетки, человеческие CD34+ клетки, человеческие CD38- клетки), при этом у мышей, обработанных с помощью конъюгата антитела изотипического контроля, J6, показан неоднородный химеризм.

В одном конкретном эксперименте мышам вводили дозу 10 мг/кг конъюгата, связывающего сКIT, JW, JX, JY или JZ, в течение 2 дней. Мышей умерщвляли в день 21 и их костный мозг анализировали. Как показано на ФИГ. 13, у мышей, обработанных с помощью конъюгата, связывающего сКIT, JW, JX, JY или JZ, показано снижение числа человеческих HSC (человеческие CD45+ клетки, человеческие CD34+ клетки, человеческие CD38- клетки).

Вместе взятые, данные три эксперимента показывают, что конъюгаты Fab к сКIT и токсина или Fab' к сКIT и токсина могли разрушать HSC из костного мозга. Как конъюгаты Fab к сКIT и аманитина (например, J7), так и конъюгаты Fab' к сКIT и ауристатина (например, J1, J2, J3, JW, JX, JY) могли разрушать человеческие HSC *in vivo*.

Пример 8. *In vivo* разрушение мышинных HSC у иммунокомпетентных

мышей

Чтобы оценить эффективность тестируемых средств в отношении мышинных HSC *in vivo*, мышам C57BL/6J (самцы, возраст 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 000664) вводили дозу тестируемого средства внутривбрюшинно, b.i.d. Гематологический профиль определяли не ранее чем через один день после введения последней дозы или не позднее чем через 21 день после введения последней дозы с помощью стандартных способов. Чтобы оценить присутствие или отсутствие мышинных HSC, мышей умерщвляли и костный мозг выделяли и окрашивали с помощью следующих антител: антитела к CD45 мыши-PerCP-Cy5.5 (Becton Dickinson, № по каталогу 550994), антитела к cKIT мыши-APC (Becton Dickinson, № по каталогу 553356), антитела к CD48 мыши-FITC (eBioscience, № по каталогу 11-0481-82), антитела к CD150 мыши-PE (BioLegend, № по каталогу 115904), антитела к Sca мыши-V450 (Becton Dickinson, № по каталогу 560653), антитела к Lin мыши-биотин (Miltenyi, № по каталогу 120-001-547) и Pe-Cy7-стрептавидина (Becton Dickinson, № по каталогу 557598). Популяции клеток оценивали посредством проточной цитометрии и анализировали с помощью FlowJo.

В одном конкретном эксперименте мышам дважды в день вводили дозу 10 мг/кг конъюгата, связывающего cKIT, J4 или J5 (описан в таблице 2), или PBS в течение 4 дней. Мышей умерщвляли в день 13 для проведения анализа костного мозга. У групп, обработанных с помощью конъюгата, связывающего cKIT, J4 или J5, показано значительное снижение уровней стволовых клеток и клеток-предшественников (cKIT+) в костном мозге по сравнению с контрольной группой, обработанной с помощью PBS (ФИГ. 6), это показывает, что обработка с помощью конъюгатов Fab' к cKIT и ауристатины, таких как J4 или J5, могла разрушать HSC *in vivo* у нормальных мышей.

Чтобы определить, является ли разрушение под действием конъюгатов антител или фрагментов антител к cKIT по настоящему изобретению достаточным для обеспечения трансплантации, мышам, обработанным, как описано выше, впоследствии можно проводить трансплантацию HSC. Например, мышам CD45.2, обработанным с помощью конъюгата Fab' к cKIT и токсина, можно трансплантировать донорские HSC, которые могут быть взяты от мышей CD45.1, через примерно одну неделю после введения дозы. В другом примере мышей, обработанных с помощью конъюгата Fab' к cKIT и токсина, можно обрабатывать с помощью иммуносупрессорного средства, такого как средство,

вызывающее истощение Т-клеток, через примерно одну неделю после введения дозы и за примерно 1-2 дня до проведения трансплантации донорских HSC, которые получены от мышей CD45.1. Одним способом истощения Т-клеток является введение мышам антитела к  $\beta$ -цепи TCR мыши (клон H57-597; Biolegend) с дозой 0,5 мг на мышью, q.i.d., в течение двух дней. Истощение Т-клеток можно подтвердить путем отбора образца крови для определения гематологического профиля после введения дозы. В таких примерах прогресс трансплантации будут отслеживать путем отыскания химеризма CD45.1 клеток в образцах крови. В таких примерах успех трансплантации можно определять путем умерщвления мышей через примерно 3-4 месяца или 5-6 месяцев после трансплантации для проведения анализа костного мозга с отысканием популяции CD45.1 и CD45.2 HSC. В качестве альтернативы успешную трансплантацию можно определить путем умерщвления мышей через по меньшей мере 4 или 6 месяцев после первичной трансплантации, а также за счет осуществления вторичной трансплантации полностью облученным мышам-хозяевам и отыскания химеризма CD45.1 в образцах крови после вторичной трансплантации.

Пример 9. *In vitro* анализ дегрануляции человеческих мастоцитов под действием полноразмерного антитела к sKIT, его фрагментов F(ab')<sub>2</sub> и Fab и его конъюгатов

Зрелые мастоциты получали и тестировали с применением антитела к sKIT и его фрагментов F(ab')<sub>2</sub> и Fab или конъюгатов с токсином, как описано в примере 6.

Как показано на ФИГ. 7A-7C, полноразмерное Ab4 (HC-E152C-S375C) к sKIT и фрагмент F(ab')<sub>4</sub> (HC-E152C), конъюгированный с соединением (4), будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab4 (HC-E152C) при всех протестированных концентрациях. На ФИГ. 7D-7F показано, что полноразмерное Ab3 (HC-E152C-S375C) к sKIT и фрагмент F(ab')<sub>3</sub> (HC-E152C), конъюгированный с соединением (3), будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab3 (E152C), конъюгированного с соединением (4), при всех протестированных концентрациях. Это позволяет предположить, что фрагмент Fab или его конъюгаты не вызывают дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, как можно было бы наблюдать в случае, когда у пациента выработались или имелись предсуществующие антитела к лекарственному средству, распознающие фрагменты Fab. С другой

стороны, фрагменты  $F(ab')_2$  и конъюгаты действительно вызывают дегрануляцию мастоцитов на уровне, аналогичном полноразмерному антителу к сКІТ, будучи связанными и мультимеризованными в более крупные комплексы.

Пример 10. In vitro анализ дегрануляции человеческих мастоцитов под действием полноразмерного антитела к сКІТ и его фрагментов  $F(ab')_2$  и Fab

Зрелые мастоциты получали и тестировали с применением антитела к сКІТ и его фрагментов  $F(ab')_2$  и Fab к сКІТ, как описано в примере 6.

Как показано на ФИГ. 8А–8С, полноразмерное  $Ab_4$  к сКІТ и фрагмент  $F(ab'4)_2$ , будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab4 (НС–Е152С) при всех протестированных концентрациях. На ФИГ. 8D–8F показано, что полноразмерное  $Ab_1$  к сКІТ и фрагмент  $F(ab'1)_2$ , будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab1 (НС–Е152С) при всех протестированных концентрациях. На ФИГ. 8G–8I показано, что полноразмерное  $Ab_2$  к сКІТ и фрагмент  $F(ab'2)_2$ , будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab2 (НС–Е152С) при всех протестированных концентрациях. На ФИГ. 8J–8L показано, что полноразмерное  $Ab_3$  к сКІТ и фрагмент  $F(ab'3)_2$ , будучи сшитыми, вызывали дегрануляцию мастоцитов, при этом дегрануляция мастоцитов не запускалась под действием фрагмента Fab3 (НС–Е152С) при всех протестированных концентрациях. Это позволяет предположить, что фрагменты Fab не вызывают дегрануляцию мастоцитов, даже будучи сшитыми и/или мультимеризованными в более крупные комплексы, как можно было бы наблюдать в случае, когда у пациента выработались или имелись предсуществующие антитела к лекарственному средству, распознающие фрагменты Fab. С другой стороны, фрагменты  $F(ab')_2$  действительно вызывают дегрануляцию мастоцитов на уровне, аналогичном полноразмерному антителу к сКІТ, будучи связанными и мультимеризованными в более крупные комплексы.

**Пример 11. Трансплантация сингенного костного мозга иммунокомпетентным мышам**

В конкретном эксперименте мышам C57BL/6J (CD45.2, самцы, возраст 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 000664) вводили дозу 2,5, 5 или 10 мг/мл Fab'5-(1) к с-КІТ (Fab'-DAR4) с помощью

мини-насоса (Alzet, № по каталогу 2001), размещенного подкожно в области спины. В мини-насосе удерживался объем 200 мкл, и он выполнял инфузию с постоянным расходом, составляющим 1 мкл/час, в течение курса продолжительностью 7 дней. Через семь дней после имплантации мини-насос затем удаляли, чтобы прекратить любое дополнительное введение лекарственного средства. Через сорок восемь часов после удаления мини-насоса мышам трансплантировали костный мозг от мышей-доноров, которые были конгенными по маркерам CD45 (CD45.1, B6.SJL-Ptprc<sup>a</sup> Percp<sup>b</sup>/BoyJ, самцы, возраст 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 002014). Прогресс трансплантации отслеживали в периферической крови путем отыскания химеризма CD45.1 клеток с интервалами в один месяц. В данном эксперименте химеризм крови отслеживали в течение 4 месяцев, как показано на ФИГ. 10. Химеризм в периферической крови оценивали с помощью проточной цитометрии. Образцы крови окрашивали с помощью антитела к mCD45.1-PerCP-Cy5.5 (1:100, BD № 560580), антитела к mCD45.2-BUV395 (1:100, BD № 564616), антитела к Mac-PE (1:500, BD № 553331), антитела к GR1-FITC (1:100, BD № 553127), антитела к B220-APC (1:400, BD № 553092) и антитела к CD3-V450 (1:100, BD № 560801), данные получали на проточном цитометре Fortessa (Becton Dickinson) и анализировали с помощью программного обеспечения FlowJo (TreeStar). Уровень химеризма определяли путем сравнения с популяциями, которые были положительными или по CD45.2 (хозяин), или по CD45.1 (донор). Общий уровень донорского химеризма представлен для общей популяции белых кровяных клеток. Кроме того, субпопуляции Т-клеток, В-клеток и миелоидных клеток дополнительно оценивали в отношении донорского химеризма. Донорский химеризм Т-клеток был основан на отыскании CD45.2 (хозяин) или CD45.1 (донор) на CD3+ клетках. Донорский химеризм В-клеток был основан на отыскании CD45.2 (хозяин) или CD45.1 (донор) на CD45R+ клетках. Химеризм миелоидных клеток был основан на отыскании CD45.2 (хозяин) или CD45.2 (донор) на Mac-1+/Gr-1+ клетках. Данный эксперимент показывает, что у мышей, кондиционированных с помощью конъюгата Fab' к cKIT, могут приживаться донорские клетки, которые воссоздают линии миелоидных клеток, В-клеток и Т-клеток, что является показателем успешного приживания HSC.

В другом эксперименте мышам C57BL/6J (CD45.2, самцы, возраст 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 000664) вводили дозу 2,5, 5 или 10 мг/мл Fab'5-(1) к c-KIT (Fab'-DAR4) или 10 мг/мл Fab'5 к c-KIT-mc-MMAF (Fab'-DAR4) с помощью мини-насоса (Alzet, №

по каталогу 2001), размещенного подкожно в области спины. В мини-насосе удерживался объем 200 мкл, и он выполнял инфузию с постоянным расходом, составляющим 1 мкл/час, в течение курса продолжительностью 7 дней. Через пять дней после имплантации мини-насос затем удаляли, чтобы прекратить любое дополнительное введение лекарственного средства. Не позднее чем через 24 часа после удаления мини-насоса затем мышам трансплантировали костный мозг от мышей-доноров, которые были конгенными по маркерам CD45 (CD45.1, B6.SJL-Ptprca<sup>a</sup> Percp<sup>b</sup>/BoyJ, самцы 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 002014). Прогресс трансплантации отслеживали в периферической крови путем отыскания химеризма CD45.1 клеток с интервалами в один месяц. В данном эксперименте химеризм крови отслеживали в течение 2 месяцев, как показано на ФИГ. 11. Химеризм в периферической крови оценивали с помощью проточной цитометрии. Образцы крови окрашивали с помощью антитела к mCD45.1-PerCP-Cy5.5 (1:100, BD № 560580), антитела к mCD45.2-BUV395 (1:100, BD № 564616), антитела к Mac-PE (1:500, BD № 553331), антитела к GR1-FITC (1:100, BD № 553127), антитела к B220-APC (1:400, BD № 553092) и антитела к CD3-V450 (1:100, BD № 560801), данные получали на проточном цитометре Fortessa (Becton Dickinson) и анализировали с помощью программного обеспечения FlowJo (TreeStar). Уровень химеризма определяли путем сравнения с популяциями, которые были положительными или по CD45.2 (хозяин), или по CD45.1 (донор). Общий уровень донорского химеризма представлен для общей популяции белых кровяных клеток. Кроме того, миелоидные клетки в периферической крови дополнительно оценивали в отношении донорского химеризма. Химеризм миелоидных клеток был основан на отыскании CD45.2 (хозяин) или CD45.2 (донор) на Mac-1+/Gr-1+ клетках. Данный эксперимент показывает, что у мышей, кондиционированных с помощью конъюгата Fab' к cKIT, могут успешно приживаться донорские клетки, которые восполняют миелоидный компартмент в той же степени, что и у мышей, кондиционированных с помощью летального облучения (ФИГ. 11B). Более низкие уровни общего донорского химеризма у мышей, кондиционированных с помощью средства, связывающего cKIT, по сравнению с облученными мышами (ФИГ. 11A), по-видимому, обусловлены более целенаправленно действующей природой кондиционирующего средства, связывающего cKit, которое не удаляет долгоживущие CD45.2+ B-клетки и T-клетки из кровотока.

В другом эксперименте мышей C57BL/6J (CD45.2, самцы, возраст

10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 000664) облучали при 300 рад. Спустя три дня им вводили дозу 2,5 или 5 мг/мл Fab'5-(1) к с-KIT (Fab'-DAR4) с помощью мини-насоса (Alzet, № по каталогу 2001), размещенного подкожно в области спины. Одну группу обрабатывали только с помощью облучения, и одну группу обрабатывали только с помощью 2,5 мг/мл Fab'5-(1) к с-KIT (Fab'-DAR4). В мини-насосе удерживался объем 200 мкл, и он выполнял инфузию с постоянным расходом, составляющим 1 мкл/час, в течение курса продолжительностью 7 дней. Через три дня после имплантации мини-насос затем удаляли, чтобы прекратить любое дополнительное введение лекарственного средства. Не позднее чем через 48 часа после удаления мини-насоса затем мышам трансплантировали костный мозг от мышей-доноров, которые были конгенными по маркерам CD45 (CD45.1, B6.SJL-Ptprca<sup>a</sup> Percp<sup>b</sup>/BoyJ, самцы 10 недель, Jackson Laboratory, № артикула 002014). Прогресс трансплантации отслеживали в периферической крови путем отыскания химеризма CD45.1 клеток с интервалами в один месяц. В данном эксперименте химеризм крови отслеживали в течение 4 месяцев, как показано на ФИГ. 12. Химеризм в периферической крови оценивали с помощью проточной цитометрии. Образцы крови окрашивали с помощью антитела к mCD45.1-PerCP-Cy5.5 (1:100, BD № 560580), антитела к mCD45.2-BUV395 (1:100, BD № 564616), антитела к Mac-PE (1:500, BD № 553331), антитела к GR1-FITC (1:100, BD № 553127), антитела к B220-APC (1:400, BD № 553092) и антитела к CD3-V450 (1:100, BD № 560801), данные получали на проточном цитометре Fortessa (Becton Dickinson) и анализировали с помощью программного обеспечения FlowJo (TreeStar). Уровень химеризма определяли путем сравнения с популяциями, которые были положительными или по CD45.2 (хозяин), или по CD45.1 (донор). Общий уровень донорского химеризма представлен для общей популяции белых кровяных клеток. Кроме того, миелоидные клетки в периферической крови дополнительно оценивали в отношении донорского химеризма. Химеризм миелоидных клеток был основан на отыскании CD45.2 (хозяин) или CD45.2 (донор) на Mac-1+/Gr-1+ клетках. Данный эксперимент показывает, что конъюгат Fab' к сKIT можно применять в качестве кондиционирующего средства в комбинации с другими средствами, такими как низкодозовое облучение, и что у мышей, кондиционированных таким способом, могут успешно приживаться донорские клетки.


Если не определено иное, технические и научные термины, применяемые в данном документе, имеют то же значение, которое

обычно понимается специалистом в области техники, к которой относится настоящее изобретение.

Если не указано иное, все способы, стадии, методики и манипуляции, которые конкретно не описаны подробно, можно было осуществлять и их осуществляли широко известным способом, как будет ясно специалисту в данной области техники. Например, снова сделана ссылка на стандартные руководства и общий уровень техники, упоминаемый в данном документе, а также на дополнительные литературные источники, цитируемые в данном документе. Если не указано иное, каждый из литературных источников, цитируемых в данном документе, включен посредством ссылки во всей своей полноте.

В целом настоящее изобретение относится к следующему.

1. Конъюгат формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль;



Формула (I),

где:

A представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с cKIT человека;

$L_B$  представляет собой линкер;

D представляет собой цитотоксическое средство;

n составляет целое число от 1 до 10, и

y составляет целое число от 1 до 10.

2. Конъюгат по п. 1, где n составляет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

3. Конъюгат по п. 1, где y составляет 1, 2, 3 или 4.

4. Конъюгат по любому из пп. 1-3, где каждый D представляет собой цитотоксическое средство, независимо выбранное из ауристатина, аманитина, майтанзиноида или сапорина.

5. Конъюгат по любому из пп. 1-4, где каждый D представляет собой цитотоксическое средство, независимо выбранное из ауристатина, аманитина или майтанзиноида.


6. Конъюгат по любому из пп. 1-5, где каждый D представляет собой цитотоксическое средство, независимо выбранное из ауристатина или аманитина.

7. Конъюгат по любому из пп. 1-6, где каждый  $L_B$  независимо выбран из расщепляемого линкера или нерасщепляемого линкера.

8. Конъюгат по любому из пп. 1-7, где каждый  $L_B$  представляет собой расщепляемый линкер.

9. Конъюгат по любому из пп. 1-7, где каждый  $L_B$  представляет собой нерасщепляемый линкер.

10. Конъюгат, имеющий структуру формулы (С):



где:

А представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с сКІТ человека;


у составляет целое число от 1 до 10;

$R^2$  представляет собой  $C_1$ - $C_6$ алкил;


$L_{20}$  представляет собой  $-L_1R^{40}$ ;

$L_1$  представляет собой  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_1L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mX_2L_4-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mX_1(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_p(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mO)_pCH_2)_mC(=O)NH(CH_2)_m-$ ,  $X_3X_4C(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-X_3X_4C(=O)(CH_2)_m-$ ,  $X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$ ,  $-X_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2-$ ,  $-(CH_2)_mC(R_7)_2SS(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_m-$  ИЛИ  $-(CH_2)_mX_3C(=O)(CH_2)_mNHC(=O)(CH_2)_mO)_p(CH_2)_m-$ ;


$L_4$  представляет собой  $-(CH_2)_m$ ;




X<sub>2</sub> представляет собой



X<sub>3</sub> представляет собой



X<sub>4</sub> представляет собой





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl,  $-NH_2$ ,  $-OCH_3$ ,  $-OCH_2CH_3$ ,  $-N(CH_3)_2$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$  и -OH;







каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , бензила, замещенного  $-C(=O)OH$ ,  $C_{1-4}$ алкокси, замещенного  $-C(=O)OH$ , и  $C_{1-4}$ алкила, замещенного  $-C(=O)OH$ ;

каждый  $R^{15}$  независимо выбран из H,  $-CH_3$  и фенила;


каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 и 14.

11. Конъюгат по п. 10, выбранный из



12. Конъюгат, имеющий структуру формулы (D):



где:

A представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с cKIT человека;

y составляет целое число от 1 до 10;





R<sup>2</sup> представляет собой C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил;





L<sub>30</sub> представляет собой -L<sub>5</sub>R<sup>40</sup>;

L<sub>4</sub> представляет собой -(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>;


L<sub>5</sub> представляет собой -NHS(=O)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>2</sub>L<sub>4</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>1</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(=O)NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(=O)NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>C(R<sub>7</sub>)<sub>2</sub>-, -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>C(R<sub>7</sub>)<sub>2</sub>SS(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub> или -NH(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>X<sub>3</sub>C(=O)(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>NHC(=O)((CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>O)<sub>p</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-;



$X_2$  представляет собой



или



, где






\*

указывает

на точку











присоединения к  $L_4$ ;


$R^{40}$  представляет собой



,  $-NR^7C(=O)CH_2-$ ,  $-NHC(=O)CH_2-$ ,  $-S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-(CH_2)_2S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-NR^7S(=O)_2CH_2CH_2-$ ,  $-NR^7C(=O)CH_2CH_2-$ ,  $-NH-$ ,  $-$

$C(=O)-$ ,  $-NHC(=O)-$ ,  $-CH_2NHCH_2CH_2-$ ,  $-NHCH_2CH_2-$ ,  $-S-$ ,





каждый  $R^7$  независимо выбран из H и  $C_1$ - $C_6$ алкила;

каждый  $R^{10}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl и -OH;

каждый  $R^{11}$  независимо выбран из H,  $C_1$ - $C_6$ алкила, F, Cl, - $NH_2$ , - $OCH_3$ , - $OCH_2CH_3$ , - $N(CH_3)_2$ , -CN, - $NO_2$  и -OH;


каждый  $R^{12}$  независимо выбран из H,  $C_1$ -алкила, фтора, бензилокси, замещенного -C(=O)OH, бензила, замещенного -C(=O)OH,  $C_1$ - $C_4$ алкокси, замещенного -C(=O)OH, и  $C_1$ - $C_4$ алкила, замещенного -C(=O)OH;

каждый  $R^{15}$  независимо выбран из H, - $CH_3$  и фенила;

каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,  
и

каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13 и 14.




13. Конъюгат по п. 12, выбранный из






$(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_1\text{L}_4-$ ,  $-\text{L}_4\text{NHC}(=\text{O})\text{NH}$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{X}_2\text{L}_4-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{X}_1(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{O})_p(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m$ ,  $-(\text{CH}_2)_m\text{O})_p\text{CH}_2)_m\text{C}(=\text{O})\text{NH}(\text{CH}_2)_m-$ ,  $-$   
 $(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2-$  или  $-(\text{CH}_2)_m\text{C}(\text{R}_7)_2\text{SS}(\text{CH}_2)_m\text{NHC}(=\text{O})(\text{CH}_2)_m-$ ;


$\text{L}_4$  представляет собой  $-(\text{CH}_2)_m$ ;



$(\text{CH}_2)_2\text{S}(=\text{O})_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ,  $-\text{NR}^7\text{S}(=\text{O})_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ,  $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ,  $-\text{NH}-$ ,  $-$



$\text{C}(=\text{O})-$ ,  $-\text{NHC}(=\text{O})-$ ,  $-\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2-$ ,  $-\text{NHCH}_2\text{CH}_2-$ ,  $-\text{S}-$ ,



ИЛИ

каждый  $\text{R}^7$  независимо выбран из  $\text{H}$  и  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ алкила;

каждый  $\text{R}^{10}$  независимо выбран из  $\text{H}$ ,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ алкила,  $\text{F}$ ,  $\text{Cl}$  и  $-\text{OH}$ ;

каждый  $\text{R}^{11}$  независимо выбран из  $\text{H}$ ,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ алкила,  $\text{F}$ ,  $\text{Cl}$ ,  $-\text{NH}_2$ ,  $-\text{OCH}_3$ ,  $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ ,  $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$ ,  $-\text{CN}$ ,  $-\text{NO}_2$  и  $-\text{OH}$ ;

каждый  $\text{R}^{12}$  независимо выбран из  $\text{H}$ ,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_6$ алкила, фтора, бензилокси, замещенного  $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ , бензила, замещенного  $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ ,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ алкокси, замещенного  $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ , и  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ алкила, замещенного  $-$

C(=O)OH;




каждый R<sup>15</sup> независимо выбран из H, -CH<sub>3</sub> и фенила;




каждый m независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,

и


каждый p независимо выбран из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.


15. Конъюгат по п. 14, выбранный из:












16. Конъюгат, выбранный из:














где:

A представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с сК1Т человека, и

y составляет целое число от 1 до 10.

17. Конъюгат, выбранный из:





Где:

А представляет собой фрагмент антитела, который специфически связывается с сКИТ человека, и

у составляет целое число от 1 до 10.

18. Конъюгат по любому из пп. 1-17, где фрагмент антитела специфически связывается с внеклеточным доменом сКИТ человека (SEQ ID NO: 112).

19. Конъюгат по любому из пп. 1-17, где фрагмент антитела специфически связывается с эпитопом в доменах 1-3 сКИТ человека (SEQ ID NO: 113).

20. Конъюгат по любому из пп. 1-19, где фрагмент антитела представляет собой Fab или Fab'.

21. Конъюгат по любому из пп. 1-17 или п. 20, где фрагмент антитела выбран из любого из следующих:

(1) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 (определяющую комплементарность область 1 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 1, (b) HCDR2 (определяющую комплементарность область 2 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 2 и (c) HCDR3 (определяющую комплементарность область 3 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 (определяющую комплементарность область 1 легкой цепи) под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 (определяющую комплементарность область 2 легкой цепи) под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 (определяющую комплементарность область 3 легкой цепи) под SEQ ID NO: 18;

(2) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 4, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 5, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 19, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 21;

(3) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 6, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 2, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(4) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 7, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 8, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 9; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 22, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(5) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой

цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 27, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(6) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 30, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 31, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 44, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 45;

(7) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 32, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(8) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 33, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 34, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 35; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 46, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(9) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 1, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 51, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(10) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 4, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 52, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 19, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 21;

(11) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 6, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 51, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(12) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 7, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 53, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 9; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под

SEQ ID NO: 22, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(13) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 60, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(14) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 63, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 64, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 78, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 80;

(15) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 65, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(16) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 66, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 67, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 68; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 81, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(17) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 86, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(18) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 89, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 90, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 104, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 106;

(19) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 91, (b)

HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(20) Fab или Fab', содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 92, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 93, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 94; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 107, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(21) Fab или Fab', содержащих переменную область тяжелой цепи (VH), которая содержит SEQ ID NO: 10, и переменную область легкой цепи (VL), которая содержит SEQ ID NO: 23;

(22) Fab или Fab', содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 36, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 47;

(23) Fab или Fab', содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 54, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 23;

(24) Fab или Fab', содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 69, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 82;

(25) Fab или Fab', содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 95, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 108;

(26) Fab', содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 14, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(27) Fab', содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 40, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 49;

(28) Fab', содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 58, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(29) Fab', содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 73, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 84;

(30) Fab', содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 99, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 110;

(31) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 122;

(32) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 123;

(33) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 128;

(34) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 129;

(35) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID

NO: 130, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 134;

(36) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 130, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 135;

(37) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 136, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 140;

(38) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 141, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 145;

(39) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 119, 120 или 121, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25;

(40) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 125, 126 или 127, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 49;

(41) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 131, 132 или 133, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 25;

(42) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 137, 138 или 139, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 84; или

(43) Fab, содержащего тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 142, 143 или 144, и легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность под SEQ ID NO: 110.

22. Конъюгат по любому из пп. 1-21, где фрагмент антитела представляет собой человеческие или гуманизированные Fab или Fab'.

23. Конъюгат по любому из пп. 1-9, где фрагмент антитела представляет собой Fab', а линкер (L<sub>B</sub>) присоединен к нативному цистеиновому остатку в шарнирной области Fab'.

24. Конъюгат по любому из пп. 1-9, где фрагмент антитела содержит по меньшей мере один ненативный цистеин, введенный в константную область, а линкер (L<sub>B</sub>) присоединен к ненативному цистеину.

25. Конъюгат по любому из пп. 10-11 или пп. 14-15, где фрагмент антитела представляет собой Fab', а L<sub>20</sub> присоединен к нативному цистеиновому остатку в шарнирной области Fab'.

26. Конъюгат по любому из пп. 10-11 или пп. 14-15, где

фрагмент антитела содержит по меньшей мере один ненативный цистеин, введенный в константную область, а L<sub>20</sub> присоединен к ненативному цистеину.

27. Конъюгат по любому из пп. 12–13, где фрагмент антитела представляет собой Fab', а L<sub>30</sub> присоединен к нативному цистеиновому остатку в шарнирной области Fab'.

28. Конъюгат по любому из пп. 12–13, где фрагмент антитела содержит по меньшей мере один ненативный цистеин, введенный в константную область, а L<sub>30</sub> присоединен к ненативному цистеину.

29. Конъюгат по любому из п. 24, п. 26 или п. 28, где фрагмент антитела содержит цистеин в одном или нескольких из следующих положений (нумерация всех положений согласно EU):

- (a) положение 152 тяжелой цепи,
- (b) положение 114 или 165 легкой каппа-цепи или
- (c) положение 143 легкой лямбда-цепи.

30. Конъюгат по любому из пп. 1–29, где период полувыведения конъюгата составляет менее приблизительно 24–48 часов.

31. Конъюгат по любому из пп. 1–30, где конъюгат не индуцирует дегрануляцию мастоцитов.

32. Фармацевтическая композиция, содержащая конъюгат по любому из пп. 1–31 и фармацевтически приемлемый носитель.

33. Фармацевтическая композиция по п. 32, дополнительно содержащая другое терапевтическое средство.

34. Фармацевтическая композиция по п. 32, где композиция представляет собой лиофилизат.

35. Способ разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, причем способ предусматривает введение пациенту эффективного количества конъюгата по любому из пп. 1–31 или фармацевтической композиции по п. 32 или п. 33.

36. Способ по п. 35, где пациент является реципиентом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

37. Способ по п. 36, где способ осуществляют до трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту.

38. Способ кондиционирования пациента, подлежащего трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, причем способ предусматривает введение пациенту эффективного количества конъюгата по любому из пп. 1–31 или фармацевтической композиции по п. 32 или п. 33 и обеспечение достаточного периода времени, чтобы конъюгаты вывелись из кровяного русла пациента перед проведением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту.

39. Способ по любому из пп. 35–38, где пациент имеет наследственное иммунодефицитное заболевание, аутоиммунное нарушение, нарушение гемопоэза или врожденное нарушение обмена веществ.

40. Способ по п. 39, где нарушение гемопоэза выбрано из острого миелоидного лейкоза (AML), острого лимфобластного лейкоза (ALL), острого моноцитарного лейкоза (AMoL), хронического миелоидного лейкоза (CML), хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL), миелопролиферативных нарушений, миелодиспластических синдромов, множественной миеломы, неходжкинской лимфомы, болезни Ходжкина, апластической анемии, истинной эритроцитарной аплазии, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, анемии Фанкони, большой талассемии, серповидноклеточной анемии, тяжелого комбинированного иммунодефицита, синдрома Вискотта–Олдрича, гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза.

41. Способ по п. 39, где врожденное нарушение обмена веществ выбрано из мукополисахаридоза, болезни Гоше, метакроматических лейкодиistroфий или адренолейкодиistroфий.

42. Способ по любому из пп. 35–38, где пациент имеет незлокачественное заболевание или состояние, выбранное из тяжелой апластической анемии (SAA), синдрома Вискотта–Олдрича, синдрома Гурлера, FHL, CGD, синдрома Костмана, тяжелого иммунодефицитного синдрома (SCID), других аутоиммунных нарушений, таких как SLE, рассеянный склероз, IBD, болезнь Кролма, синдром Шегрена, васкулит, волчанка, миастения гравис, болезнь Вегенера, врожденных нарушений обмена веществ и/или других иммунодефицитов.

43. Способ по любому из пп. 35–38, где пациент имеет злокачественное заболевание или состояние, выбранное из миелодиспластических синдромов (MDS), острого лимфобластного лейкоза (ALL), острого миелогенного лейкоза (AML), острого моноцитарного лейкоза (AMoL), хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL), хронического миелогенного лейкоза (CML), волосатоклеточного лейкоза (HCL), Т-клеточного пролимфоцитарного лейкоза (T-PLL), лейкоза из больших зернистых лимфоцитов, Т-клеточного лейкоза взрослых, лейкоза/лимфомы из предшественников Т-клеток, лимфомы Беркитта, фолликулярной лимфомы, диффузной В-крупноклеточной лимфомы, лимфомы из клеток мантийной зоны, В-клеточного хронического лимфоцитарного лейкоза/лимфомы, лимфомы MALT, фунгоидного микоза, неуточненной периферической Т-клеточной лимфомы, формы ходжкинской лимфомы с нодулярным склерозом,

смешанноклеточного подтипа ходжкинской лимфомы.

44. Применение конъюгата по любому из пп. 1–31 или фармацевтической композиции по п. 31 или п. 32 для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом.

45. Применение конъюгата по любому из пп. 1–31 или фармацевтической композиции по п. 31 или п. 32 в изготовлении лекарственного препарата для разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом.

46. Антитело или фрагмент антитела, которые специфически связываются с сКІТ человека, где антитело или фрагмент антитела выбраны из любого из следующих:

(1) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 (определяющую комплементарность область 1 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 1, (b) HCDR2 (определяющую комплементарность область 2 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 2 и (c) HCDR3 (определяющую комплементарность область 3 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 (определяющую комплементарность область 1 легкой цепи) под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 (определяющую комплементарность область 2 легкой цепи) под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 (определяющую комплементарность область 3 легкой цепи) под SEQ ID NO: 18;

(2) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 4, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 5, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 19, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 21;

(3) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 6, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 2, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(4) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 7, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 8, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 9; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 22, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(5) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 27, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(6) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 30, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 31, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 44, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 45;

(7) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 32, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(8) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 33, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 34, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 35; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 46, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(9) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 60, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(10) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 63, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 64, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 78, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 80;

(11) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 65, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:

(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(12) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 66, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 67, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 68; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 81, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(13) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 86, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(14) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 89, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 90, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 104, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 106;

(15) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 91, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(16) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 92, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 93, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 94; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 107, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(17) антитела или фрагмента антитела, содержащих переменную область тяжелой цепи (VH), которая содержит SEQ ID NO: 10, и переменную область легкой цепи (VL), которая содержит SEQ ID NO: 23;

(18) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 36, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 47;

(19) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 69, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 82;

(20) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 95, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 108;

(21) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 14, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(22) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 40, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 49;

(23) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 73, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 84;

(24) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 99, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 110;

(25) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 122;

(26) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 123;

(27) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 128;

(28) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 129;

(29) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 130, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 134;

(30) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 130, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 135;

(31) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 136, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 140;

(32) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 141, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 145;

(33) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 12, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(34) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 38, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 49;

(35) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 71, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 84; или

(36) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 97, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 110.

47. Нуклеиновая кислота, кодирующая антитело или фрагмент антитела по п. 46.

48. Вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п. 47.

49. Клетка-хозяин, содержащая вектор по п. 48.

50. Способ получения антитела или фрагмента антитела, причем способ предусматривает культивирование клетки-хозяина по п. 49 и извлечение антитела или фрагмента антитела из культуры.

Пункты формулы изобретения являются неограничивающими и представлены ниже.

Хотя конкретные аспекты и пункты формулы изобретения были подробно раскрыты в данном документе, это было выполнено в качестве примера лишь в целях иллюстрации, и не предназначено для ограничений с точки зрения объема прилагаемой формулы изобретения или объема объекта формулы изобретения с любым соответствующим будущим применением. В частности, авторы настоящего изобретения подразумевают, что различные замены, изменения и модификации могут быть выполнены в настоящем изобретении без отклонения от сути и объема настоящего изобретения, определяемого формулой изобретения. Считается, что выбор исходного материала в виде нуклеиновой кислоты, представляющего интерес клона или типа библиотеки, является обычным делом для рядового специалиста в данной области техники, располагающего сведениями об аспектах, описанных в данном документе. Считается, что другие аспекты, преимущества и модификации находятся в пределах объема следующей формулы изобретения. Специалистам в данной области техники будут понятны многие эквиваленты конкретных аспектов настоящего изобретения, описанного в данном документе, или путем проведения всего лишь обычных экспериментов они будут способны установить такие эквиваленты. Предусмотрено, что такие эквиваленты охвачены следующей формулой изобретения. Изменение объема пункта формулы изобретения в позднее поданных соответствующих заявках может быть обусловлено ограничениями патентных законов различных стран и не должно пониматься как отказ от объекта формулы изобретения.

**ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

1. Антитело или фрагмент антитела, которые специфически связываются с cKIT человека, где антитело или фрагмент антитела выбраны из любого из следующих:

(1) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 (определяющую комплементарность область 1 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 1, (b) HCDR2 (определяющую комплементарность область 2 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 2 и (c) HCDR3 (определяющую комплементарность область 3 тяжелой цепи) под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 (определяющую комплементарность область 1 легкой цепи) под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 (определяющую комплементарность область 2 легкой цепи) под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 (определяющую комплементарность область 3 легкой цепи) под SEQ ID NO: 18;

(2) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 4, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 5, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 19, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 21;

(3) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 6, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 2, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 3; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 16, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(4) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 7, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 8, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 9; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 22, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 18;

(5) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 27, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID

NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(6) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 30, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 31, (c) HCDR3 под SEQ ID  
NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 44, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 45;

(7) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 32, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 28, (c) HCDR3 под SEQ ID  
NO: 29; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 42, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 17 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(8) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 33, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 34, (c) HCDR3 под SEQ ID  
NO: 35; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 46, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 20 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 43;

(9) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 60, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID  
NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(10) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 63, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 64, (c) HCDR3 под SEQ ID  
NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит:  
(d) LCDR1 под SEQ ID NO: 78, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f)  
LCDR3 под SEQ ID NO: 80;

(11) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i)  
переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под  
SEQ ID NO: 65, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 61, (c) HCDR3 под SEQ ID

NO: 62; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 75, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 76 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(12) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 66, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 67, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 68; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 81, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 79 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 77;

(13) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 86, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(14) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 89, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 90, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 104, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 106;

(15) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 91, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 87, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 88; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 101, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 102 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(16) антитела или фрагмента антитела, содержащих (i) переменную область тяжелой цепи, которая содержит (a) HCDR1 под SEQ ID NO: 92, (b) HCDR2 под SEQ ID NO: 93, (c) HCDR3 под SEQ ID NO: 94; и (ii) переменную область легкой цепи, которая содержит: (d) LCDR1 под SEQ ID NO: 107, (e) LCDR2 под SEQ ID NO: 105 и (f) LCDR3 под SEQ ID NO: 103;

(17) антитела или фрагмента антитела, содержащих переменную область тяжелой цепи (VH), которая содержит SEQ ID NO: 10, и переменную область легкой цепи (VL), которая содержит SEQ ID NO:

23;

(18) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 36, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 47;

(19) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 69, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 82;

(20) антитела или фрагмента антитела, содержащих VH, которая содержит SEQ ID NO: 95, и VL, которая содержит SEQ ID NO: 108;

(21) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 14, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(22) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 40, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 49;

(23) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 73, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 84;

(24) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 99, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 110;

(25) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 122;

(26) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 118, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 123;

(27) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 128;

(28) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 124, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 129;

(29) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 130, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 134;

(30) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 130, и легкую цепь, которая

содержит SEQ ID NO: 135;

(31) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 136, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 140;

(32) антитела или фрагмента антитела, содержащих тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 141, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 145;

(33) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 12, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 25;

(34) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 38, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 49;

(35) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 71, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 84; или

(36) антитела, содержащего тяжелую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 97, и легкую цепь, которая содержит SEQ ID NO: 110. 2. Антитело или фрагмент антитела по п. 1, где антитело или фрагмент антитела специфически связывается с внеклеточным доменом cKIT человека (SEQ ID NO: 112).

3. Антитело или фрагмент антитела по п. 1, где антитело или фрагмент антитела специфически связывается с эпитопом в доменах 1-3 cKIT человека (SEQ ID NO: 113).

4. Антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1-3, где фрагмент антитела представляет собой Fab или Fab'.

5. Антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1-4, где фрагмент антитела представляет собой человеческий или гуманизированный Fab или Fab'.

6. Антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1-5, где антитело или фрагмент антитела содержит по меньшей мере один ненативный цистеин, введенный в константную область.

7. Антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1-6, где антитело или фрагмент антитела содержит по меньшей мере один ненативный цистеин в одном или нескольких из следующих положений (нумерация всех положений согласно EU):

- (a) положение 152 тяжелой цепи,
- (b) положение 114 или 165 легкой каппа-цепи или
- (c) положение 143 легкой лямбда-цепи.

8. Антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1–7, где антитело или фрагмент антитела не индуцирует дегрануляцию мастоцитов.

9. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1–8 и фармацевтически приемлемый носитель.

10. Фармацевтическая композиция по п. 9 дополнительно содержащая другое терапевтическое средство.

11. Фармацевтическая композиция по п. 9, где композиция представляет собой лиофилизат.

12. Способ разрушения гемопоэтических стволовых клеток у пациента, нуждающегося в этом, причем способ предусматривает введение пациенту эффективного количества антитела или фрагмента антитела по любому из пп. 1–8 или фармацевтической композиции по п. 9 или 10.

13. Способ по п. 12, где пациент является реципиентом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

14. Способ по п. 13, где способ осуществляют до трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту.

15. Способ по любому из пп. 12–14, где пациент имеет наследственное иммунодефицитное заболевание, аутоиммунное нарушение, нарушение гемопоэза или врожденное нарушение обмена веществ.

16. Способ по п. 15, где нарушение гемопоэза выбрано из острого миелоидного лейкоза (AML), острого лимфобластного лейкоза (ALL), острого моноцитарного лейкоза (AMoL), хронического миелоидного лейкоза (CML), хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL), миелопролиферативных нарушений, миелодиспластических синдромов, множественной миеломы, неходжкинской лимфомы, болезни Ходжкина, апластической анемии, истинной эритроцитарной аплазии, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, анемии Фанкони, большой талассемии, серповидноклеточной анемии, тяжелого комбинированного иммунодефицита, синдрома Вискотта–Олдрича, гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза.

17. Способ по п. 15, где врожденное нарушение обмена веществ выбрано из мукополисахаридоза, болезни Гоше, метакроматических

лейкодистрофий или адренолейкодистрофий.

18. Способ по любому из пп. 12-17, где пациент имеет незлокачественное заболевание или состояние, выбранное из тяжелой апластической анемии (SAA), синдрома Вискотта-Олдрича, синдрома Гурлера, FHL, CGD, синдрома Костмана, тяжелого иммунодефицитного синдрома (SCID), других аутоиммунных нарушений, таких как SLE, рассеянный склероз, IBD, болезнь Кролма, синдром Шегрена, васкулит, волчанка, миастения гравис, болезнь Вегенера, врожденных нарушений обмена веществ и/или других иммунодефицитов.

19. Способ по любому из пп. 12-17, пациент имеет злокачественное заболевание или состояние, выбранное из миелодиспластических синдромов (MDS), острого лимфобластного лейкоза (ALL), острого миелогенного лейкоза (AML), острого моноцитарного лейкоза (AMoL), хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL), хронического миелогенного лейкоза (CML), волосатоклеточного лейкоза (HCL), Т-клеточного пролимфоцитарного лейкоза (Т-PLL), лейкоза из больших зернистых лимфоцитов, Т-клеточного лейкоза взрослых, лейкоза/лимфомы из предшественников Т-клеток, лимфомы Беркитта, фолликулярной лимфомы, диффузной В-крупноклеточной лимфомы, лимфомы из клеток мантийной зоны, В-клеточного хронического лимфоцитарного лейкоза/лимфомы, лимфомы MALT, фунгоидного микоза, неутонченной периферической Т-клеточной лимфомы, формы ходжкинской лимфомы с нодулярным склерозом, смешанноклеточного подтипа ходжкинской лимфомы.


20. Нуклеиновая кислота, кодирующая антитело или фрагмент антитела по любому из пп. 1-8.

21. Вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п. 20.


22. Клетка-хозяин, содержащая вектор по п. 21.

23. Способ получения антитела или фрагмента антитела, причем способ предусматривает культивирование клетки-хозяина по п. 22 и извлечение антитела или фрагмента антитела из культуры.


ФИГ. 1




ФИГ. 2




ФИГ. 3А




ФИГ. 3В




ФИГ. 3С




ФИГ. 3Д




ФИГ. 3Е




ФИГ. 3Ф




ФИГ. 3Г




ФИГ. 3Н




ФИГ. 3И




ФИГ. 3Ј



ФИГ. 3К




ФИГ. 3Л






















ФИГ. 5










**ФИГ. 6**














**ФИГ. 11А**




**ФИГ. 11В**




**ФИГ. 12А**



**ФИГ. 12В**



ФИГ. 13



**ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ**

(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:

**202391490**А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:  
См. дополнительный лист

Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:

C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, C12N 15/63, C12N 5/10, C12P 21/08, A61P 37/06, A61P 43/00

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если возможно, используемые поисковые термины)  
Espacenet, EAPATIS, Google, PATENTSCOPE, EMBL-EBI, PubMed, USPTO, ScienceDirect, E-Library

В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	EA 201591801 A1 (НОВАРТИС АГ) 2016-03-31 реферат, с.1-2, раздел «Предпосылки изобретения», с.10, 4 абз. – с.11, 5 абз., с.76-77, раздел «Антитела против сKIT», таблица 1 на с.77-103, с.114- 120, раздел «Получение антитела против сKIT», с.120-124, раздел «Диагностическое и терапевтическое применение», примеры 1-7	1-23
A	EA 023665 B1 (ИМКЛЮН, ЛЛК) 2016-06-30 формула, с.1, 1-6 абз., примеры	1-23
A	WO 2016020791 A1 (NOVARTIS AG et al.) 2016-02-11 реферат, пар.2-6, 56-58, 209-270, примеры 1-13	1-23
A	WO 2008067115 A3 (THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY et al.) 2008-06-05 формула, пар.1-16, 28-39, примеры	1-23
A	STAHL M. et al. Targeting KIT on innate immune cells to enhance the antitumor activity of checkpoint inhibitors. IMMUNOTHERAPY. 2016-06-28, Vol. 8, No. 7, p.767-774 doi: 10.2217/imt-2016-0040 весь документ	1-23
A	XUE X. et al. Antibody targeting KIT as pretransplantation conditioning in immunocompetent mice. BLOOD. 2010, Vol. 116, No. 24, p.5419-5422 doi: 10.1182/blood-2010-07-295949 весь документ	1-23

 последующие документы указаны в продолжении графы

\* Особые категории ссылочных документов:

«А» - документ, определяющий общий уровень техники


«D» - документ, приведенный в евразийской заявке

«E» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи  
евразийской заявки или после нее«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию  
и т.д."P" - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки,  
но после даты испрашиваемого приоритета"«Т» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и при-  
веденный для понимания изобретения«X» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска,  
порочающий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности«Y» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска,  
порочающий изобретательский уровень в сочетании с другими документами  
той же категории

«&amp;» - документ, являющийся патентом-аналогом

«L» - документ, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: 01 июля 2024 (01.07.2024)

Уполномоченное лицо:  
Начальник Управления экспертизы

С.Е. Аверкиев

**ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ**  
**(дополнительный лист)**

Номер евразийской заявки:

**202391490**

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ (продолжение графы А)

МПК:

*C07K 16/28* (2006.01)  
*A61K 39/395* (2006.01)  
*C12N 15/13* (2006.01)  
*C12N 15/63* (2006.01)  
*C12N 5/10* (2006.01)  
*C12P 21/08* (2006.01)  
*A61P 37/06* (2006.01)

СПК:

**C07K 16/2803**  
**A61P 37/06**  
C07K 2317/21  
C07K 2317/24  
C07K 2317/51  
C07K 2317/515  
C07K 2317/55  
C07K 2317/56  
C07K 2317/565  
C07K 2317/73

**ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ**  
(дополнительный лист)

Номер евразийской заявки:

**202391490**

**Раздел I. ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ, КОГДА НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПОИСКУ**

Настоящий отчет о патентном поиске не охватывает некоторые пункты формулы изобретения по следующим причинам:

1.  пункты формулы изобретения №:  
т.к. они относятся к объектам, указанным в правиле 3(3) Патентной инструкции к ЕАПК, а именно:

2.  пункты формулы изобретения №:  
т.к. они относятся к части евразийской заявки, которая не отвечает установленным требованиям в такой степени, что по ней невозможно провести полноценный патентный поиск, а именно:

**Раздел II. ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Единство изобретения не соблюдено по следующим причинам:

Изобретения по п.1 (в части (1)-(4), (17),(21),(25),(26)) и пп.9,12,20-23 объединены соответствующим техническим признаком, заключающимся в антигене или фрагменте антигена, которые специфически связываются с сКГТ и содержат комбинацию CDRs со следующими аминокислотными последовательностями: SEQ ID NO: 1-3, 16-18 (схема нумерации Kabat), или SEQ ID NO: 4,5,3, 19-21 (схема нумерации Chotia), или SEQ ID NO: 6,2,3, 16-18 (комбинированная схема нумерации), или SEQ ID NO: 7-9, 22,20,18 (схема нумерации IMGT). Однако указанный признак отсутствует в п.1 (в части (5)-(16), (18)-(20),(22)-(24),(27)-(36)).

На основе общей специфичности и комбинации CDRs (см. с.135-166 настоящего описания) в формуле выделены следующие группы изобретений, не имеющие единый изобретательский замысел:

группу 1 образуют изобретения по п.1 (в части (1)-(4), (17),(21),(25),(26),(33)) и пп.9,12,20-23, общим техническим признаком которых является комбинация CDRs, указанная в п.1 (1)-(4);

группу 2 образуют изобретения по п.1 (в части (5)-(8), (18),(22),(27),(28),(34)) и пп.9,12,20-23, общим техническим признаком которых является комбинация CDRs, указанная в п.1 (5)-(8);

группу 3 образуют изобретения по п.1 (в части (9)-(12), (19),(23),(31),(35)) и пп.9,12,20-23, общим техническим признаком которых является комбинация CDRs, указанная в п.1 (9)-(12);

группу 4 образуют изобретения по п.1 (в части (13)-(16), (20),(24),(32),(36)) и пп.9,12,20-23, общим техническим признаком которых является комбинация CDRs, указанная в п.1 (13)-(16);

группу 5 образуют изобретения по п.1 (в части (29),(30)) и пп.9,12,20-23.